

# Glycine

\* foliis ternatis

1. subterranea G. foliis ternatis ~~ternatis~~ <sup>radicalibus</sup>, caulebus procumbentibus flexuosis, pedunculis <sup>li bifloris</sup>
2. triloba G. foliolis lobatis, caule prostrato, pedunculis bifloris
3. nummularia G. foliolis obtusissimis, racemis floribus geminis, leguminibus sesquialibus
4. debilis G. <sup>suborbiculatis compressis</sup> foliolis ovalibus subtus pilosis, leguminibus subpeltatis linearibus poly-  
spermis, stylo persistenti acuto
5. ~~lobata~~
6. labialis G. volubilis, foliolis obovatis subanis, floribus axillaribus congestis,  
corolla sublobata.
7. menziesii G. foliolis nudis insculis, caulebus pilosis, racemis pendulis, floribus  
fructiferis apertis
8. tomentosa G. foliolis tomentosis, pedunculis axillaribus brevibus fimbriatis trifloris  
leguminibus dispermis
9. phaeoloides G. foliolis subtus villosis, racemis terminalibus
10. javanica G. caule villosis, petiolis hirsutis, bracteis lanceolatis minutis

11. bituminosa G. floribus racemosis, Leguminibus Vumidis villosis  
 12. forata G. solubilis, foliis oblongis mollissimis inanis, racemis axillaribus foliorum  
 congritudine, Leguminibus hirsutissimis  
 13. villosa G. folioli trilobis villosis, racemis axillaribus  
 14. comosa G. folioli hirsuti, <sup>oblongis</sup> racemis lateralibus  
 15. reflexa G. folioli ovato-rhombis <sup>obtusis</sup> reflexis punctatis, racemis axillaribus  
 16. caniboa G. folioli subvillosis rhombis, racemis patulis, Leguminibus hirsutis,  
 caule fruticoso.  
 17. fraveolens G. fruticoso, erecto, pubescenti viscosa, folioli ovatis acumi-  
 natis, pedunculis axillaribus unifloris, Leguminibus dispermis  
 18. picta G. folioli lanceolatis villosis, racemis axillaribus pedunculatis,  
 caule erecto fruticoso.  
 \* \* foliis pinnatis  
 19. apica G. folioli ovato-lanceolatis septenis, calycibus glabris  
 20. frutescens G. folioli ovatis septenis, caule perenni, calycibus sericeis

24 x foliis simplicibus

21. monophylla G. foliis cordatis, caule pubescente tomentos  
22. tunica G. foliis lanceolatis, caule tereti

rugosa

multiflora

purpurata

Forstn<sup>al</sup>ai

microphylla

rigida Glycyne foliis obovatis glabresculis, ramis omnibus axillaribus longioribus,  
floribus solitariis nudantibus, caule fruticoso.

Habitat in Guinea Isert. 5.

Caulis volubilis: rami teretes, purpurascens, inferne glabrescens, superne  
pubescentia cinerea, uti foliola, pedicelli & calycis venelli. Folia petiolata: fo-  
liola petiolata, pollicaria, intermedium rhombico ovatum, late glabrescens  
la, obtusissima, interdum mucronata, venosa. Stipulae caducae, lanceolatae, parvae.  
Pedunculus semipedalis. Flores sparsi, remoti. Calycis squae fidi: lacini  
inferior bulbata, parum longior. Bractea obtusa, decidua. Vexillum ex-  
terius villosum. Legumen inaequum.

Trifoliata Stromia folio Ternatis, flombro petaloides pentandris

Habitat in Guinea Gest 5

Arbor. Rami erecti, ~~teretes~~ glabri. Folia longe petiolata, alterna: foliola  
oblongo-ovata ~~oblongo-ovata~~ <sup>truncolata</sup> ob-  
peltata, al. intermedium ut ~~in~~ angue attenuatum, 4-5 pollicare, ~~lanceolata~~  
oblong

*hirsuta* *Hyssopus folius ternatis ovatis pilosis, racemis at illantibus*  
*elongatis leguminibus articulatis hirsuti*

Habitat in America meridionali V. Rott.

Caulis volubilis uti reliqua planta piloso hirsuta  
Folia ~~petiolata~~ petiolata. foliola ovata integra  
intermedia cum subrhombum, mucronata tripolliciana  
subaequalia tenuispina ~~non~~ nervosa venosa. Petioli  
folio longior striati ~~truncati~~ <sup>triplicati</sup> lanceolata. Pedunculus  
folio duplo longior. flores per intervallo aggregati  
remoti coerulei legumina compressa parum curvata  
et papulum semen articulo di sesquipolliciana. Semen  
abrupto

Subterranea? Glycine

# Ile de France culta Commes: herb. Fuss.

# ~~Van~~ deon Flacourt Madag. 110.

Caulis procumbentes flexuosi, villosi. Folia longa petiolata: foliola fere bipollicaria venosa, emarginata. Petiolarum versus apicem et parvulis interme-  
diis versus insertionem glandula bina oblonga. Bracteae minutae, ovatae  
Pedunculi axillares, semi pollicares; versus terram reflexi, 5-7 flori-  
men fere Ciceris orientalis, globosum, glabrum

<sup>ternatis</sup>  
19 punctata G. foliis subtundis cuneato-subrotundis subtus punctatis racemis  
axillaribus

Habitat in India orientali

Tacis gl. num. Caulis volubilis tener, Caviter pilosus striatus. Colu[m]bae solata  
lano foliola 9. nummularia ad triplum minoro, linguiculata  
glabra venosa aequalia intermedium emarginatum lateralia  
sejuncta estibus latiora. Apicula minuto pubulata. Racemi sesqui  
pedicari. flores cunctis 7 remoti solitarii parvi. Calici  
no calycis longitudine corolla. Legumina lineari-oblonga  
pubescentia disperma.

Phaseolus exiguus, glaber, trifolii foliis, siliqua plana compressa  
Burm. reyl. pag 100. tab. 10. fig. 2.



Rob: ~~one~~ ~~my~~ ~~pedane~~ ~~reimo~~ ~~are~~ ~~ill~~ ~~ban~~ ~~ba~~, ~~ped~~ ~~will~~ ~~un~~ ~~ise~~

5 rugosa g: foliis ternatis ovato-subrotundis reticulatis pubescentibus. Calicinis  
calycinis ovatis caule erecto

Habitat in India orientali  
Caulis <sup>reclinatus</sup> pubescens flexuosus tener ramosus.

Folia petiolata  
reticulato venosa. Pedunculi axillares capillares bi-<sup>3</sup> triflori  
ni foliis longiores. Calyx pubescens calicinis ovatis obtusi  
legumen unguiculare

glycyne

20 *microphylla* G. foliis <sup>ternatis</sup> ovatis subrotundo rhombeis tomentosis, racemosis  
buis racemosis tomentosis dyspermis  
Habitat in Arabia Eoiph.

Caulis angulatus cinereus subtomentosus ramosis foliis volubilibus

Folia petiolata foliola, vix unguiculata intermedium lati-  
tudine et longitudine aequali: latera parum minoris extus

gibba intus lanciolata, omnia mollis pona ~~pubes~~ reticulata  
sa. ~~capula~~ vix ulla. Racemi axillares uniter quinquiflori

juniora tenera dispersi Legumina oblonga, basi acuta inter-  
fermina depressi: juniora e vellis densioribus cania. Calicis

calycis lanciolata corolla dimidiis brevior. Corolla obtusissima  
fere Hedyfari

18 *Gophthaloe* gl. foliis ternatis rhombicis obtusis glabris, racemis axillaribus  
Habitu in Arabia Turke.  
maxime affinis minimo diversa foliis obtusis rotundioribus  
floribus triplo majoribus, foliis absque villositate ulla

an *Dolechus*

17. multiflora G. foliis ternatis intermedio obovatis <sup>catenatis</sup> ~~obtusis~~ glabris racemis  
axillaribus multifloris

Habitat in India Orientali Siam

Caulis frutus volubilis secundum frons vit villosus. Folia  
petiolata: foliola pollicaria, trinerviia aequalia latera  
tia extra gibba, subtus punctata. Stipula subulata. Ra  
cemi reflecti folio duplo longiore. Flores conopii approxima  
ti sparsi. Lacinia calycina attenuata

affinis fol. minus a speciei Dolich.

*Calycina Glycine*

Habitat in St Domingo herb. la Marti

Caulis volubilis, glaber, superne canescens. Folia petiolata, ternata: foliola  
oblonga, <sup>utrinque</sup> pectinata, utrinque villosa, mollissima, subnyosa <sup>2</sup> reticulata, obtusa,  
im punctata, ~~attenuata~~ unguiculata; lateralia parum minor. Racemi  
axillares, solitarii, semipollicares, octo flori, canescentes: Calyx profunde  
divisus: laciniis linearis lanceolatis. Stipula decidua.

tetraphylla Glycine foliis impari pennatis bijugis foliolis obtusatis glabris, mucosis axil-  
laribus

Habitat in madagascaria herb. La Martini

Caules volubiles, glabres, teres, folia pollicaria: foliola petiolata, opposita, unguis  
cylindrica, interiora minora, utrinque punctata. Stipula parva subulata. Racemi  
foliis breviores, simplices, capillares: bractea minuta, ovata. Calyx campanula-  
tus, obtuse dentatus. Corolla flava, punctata.

an Ornithopus Tetraphyllus L.

*Sesceca* *Glycine* foliolis oblongis subtus sericeis submarginatis, racemis axillaribus  
Leguminibus incurvis acuminatis villosis

Habitat in insula Bourbonis Commis. herb. mus.

Caulis volubilis, inæcans. foliola mollesima. stipula subulata. Racemi  
5-6 flori. Legumina 3 eq. pollicaria  
nonne jam habes ex India Orient. ? affinis ovalifolia.



Simplex Glycine foliis cordatis subrotundis venoso-reticulatis rugosis, racemis axillaribus  
brevissimis

Habitat in America Herb. Mus.

# Stipula Rami villosi, in canis, angulati. Folia tripollicaria, latitudine et longitudi-  
nate lanceolata, <sup>terse</sup> ne squalia, utrinque villosula. Bract Petioli pollicari vel parum ultra  
colorato, <sup>res</sup> seto <sup>res</sup> versus apicem petioli. # Racemi petioli parum breviores. Flores  
vix, semi <sup>res</sup> unguiculati plures. Bractea setacea, uti calyces villosi

~~parviflora~~ Glycine

Glycine parviflora Lu Mart

Habitat herb. Fus.

Podula oblonga, subtus villosula. Racemi axillares. Legumina angusta,  
linearia apice stylo hamata, trif. trijollucaria, geminata glabra.

prospice

tenuicaulis Glycine foliis ovatis glabris, pedunculis elongatis capillaribus trifloris, legumi-  
nibus dispermis.

Phaseolus americanus tenuissimus viticulis saepe propagens Tournef. F. R. herb. 414.

Habitat in America herb. Guobici

Caules volubiles, retrorsum villosuli, striati. Folia longe pedicelata, juniora  
one lentis subtus adpersa pilis raris: foliola bipolliciana, lateralia altero  
latere, rarius angustiora. Stipula parva, oblonga, obtusa. Pedunculi  
gemini, alter brevissimus uniflorus, alter elongatus, superne villosus bif-  
triflorus. Flores remotissimi. Bractea duo parva, oblonga, obtusissima,  
canescentes. Legumina fere polliciana, plerumque disperma, interdum  
trisperma, lineari-oblonga, compressa, utrinque acuta, glabra, margi-  
ne pillosa  
at potius specus Dolichos?!

Glycine

Habitat. ad Fontana

Legumina nutantia, villosa, acinaciformia, pollicaria caulis fere  
parva latiora, compressa.

Subquadri flora Glycine pedunculis subquadri floris, leguminibus acina 2. for-  
mibus subtripermis villofoliis, folioliis rhombeo-ovatis

Habitat ex herb. Desfont. Hort. Parf.

Caulis volubilis, retrosum hispida, filiformis. Folia ca. 2 pollicaria, veno-  
sa, lateralibus ut in congenitis, acuta glabra. Stylus oblongus, obtusus.  
Pedunculi petalo duplo brevior 3-4 flori. Flores alterni parvi. Legumen  
vix pollicare, compressum, basi attenuatum.  
quod vendit in Les Martini. Dictionario.

Faci Dolichonum

uncinata Glycine Leguminibus linearibus hirsutis apice uncinatis, folioli ovato lanceo-  
latis subtus incanis

Habitat in Domingo herb. Desfontaine

Caulis volubilis, superne villosus, angulatus. Folia petiolata: foliola pesqui polli-  
cana, unguem vix lata, supra circulo armato villosa viridia, subtus incana margine  
costa que flarescentia, obtusiuscula, mucronata. Pedunculi axillares brevissimi  
bi- triflori. Flores pedicellati. Legumen bi-3 pollicare lorde flavo villosa

*Phaseoloides Glycine*

*Abros trifolia* La Martk. herb. Desfont. St. Domingo

Caulis fruticosus, volubilis. Rami glabri. Foliole rhombico-ovata, parva  
minora quam in specimine Adrii, supra glabra, subtus villosa, reticulato  
punctis resinosis et in quamplurimis speciebus, 1-2 pollicaria lateraliter in  
ter<sup>medio</sup>na parva minore, acuta. Stipula subulata. Racemi axillares,  
compositi, folio multo longiore. Calyces ope latis villosi; dentibus quinque  
lanceolatis, inferior reliquis parum major et angustior. Flores mediores;  
legumina oblonga, semipollicaria, medio angustata, 2 sperma, acuta

tetraphylla Glycine foliis pennatis cum pinnis bijnis obovatis glabris

Habitat in Domino Desfontaine 722

Caulis volubilis, glaber, ramosus angulosus tenuis. foliola unguicularia,  
interdum pinnam acuminata, punctata. Legumina venella linearia.



emarginata Glycine foliolis oblongis glaberrimis nitidis emarginatis, racemis axillaribus foliis squarribus

Habitat in Domingo herb La Revellera le Peau 5

Caulis fruticosus, volubilis, teres, glaber. Folia petiolata, ternata. Foliole polliciana vel <sup>lateralis minor</sup> minor, impunctata, <sup>laevi</sup>laeva, venosa, subtus pallidissima viridia. Stipula ovata, decidua. Petioli longitudine foliolorum. Racemi axillares, folio vix longiores 4-5 flori. Calyx campanulatus: laciniis ovatis, villosis. Corolla violacea. Legumina compressa, laevicollata, sesqui polliciana.

+ *Tetragona Glycine villosa*, folioli ovato-oblongi subtus foveatis, racemis brevibus, caule

*Tetragono*.

Habitat in Domingo herb. La Revellere le Paux.

Vernata

Caulis volubilis, retrosum villosus, inanis, mollissimus, angulis acutis. Folia peltata: foliola tripolliciana, oblique nervosa utrinque villosa, basi ovata, apice obtusissima, parum emarginata, avenia, in punctata, lateralia altero latere unguiculata. Stipula parva, subulata, Petiolus bipollicaris. Pedunculi axillares, vix pollicares, 6-7 flori. Calycis laciniis subulata. Legumina compressa, angusta, apice hamosa, bipolliciana, pulvis flavescentibus hirsuta. Terminus uncinatus forte.

refescens Glycine foliis simplicibus cordato-oblongis caulibus hirsutis, racemis axil-  
laribus

Habitat herb. Tusc. America?

Caulis teres, volubilis, uti stipulo, folia juniora, pedunculati, calycis legu-  
minibusque a pilis raris hirsuti. Folia saepe bipolliciana, obtusa veno-  
sa, subtus reticulata, adultiora supra glabra, subtus venis et nervis  
pilosis. Stipulo lanceolata, feminea striata. Pedunculi axillares  
foliis breviores, 4 flori, nutantes. Legumina unguiculata, sperma.

microphylla *Phlegma foliolis ovatis acutis villosi acutis, pedunculis axillaribus*  
bifloris

Habitat in Bonania Commerson ex herb. Guss.

Caules basi fruticosi, superne <sup>3</sup>volubiles apice <sup>4</sup>filiformes, rami <sup>2</sup>tenues,  
subtilis sive villosi, canescentes. <sup>5</sup>~~Sol~~ <sup>folia</sup> ~~ternata~~. Soliola unguiculata, ~~venata~~, supra  
avenia, subtus venosa, ora lenti adpersa punctis nitentibus. Stipula  
pubulata. Pedunculi breves, villosi.

aurca fl. foliolis obovatis in medio subthombes suballeg. villosis <sup>invenis</sup>  
~~trifloris~~ <sup>trifloris</sup> ~~leguminibus~~ <sup>leguminibus</sup> subrotundis pilosis <sup>capitatis</sup> compressis

Habitat in India orientali <sup>herb. h. h.</sup> Rottler

Caulis <sup>herb. h. h.</sup> filiformis pilosus. folia volubilis folia petiolata <sup>subtus venosa</sup>  
foliola parva obovata vel subrotunda in medio saepe thombes  
rotundato. <sup>tripliciter</sup> <sup>minuta</sup> ovata. Pediculi longitudinae  
foliorum triflori. Legumina <sup>contortum</sup> semicirculana uni vel  
bisperma pilosa transversim striata rugosa

affinis fl. nummulari

biflora fl. foliis ovato rhombicis mucronatis villosi pubes reticulatis  
pedunculis ac illanibus bifloris brevissimis  
Habitat in India orientali Rottler

Arctium Stictium Stictium  
primis floribus ovato mucronatis paucifloris

Aerostichum alatum pennis omnibus alternis: sterilibus oblongo-ovatis  
semulatis, ~~fertilibus~~ ~~oblongo-~~ compressis

bimaculata Glycin. foliis simplicibus cordato lanceolatis venis  
multifloris Curt. bot. mag. pag. 263. tab. 263

Habitat in nova Zelandia

caulis volubilis floris bimaculato

~~manuscript~~



27. *Tunica* G. foliis simplicibus lanceolatis floribus solitariis axillaribus  
vix pedunculatis

Habitat ad Cap. b. <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>pice</sup>

~~Rami~~ <sup>Caulis</sup> teretes striati. <sup>pilosi</sup> ~~folia~~ petiolata pollicina attenuata  
avenia, margine striata pilosa. Sepala ovata acuminata  
nervosa longitudine petiolorum. Pedunculi longitudine striati  
canum, bractea lanceolata ad basin calycis uti lacinis caly-  
cis lanceolata margine pilosa. Stylum striatum

26 Monophylla G. foliis simplicibus cordatis, caule pubescente Inquetro Lin. Mant.  
101. + L. V. p. 660.

Leno elatines foliis singulari; verno pilosa floribus luteis Pluken.  
amalt. h. 131. t. 454. fig. 8.

Protalaria africana B.

Habitat ad Cap. b. p.

Caules bipedales ramosi, crassiusculi, decumbentes <sup>pub</sup> pilosi.  
Stipulae binae ovatae nervosae. Folioleae unguiculatae <sup>pub</sup> sesquialterae  
marginatae et caninae pilosae, mucronatae. Peduncululi axillares  
res solitarii uniflori capillares petiolo longiori. Corolla rotunda

7 monoica *G. foliis Vernatis nudi in spulis*, <sup>oblongis</sup> caulebus pilosis, racemis pendulis,  
floribus fructiferis apetalis Lin. *Spec. pl. pag 1023* &  
*Phacelia americana* - supra et infra terram fructus generis Boesh.

*aug 16. 2. p. 20*

*Glycine bracteata* Lin *Spec. pl. ed. 1. p. 754.*

Habitat in America septentrionali umbrosi modis &

*Glycine comosa* Jacq.

Caulis retrosum inflexo ~~allope pilosus~~ - stipula ovata erecta  
~~foliola pollicaria emarginata~~ - Legumen semine uno altero  
se. Pedunculis inferioribus longioribus dependentes uniflori

rudimento pestilli  
apetalis  
floris facie sicis craticis



nomine Vest. Muthard  
Syn. e Boesh. hort

15  
~~reflexa~~ *G. foliis ternatis ovato rhombeis <sup>acutis</sup> glabra pectus puae refracto*  
~~punctatis racemis axillaribus~~  
~~Habitata in India orientali? <sup>Forst.</sup> ~~Forst.~~~~

*Caulis* ~~fusci~~ angulati volubiles angulis subpelosi. *Folia*  
*catenata* petiolata. foliola pollicaria <sup>opposita</sup> & petioli vix conspicui <sup>submol</sup>  
*leaves* ~~mucronata~~ seta duo ad petiolum folii terminali  
*Pedunculis* folio duplo longiores multiflori. *Legumina*  
*disticta* solitaria disperma pubescentia basi acuta  
*unguiculata* arbor novem *caem* ~~non ferent~~

*Phaseoli* minimis foetidus floribus spicati & vidi luteo  
semine maculato *Blasn.* *herb. Jam.* t. p. 102. v. 115. fig. 1.

*Dolicho* minimis floribus luteis *Hort. Cliff.* 360 t. 21.

*minimus* *Dolicho* leguminibus racemosis subtetraspermis foliis  
rhombeis acutis vellosis *Phaseoli* fructu minimo semine  
glycine ~~areolato~~ *Blasn.* *Lab. Suriani*

*Phaseoli* in Ind. ~~est~~ *Deatulo*

~~est~~ *Dolicho* minimus ~~videtur~~ ad femina *fusca* in mea nec cineres *pedic*  
tata cum *fig.* *hort. Cliff.* ~~tamen~~ *convenit*

reflexa glauci folioli ovati obtusi racemis elongatis, floribus pendulis  
stipulis subulatis reflexis.

Habitat in amica Topp.

volubili Simonsi G. minus diversa foliorum obtusi <sup>subrotunda</sup> intermedio rhombes  
f. nec ovato floribus majoribus. Coetenum foliola glabra  
puberulo oculo armato spinoso punctata venosa lacina  
calycis ovata acuta flores unguiculari caulis glaber  
racemi floriferi erecti

huic forte pertinet

Phaeocolis maderapetalus 2. spermos foliis minoribus P. A. hort. pet.  
foliola rhombes subrotunda glabra, racemi longi. vel ad G. minus  
herb. Mus.

16 canbosa g. folio ternatis subrotatis: folioli rhombis racemis petalis  
caymenibus hifatis, caule fruticoso Hort. Kew. 3. p. 34. Jacq.

coll. 1. p. 66.

Habitat in India orientali 5

multifloris. foliis obtusis <sup>glabris</sup> intermediis obovatis, racemis elongatis nutantibus  
floribus pendulis.

Habitat in India orientali

volubili caulis striatus ope lenticis <sup>da</sup> <sup>polliciana</sup> <sup>seproso</sup> <sup>penni</sup>  
satis, per venosa nervi ope lenticis <sup>lateralium</sup> <sup>oblongo</sup>  
subrotunda <sup>medio</sup> <sup>globosa</sup>. Racemi folio longiores arcuati  
nutantes. flores conopsea alterni calycis lacinis lanceolatis  
similibus proxi

Scaraboides ♂ foliis ovatis tomentosis, floribus solitariis seminebus biornibus.

Lin. Fl. Zeyl. 2024. 1. V

Phaseolus minimus brachyanthus, foliis argenteo-velutis, plegiis  
torosis brevibus, radice hispida pubescentibus; fructu parvo siccis  
booidi nigro Planch. aln. 290. 1. 52. fig. 3.

Habitat in India

Cuculis purpurascens ramifera ramis superne cinereo velutis. Sola  
petiolata. foliola oblonga, molliter veluta, cinerascens  
unguiculata lateralia minora supra subnigra subtus  
venis reticulata. Stipula ovata minutissima. Peduncululi axil-  
lares biflori vel uniflori. Legumina polliciana hispida spina  
Caneana articuli 5 que  
varietatem folii sequi polliciana

Scaraboides foliis oblongis subtomentosis subtus reticulatis leguminibus  
subsolitariis torosis hispitis seminebus biornibus

Herb. Mus. (Phaseolus Zeylanicus, foliis subtus mollibus et hispitis P. B. prodr.  
364  
ovatus phaseoloides Zeylanicus foliis subtus incanis pubescentibus 359  
a n. potius glycine



Inquetra Glyc.  
glycinoides H.

W

Soliolis ovalibus subtus canis, Racemis axillaribus  
leguminibus <sup>ramis Inquetrae pilosae</sup> rufatis pomis

Habitat in India Thunbergi

Caulis basi lignosus ramosus rami Inquetrae pilosae. Solcia  
breve petiolata. Soliola sesquipedalis cana <sup>canis</sup> subequalia  
obtusata lateralia interne angustiora supra pilosa <sup>canis</sup> subtus  
unicana <sup>canis</sup> subtomentosa. Stipulae canaliculatae subulatae  
nervosae. Radiculi axillares longitudine foliorum apice  
flores tres <sup>pauciores</sup> vel quatuor. germen in pili longis albidis totum  
vestitum flores lutei. Calicis ovata superne basi  
globosa

forte potius species glycinis vel cisaffinis

microphylla fl. tomentosa in una folioli lateralibus acuti intermedio  
rhombico subrotundo laevibus raris diffusis  
Habitat in Arabia Ferkat.  
solubilis tunc incana. folio<sup>rum</sup> unguiculati mollissima subter  
venoso reticulata. Racemi axillares bipollicares. flores pauci  
distantes reflexi. Ceylonem semipollicare  
Affinis siarabaeide.

vidund folia ~~sp.~~ foliis subrotundis subhis subvellosois & tunculatis racemis  
axillaribus

Ononis flava Forsk.

Habitat in Arabia &

Rami <sup>sternati angulati vellosi subconspicentes</sup> foliola unguis  
subtus <sup>retinosa pedicellata</sup>

tulana lateralibus parum minoribus et nervis rotunda

Racemi folio <sup>sterni</sup> longi al paululus longiores lacinis calycis  
ovatis.

nudata

~~Cates~~

ff. foliis ~~obovatis~~ <sup>obovatis</sup> glabris obtusissimis catenulis obovatis internodiis  
obcordatis leguminibus racemosis subsessilibus.

Habitat in Reylone

Volubilis caulis tenax fructus ope lentis velis reperi ad secundum locum  
elevatatus. folia petiolata foliola renquivalaria venoso subrecti  
curvata. oculo armato punctis minus conspicuis minutis forma intermedium solum  
emarginatum stipulae minutae. Racemi subsessiles. papilion  
flor. patentissimis. floris reflexis remotis. Calicis calycis  
subulata.

nigosa

Glycyne. folioli subrotundi villosi venose nigosi reticulati, floribus racemosis, caule ~~erecto~~ villosi vixi obo

Habitat in India orientali 5

Trunculus ramosis saepe uti rami villosi vixi obo. <sup>latitalia panem minor</sup> Polia petis

ca uagiuularia utraque villosa p<sup>o</sup> reticulata pubtus. venis elevatis obtusa latitalia latere extenore latiora

Pedunculi axillares folio longiori filiformi flores 4-5 que remotissimi Calyx pubescenti vixi obo laciniis linearibus obtusis. Legumen rot uagiuularia pubescenti. Vexis legumine ovata, super acuta <sup>ad</sup> apicem altero latere angustiora <sup>thes</sup> me calyx panem longior

solubiles

6 *Cabalis* *G. volubilis*, foliis ternatis obovatis puberulis, floribus axillaribus  
congestis, corolla sublobata Lin. Suppl. p. 325 \* P. V. p. 660

Habitat in India orientali

Caules volubiles cespitii feli. Folia petiolata; foliola obtusa, aequalia  
puberula vix tomentosa. Nervis nullis. Flores brevissimi pedunculati.  
Calyx tubulosus subaequalis. Corolla alba magnitudine centis. Legumen lineare compressum quasi articulare  
vix. Semina septem ad novem subrotunda compressa lineari

3 nummulana 9. foliis ternatis obtusissimis, racemi floribus geminis, Legumi-  
nibus sessilibus suborbiculatis compressis Lin Naant 571. + L. V. p. 660  
Habitat in India orientali <sup>ubi omnes reliquae partes plantae</sup>

Caulis volubilis pubescens <sup>strigatus</sup> <sup>venos reticulata</sup> Follicula cuneato orbicula-  
ta pollicina aequalia lateralibus altero latere angustiora  
sessilia, omnia caetera quam longa obtusissima. Petioli  
saepe foliis duplo longiores. Stipula ovata dividua. Pedun-  
culare solitarii filiformes foliis longiores. Flores parvi  
sessiles <sup>remot.</sup> in <sup>der</sup> B. Legumina compressa majori  
tudine Pisi majori compressa, rugosa, stylo mucronata.

Coriinea Glyc. foliolis subrotundis undulatis, pedunculis subflos  
no. Quart. bot. mag. p. 270 no 276

Habitu in nova zelandia 3

Legumina linearis sesqui pollicaria obtusa. Vexillum  
basi macula obcordata flava

~~no. 276~~



14 comosa *G. foliis* <sup>oblongis emarginatis</sup> *ternatis* hirsutis, racemis lateralibus. Ger. t. V. p. 6594

*Phaseolus marianus* scandens, floribus cernosis Pet. Mus. 453.

Habitat in Virginia umbrosi madidi ¶

Foliola oblonga pollicaria emarginata. racemi  
circa octoflori

gronovii synonyma dubia. Planta Haeyu. a Gronov. est nil  
aliud quam varietas hirsuta glycyne monocis

Inflores

Gl. foliolis oblongis subtomentosis pedunculis trifloris leguminibus.

<sup>ultrap</sup>  
torosis hispido-pentapinnis

Habitata India orientali

rotundata

Folia mollia facies siamboidis <sup>et folia peruviana</sup> et foliola tripto majora caulis  
petiolis et calycibus ruffis tomentosis. folia minus incana et minus  
reticulata coeternum simili an modo varietas

reticulata Glycine <sup>Glycine</sup> foliis ternatis ovato oblongis subhombes pubescentibus,  
subtus reticulato-venosi.

Glycine reticulata foliis ternatis oblongo-lanceolatis pubescentibus  
subtus reticulato-venosi, racemis axillaribus subsessilibus,  
leguminibus oblongis compressis Sw. prodr. p. 105.

# Caulis volubilis, angulatus, molliter villosus, subcanescentis.

Obliqua petiolata: foliolo petiolata, ~~intermediam subthorac-~~  
~~icam, lateralibus~~ <sup>parvis minoribus</sup> ~~extus gibbata, intus lanceolata~~ <sup>semisecta</sup>  
~~sequi pollucosa~~, <sup>omnia</sup> acuta, utrinque villosa, mollia, subrugosa,  
subtus reticulata, pallidiora.

Petioles tomentosi. Stipulae ovato.

Racemi axillares, solitarii, foliis longiores. Pedicelli solitarii,  
diffantes. Bracteae ovato, alternato deciduae.

Radicis quinquefidi: laciniis subulatis, linearilanceolatis,  
<sup>attenuatis</sup>  
Legumen oblongum, utrinque acutum, pubescens, propositum  
marginibus, sufficium. Semina duo

Ex India occidentali  
misit Dr. Presl. West

Ced. folium ~~Rhus Colicis terminalis foliolis~~ ~~leptilibus~~ ~~lineantibus~~ ~~revolutis~~ ~~subtus ferrugineis~~

Habitat in C. b. p. u. t.

Rami glabri. folia brevissime petiolata: foliola cuneata, supra sequipedal  
liciana, mucronata supra glabra medio sulcata, subtus gemi-  
nis & latibus foliolonum revolutis. Panícula terminalis staxil-  
laxa

Rhus frutescens, folis trifidis lineantibus acuminatis Burm  
af. 251. t. 91. fig. 1.

8 Tomentosa 9. foliis Ternatis Tomentosi, racemis brevissimis axillaribus; Legumi-  
nibus dispermis Lin. 1. V. Faëgu. hort. 2. 4. 101.

Anonis phaeoloides scandens; floribus floris seplibus Dill.

Elth. 304. 26. fig. 24.

Folios pubescens volubilis caule pubescente Leguminibus  
terminis seplibus compressis pilosis nutantibus. Lin. Spei.  
pl. pereg. 10214

Habitat in America 4

pubescens mollis. Foliola supra mundiuscula, inter medio  
subrotunda; laterales ex his gibbi, intus lanceolati  
Termini axillares Terni breviter pedunculati, albo flavescenti  
Ves <sup>mutata</sup> <sup>in</sup> <sup>purpurascens</sup> <sup>in</sup> <sup>retallo</sup> macula <sup>in</sup> <sup>retallo</sup>. Legumina oblonga pube-  
scentia, panem recurvata

Tomentosa 9

pedunculis trifloris axillaribus brevissimis

Paulis volubilis - Folia Ternata et simplicia Dedit Auctor

~~Soluto pubescens hinc putat~~

12-13 p. 12 Glycine <sup>Glycine</sup> foliis ternatis lanceolatis villosis, racemis axilla ribus pedunculatis,  
caula erecto panicato

27 Pithecolobium violaceum foliis ternatis, oblongis, angustis, hirsutis, supra viridibus, subtus  
rufescentibus; Legumini bus compressis Aubl. fl. Guian. p. 766. Tab. 306.

In insula Trinacis legit Dr. von Korr.

Indiculus erectus, ramifus. Rami angulati, striati, vilis purpura scenti  
bus. subtomentosi.

Folia pedunculata, remota: foliola pedunculata, <sup>bif. Tripollucana,</sup> lanceolata, attenuata,  
<sup>albidiore</sup> utrinque villosa, mollia, supra lineata, subtus venoso-reticulata  
albidiore, venis purpura scenti tomentosi.

Pedunculi brevissimus. Stipula oppositifolia, subbifida: laciniis  
subulatis

Pedunculi axillares, solitarii, foliis duplo breviores, tomentosi, basi  
bracteis geminis, a lternis, approximatis, ovatis. Pedicelli breves

calyx canescens, bilabiatus.

(An diversa a Glycine reticulata Sw. prod. pag. 105)

ovalifolia gl. foliis oblongis obtusis subtus villosis, pedunculis ~~undulatis~~  
brevibus trifloris leguminibus linearibus falcatis inanis  
Habitat in India occidentali

Caulis & volubilis cauli tener villosis. Siliola pollicaria  
utrinque obtusa apice mucronata supra vixit fere oculos  
muto altis ramulis adpressa subtus vixi canescentia stipula  
parvo subulso. Calyx vix villosus. Legumina bipolliciana  
ex transversa mucronata villosa, mucrone brevi terminata.

ovalifolia forte diversa herb. mus.

Phaseolus maderaspatanus et vixit fere oculos fere oculos  
herb. pl. vol. 3. append. herb. mus.

filiiformis. G. folioli oblongis <sup>acatis</sup> glabris racemis brevibus leguminibus linearibus mucronato uncinatis.

Habitat in India orientali. Rottler

Caulis filiiformis subvillosus caespitans. folia et foliola petiolata foliola ut pollicaria venosa, submucronata. stipulae nervo subulato. racemi axillares foliis breviores. flores. rari calycis coriani. legumen bipollicaria ore lente subvillosum hamum curvatum compressum

Phaeolus madagascariensis Cleburnis facie scelyus angustioribus Razi hist. pl. s. app.

Folia sesquipollicaria oblonga, racemi longitudine foliorum  
ret. n. s.



12 *Stenota*  $\gamma$  volubilis, foliis ternatis oblongi mollis formae incanis, racemis axillaribus, foliorum longitudine, leguminibus hirsutis formis Gen. Suppl. p. 326.  
P. L. p. 660 — Paquet. bot. 1. p. 32. t. 76.

Habitat in America Torrida.  $\gamma$

Caulis volubilis uti tota planta pubescens. Folia petiolata  
Foliola sequi polliciana lateralia parva parum minorum  
mucronata, petiolata. Petiolus communis longitudine folio-  
lorum. Squala subulata. Ramemus foliis longior.  
Floris distantes 2. 3. simul. Legumen compressum acuminatum  
apertum. Semina plura reniformia nitida.

*La manthii* florata est nec seneca

4 *Sebilis* J. foliis ternatis. folioli ovalibus subtus pilosis, leguminibus  
subsolitariis lineariibus polyspermis; stylo persistenti erecto Hort.  
Herb. 3. p. 34.

Habitat in India orientali. J

non vid.

rubricanda glycini foliis oblongis, pedunculis <sup>heb</sup> trifloris  
Cart. bot. mag. pag. 260. Tab. 260  
Habitat in Nova valleja 5

non vidi

1 Subterranea 9 foliis ternatis radicalibus, caulebus procumbentibus - flexuo-  
sis, pedunculis bifloris Lin. Dec. 37. t. 17. Lin. Spec. pl. pag. 1023.  
*Anachis africana* Burm. afr. ind.

Mandubi de angola Mart. gr. Bras. 43. Raj. hist. 919.

Habitat in Brasilia, Surinamo ☉

Soleola oblonga, nuda, obtusifolia: petiolo erecto palmari

Inguetro. Caules palmares, plures, terni ante adpressi, flexuo-  
sissimi foliosi. Pedunculi axillares brevissimi cernui bi-  
flori ternis seplis. Bractea duo ovata, calyci incumbente

Calyx quadrisfidus superne emarginata. Legumen subter-  
raforme utroque acutiusculum Lin.

13 villosa g. foliis ternatis trilobis villosi, racemis axillaribus Thurb. fl. jap. p. 283 +  
L. v. pag. 659.

Habitat in Japonia.

Caulis feli formis angulatus volubilis, teri tota planta tomentosa  
Folia petiolata. Colicula omnia, in primis intermedium, triloba  
acuta nervosa semipollicaria; intermedium majus et longius  
petiolatum. Racemus 2. 4. 5 floris. Legumen tomentosum  
Thurb.

non vidi.

2 *Triloba* G. foliis ternatis foliolis lobatis, caule prostrato, pedunculis bifloris  
Lin. Mant. 516. S.V. 659. Murr. in 162. T. 50. Fig. 1.

*Dolichos trilobatus* Lin. Mant. 101.

*Phaeolus maderaspatanus cauliculis pilosis* scandens passiflora  
modo *trilobatus* Pluken. alm. 292. T. 20. fig. 3

*Dolichos trilobatus* volubilis *pelopis*, foliolis trifidis Lin. Mant. 101. \*

*Dolichos trilobus*  
herb. mus.

Habitatio India O

foliola sub  
rhombica, latitudi-  
ne et longitudine  
aequalia: lobi exten-

ter, rotundato, inter  
medio ovato non alen-  
gato, pedunculi bi-  
flori. Stipulae parvae  
ovatae un eadem.

4 autis, uti petioli, folia. Et pedunculi ad presens pilis rarioribus.  
folia petiolata. foliola petiolata: alia ovato subrotunda integra  
alia intermedium interdum utroque gibbo angulata interdum  
obovata Indica laciniis lateralibus linearibus intermedia curva  
stipula ovata adnata. duo alia minuta laciolata inter  
folia lateralia tant. pedunculus longitudine foliorum biflori.

*Phaeolus maderaspatanus auriculatus trilobatus glaber Ray. h.*  
3. opp. 247. no. 32.

Habitus flosum *Dolichi* an *Dolichos trilobus* spec. plant eadem planta  
sed americana secund. Hort Cliff. differre videtur quoque stipulae  
maiores et figura foliorum

canboa glycine foliis ternatis subullosi foliolis rhombicis racemis patulis, leguminibus  
hispidis, caule fruticoso H. Kew. 3. p. 34.  
glycine canboa Jacq. Coll. 1. p. 66.

Habitat in Canboa 5 ramis uti folia ad lentem villosi  
Caules glabri. Rami herbacei: Folia ternata, petiolata: foliolis rhombicis acutis  
Rami quae stipulae breves, ferrugineae. Racemio ad alas foliorum laterales: graciles  
elongatis multiflori, interdum ramulo acuti Corolla frava. Corolla 2-petala  
Legumen oblongum compressum pollicare hispido mucronatum. Semina plerum  
que duo

9 phaeoloides fr. foliis ternatis subtus villosi, racemis terminalibus  
Sw. prodr. 109.

Phaeolus florum spica pyramidata, femine coccineis, nigra  
macula notata Plum. cat. 12.

glycine 2. Brown. Jan. 296.

Habitat in Jamaica, Domingo.

volubilis

Rauli <sup>compressis</sup> <sup>trijugis</sup> <sup>angulatis</sup> superne canescens. folia petiolata  
foliola 3 pollicata lateralia ovata intermedium  
ovato-~~rhombum~~ <sup>ovata</sup> omnia acuta supra glabra subtus veno  
sa canescentia <sup>reticulata</sup> pedunculis axillari petalo corosporis  
longior. floris coccis. Legumina breviter pedunculata  
Legumina tomento tenui ferrugineo tecta mucronati, semipolli-  
caser torulosi. fucula subtus oculo armato repens  
punctata. Semina ut in libro peccatoris

Abno in foliatis La Mart. herb. La M.

foliola

Dolichos pyramidatus La Mart. her. hab  
Fusp



10 javanica G foliis ternatis, caule villos, pediculis hirsutis, bracteis lanceolatis  
minutis. Lin. Spec. pl. pag. 1024 +

Habitat in India

Caulis volubilis thapsali, adpressis pilis flavis retroflexis. Foliis  
thapsali. Pedicelli flavi pilis densi. Stipulae ad petiolum  
ovales oblongae, ad pedunculum vero lanceolatae. Pedunculi  
longitudine foliorum, terminali spica ovata-oblonga,  
densa: floribus nutantibus volucris interstinctis. Bracteis  
minutissimis Lin.

22 *suaveolens* G. fruticosa erecta incana, foliis ternatis ovatis acutis, flori-  
bus axillaribus solitariis, leguminibus dispermis Lin. Suppl. p. 326.  
S. V. pag. 660.

Habitat adtra ripas prope Madras &  
Totus frutex, pubescens viscosus *suaveolens*. Folia petiolata  
foliola pappipolluciana aequalia. Stipulae petiolaria.  
Pedunculi axillares erecti filiformes, in medio articula-  
ti et bracteati uniflori, bractea basi, subulata cadu-  
ca. Flores cernui. Calyx campanulatus quadrynar-  
tibus. Corolla flava. Legumen compressum oblongum  
subrotundum ferrugineum pubescens *dispermum*.  
Semina negra, glabra: coriolo calloso albo

*suaveolens* fruticosa erecta pubescens viscosa, foliis ternatis ovatis  
acuminatis, legumibus pedunculis axillaribus solitariis legu-  
minibus dispermis

acuminata

fl. folioli ovatis acuminatis subtus villosi, racemis  
astillanbus

Habitat in amonia meridionali v. Robi

Volubilis Rami villosi canescentes. <sup>sempiter</sup> Foliola petiolata

intermedium se rhombes ovatum supra glabra subtus

randi canescentia bi / tripollicaria. Racemi foliis

brevioris. Bracteo lanceolata acuminata longitudine

calycis. Calyx canescens vexillum et corne extus  
villosa

herpata Glycine <sup>ovata velosa</sup> foliis ~~lateralibus~~ ovatis ~~intermediis~~ oblongis <sup>saeculis</sup>  
elongatis ~~floribus~~ aggregatis leguminibus linearibus <sup>longis</sup> ~~foliis~~ <sup>artibus</sup>  
latis hirsutis compressis

Habitat in India occidentali v. Prokr  
Semina abri praicatorum

descript in her amenc.

aggregata gl. folioli ovati villosi, caule rami retrosum pilosi, racemis  
axillaribus floribus retroflexis eque aggregati

*Dolichos sinensis* Corchhaloi

Habitat in Arabia

Rami in praeteri retro pilis frequentibus retro versis adpressi.  
Soleola fo ovata utraque acuta intermedium subtropilli  
care pubis pallidior utraque villosa venis nervi margini  
busque juniorum flavescientibus. Racemi axillares folio  
longiori floribus distanti plerumque et ad scopulum den  
tem parvi calyx pilosus. Legumina polluciana lineari  
acuta villosa

*acuminata glycerine*

scabra gl. foliis ovatis, puberulis, racemis axillaribus  
Habitat in ambu. Toph.

Rami superne villosi. Foliole ovata acuta mucronata per  
ma venosa ope centi villosula. Stipula lanceolata striata  
villosa Racemi folio longiores flores gemini

Planta obscura cum specimen laud optimis

triangular

~~ff. folioli ovatis acutis lineatis umbellis axillari-  
bus, ramis triquetris flexuosis Retz. off. 3. pag 20  
Habitat in Java~~



11 bituminosa g. foliis ternatis, floribus racemosis, Leguminibus tumidis villosis  
Linn. Spec. pl. pag. 1024. + P.V

*Phaseolus africanus* hispitus bituminosus, floribus flavis papilionibus  
piliquis bullatis, flore flavo Heron. Lugd. 492. V. 493.

Habitat in Cap. b. p. 4

Caulis volubilis obtusangulus pubescenti viscosus. Soliola  
ovata petiolata acuta, basin versus dilatata lateraliter tantum  
latere extenore interno angustiora, pollicaria supra  
glabra subtus pubescentia. Nipula lanceolata nervosa  
racemi axillaris foliis longioribus paucifloris. Calycis lacini  
res lineares. Corolla lutea lobata vexillum extus  
hirsuta, bullata cotyledonis.

Phaseolus occidentalis fructus salsapitensis siliquis, fructu ovali nigris  
et cineris punctis elegantibus guttatis B. prod. Plukh. t. 52.

Phaseolus americanus siliquis, foliis parvis rhomboides acutis  
Raj. hist. 3. append. 1009  
Anonis phaseoloides bituminosa scandens Tournef. G. 4