

Glycyrrhiza

1. glabra G. leguminibus glabris, ^{racemosis} stipulis nullis, foliolo impari petiolato, caule fibroso, floribus racemosis.
2. hirsuta G. leguminibus ~~setis~~ ~~ramentaceis~~ glutinosi racemosis, folio impari petiolato, stipulis lanceolatis
3. asperima G. leguminibus articulato nodosis aruales, caule hispido, folio impari petiolato, stipulis lanceolatis
4. echinata G. leguminibus ceteratis capitatis, caule glabro, foliis bipulatis: foliolo impari sespli

foet. D - Glycyrrhiza

Habitat

herb. Desfont.

- Caulis erectus, striatus, angulatus, striatus, resinoso-punctatus, coctenus glaber.
Folia petiolata, 3-4 juga: foliola oblonga, venosa, acuta, glabra, vix pollicari
na, resinoso-punctata, opposita. Stipulae foliolatae. Racemi axillares, fo-
lulo longiores, multiflori, post pedunculati post casum florum denticulati
oclosos patentes. Legumina semipollicaria, hispida.

4 Echinata G. leguminibus echinatis, foliis stipulatis, folio impari sespili l.
cauli lavi floribus capitatis
Inscript. p. 10764, aequi hort. sub. 95

Dulcis radice Cam. epit. 423.

Glycyrrhiza capite echinatis Bauh. pin. 352.

Habitat in gargano apulia, in deserto Nazario Tatano &

caulis subtilis pme striatus superne angulatus, glaber. folia penna
ta cum impari quadrijuga: foliola oblonga breviter petiolata

terminale sespili microkata polliciana, extensa parum mi
petiolus magi nova, glabra orulo armato punctata. stipula ^{ovato-} canaliculata attenu
nata
to pamiunguiculari. Pedunculis axillares solitarii pollicares
flores in spica globosa.

omnis similes - China in herb. Guss. vidi. Leguminum spina
longa, stipula minuta, folia 6juga: foliolum terminale sespili

astrogaloides fl. corymbis articulato nodosi, caule glabro
foliis ovali oblongis impari petiolato.

Hedyformis rostratum Tournef.

Habitat prope Constantinopolim

Cauli ramisque superne subrotundis foliis petiolatis supra

goleola pollicaria ed. x unum ultra exserta corham

aeterna obtusissima glabra. Radicibus terminalibus

quadricelli alterni corymbis villosa 1. 2. 3. perma

Hylo subulato Verminata

Erucum ponticum alopecuroides perenne fructu longissimis
Tournef. Cor. herb Tournef.

asperissima G. Leguminibus glabris? foliis ellipticis cuspidatis, caule hispido
bro Lin. Suppl. p. 330 & V. pag. 669

Glycyrrhiza aspera Pall. A. 1. p. 499 Tab. III. fig. 3.

Glycyrrhiza hispida Pall. id. 3. p. 754 Tab. G. g. fig. 1. 2.

Habitat in arenosis inter Wolgam et Taurum & Methamoi

Habitat Astragali, Radix dulcis Conyza. Caulis bini vel terni
capitulosi natuli hispidi. Coleola obovata petiolata, tri- vel quadripepa
omnino petiolata, unguiculata subtus et margine hispida, mucro
nata extrorsum majora. Stipula mini lanceolata attenuata Pedun-
culi terminalis flores oppositi vel alterni rariemofi rariemofi
longitudine foliorum Legumina nodosa articulata anuata

asperissima G. Leguminibus articulato nodosis, ^{aristatis} caule hispido, foliis impari-
petiolato, stipulis lanceolatis

Caulis erectus, spithameus angulatus flectuosus. uti petioli, pedun-
culi foliosque subtus adspersi setis rigidis. Folia 4-5 peya: foliula
oblonga unguiculata, mucrone purpente terminata, utraque ob-
versae & Pall. mutata ~~novae~~ recte

supra, supra glabra, nervosa venosa. Stipula ovata. Pedunculis axilla-
res et terminales, longitudine foliorum. Flores racemosi, frequentes. Brac-
teis lanceolatis. Calycis glabrescens colorati herb. mus.

1 glabra G. Leguminibus glabris, spinulis nullis, foliolo impari petiolato Linn.
Zucca scabra Algeribus, raemopi

Pres. pl. p. 10464

Glycyrrhiza vulgaris Dod. pempt. 341.

Glycyrrhiza flicquosa et *germanica* Bauh. pin. 352.

Habitat in Transonia, Gallia, Hispania, Italia &

Caules herbaceus erectus bipedalis, falcatus, et stematis raris uti
petioli et pedunculi, scaber. Folia pinnata cum impari
sequa. foliola opla petiolata et opposita oblonga, acuta interdum

Petiolus villosus emarginata, glabra punctis minutis adpresso, pollicaria. Raie
Ves. trifidus mi axillares erecti longitudine foliorum. Flores alteri ^{inaxi} distantes
bractea membranacea ad basin squuli pedicelli

variatur interdum caule non appeso

Spinula rariore in leguminibus interdum observari Pallas

^{propto glo}
Zherfuta G Leguminibus hirsuta, folio impari petiolato L. V.
Glycyrrhiza orientalis, siliquis hirsutispmis Tournes. corol. 26.
Habitat in oriente.

Caulis v. ens pubescens. Folia pennata ^{parva}: foliola omnia petio-
lata, opposita canaliculata oblonga, pollicis aeq, obtusissima, glabra
subtus pallidiora. Petiolus pubescens stipula ^{canaliculata} nulla. Racemus
axillaris erectus. ^{longitudine subaequalis} Flores alterni. Legumina ^{cinerea} canaliculata ^{ta aequa}
utraque acuta ^{fusca}
affrasi glabra ^{amentaceas glutinosas}

Zherfuta G Leguminibus ^{fatis glandulosis hirsutis}, folio impari ^{fusca} petiolo
^{canaliculato} stipulis nullis, floribus racemosis