

Graphalium

\*\*\* \*\* felagynoidea

retusum G. foliis linearibus subtus incanis apice retusis mucronatis, floribus sessilibus

spicatum G. caulebus simplicibus, floribus verticillatis, foliis fasciculatis linearibus

resolutis  
polyanthemum G. incanum, foliis linearibus, capitulis axillaribus sessilibus

lyvaticum G. caule simplicissimo erecto, foliis linearibus lanceolatis nervosis,

floribus paucis  
norvegicum G. caule simplicissimo erecto, foliis lanceolatis nervosis, floribus paucis

supinum G. caule simplicissimo procumbente, foliis linearibus utrinque incanis, flori-

bus paucis  
oculei coti G. caule prostrato, foliis ovatis glomeratis terminalibus villosissimis

verticillatum G. caule simplicissimo, floribus verticillatis, foliis linearibus

uleynosum G. caule ramoso diffuso, floribus corymbis terminalibus

indicum G. foliis lanceolatis, caule ramosisimo diffuso, corymbis inaequalibus  
calycibus intus coloratis

tenerum G. Canatum, foliis petiolatis. Punciformibus, floribus axillaribus terminali-  
busque glomeratis  
glomeratum G. caule diffuso, calycibus squamis interioribus subulatis nudis, foliis sub  
amplexicaulibus

herb  
mus

Sci-  
hu

Sci-  
Sci-  
Sci-  
Sci-



nali  
sub

herb  
mus  
des  
Inj

1. Gnaphalium e bonani, pusilla foliis tridentatis lincatis. Caules plures ad pres  
dentes
2. Caules simplicissimi, interrupte pucati
- 3 monte video, maximum foliis linearibus, caule superne ramoso, flores pucati  
t
4. monte video floribus ferdide aureis. Folia radicialia aggregata, innata, acie  
trispinula utrimque utraque incana
- 5 in sabuletis monte video. Paucis Gn. sylvestris, caulis ramoso
6. Elichysum africanum tomentosum, Cavandulo folio, floribus aureis glomera  
tis Vaillant
7. Gn. alpinum minus Longo polygoni folio Borione
- 8 Stoechar inodorum  
Caules fruticosi. Folia frequentissima, patentia, margine revoluta, supra gla  
bra, subtus tomentosa, uti rami superne. Corymbi terminalis congesti herb. Desf.
9. Elichysum indicum, foliis baccinibus ad crispis capitulis minoribus  
Caulis simplex semipedalis herb. Desfont
10. Gnaphalium fruticosum t  
totum incanum. Caulis ramosissimus, spithameus, subdichotomus. Rami breves  
flores 3-5que terminales subsler
- 11 e cap. 6 pucati  
Caules semipedales, erecti basi ramosi.

herb  
Desfont  
qui com  
munit

12 gr. candidissimum la Mart

13 pini folium la M.

Facies felaginis deortogod e feto mayellan.

14 Jernytle folium

caulis ramosus

15 spadiceum

16 Capitulatum v3

fruticifera dichotomia, interdum rami quo in opice. & olea pubulato, reflexa  
& loes verminales et in dichotomia populus. Calycis lanata.

17 diffusum

herb

Thoum

quidam



glomeratum G. caule diffuso, calycibus squamis interioribus subulatis nudis, foliis puberulis  
Mexicanis Berg. Cap. 251. L. V. p. 749. Lin. Spei: pag. 1200\*

Habitat ad Cap. b. Spei O.

Statura G. uliginosi. Caules ramosi filiformes tomentopercani uti tota plan-  
ta, spithamei lati. Folia distantia spatulata oblonga obtusa, vix  
uniquiculata. Flori terminali proles ramorum et ramulorum ipsi plerumque  
termini sed et folioli fructum foliorum inno lucrat. Calycis basi lanato  
quam interiori longiore, subulata, canaliculata, ferruginea glabra  
recurva nuda

— spatulata

redolens (fr. caule herbaceo) foliis lanceolatis decurrentibus lanceolatis subtus  
villosis  
hirsuto incanis, capitulis terminalibus globosis  
habitat in C. b. pro Foster deo & Fabricius?

Caule, erectus, herbaceus, suppone in ramos duplus a foliis decurren-  
tibus alatus inter alatus villosus, incanus. Folia lanceolata basi  
attenuata, infima in petiolum marginatum subtus densè villosa  
incanis, supra villosa, minus villosa, & retuse pectinatis margine  
pennam revoluta, mucronata <sup>per quibusdam</sup> ramorum omnino. Ramo-  
rum <sup>ubi dichotomi</sup> apices in pedunculis brevibus duplus altus brevior

pedunculis dicto <sup>ramo breviori</sup> monophyllis altero altero est in parvis lateralis interdum  
solitarius interdum gemini foetosi. Flores sessiles in capitulo  
globoso magnitudine fere cerasi parvi basi pilis involucriati, qua  
albida linearis angustissima



*denudatum* q. foliis serrulatis pubes nives. ~~Xeromorphis supra Coribus in Suppl. p. 364.~~

L. V. p. 744.

Habitat ad R. b. spec.

americanum *G. herbaceum*, foliis radicalibus lingulato-lanceolatis subtus niveis, caule  
simplici erecto tomentoso, floribus spicatis lateralibusque sessilibus congestis  
hs. p. 112

*Gnaphalium* ad floccitatem citrinam accedens Sloan cat. jam. 125

*Gnaphalium* l. Brown jam. 310.

*Gnaphalium americanum* Mill. Dict.

Habitat in Jamaica  $\odot$

*Chrysanthemum latifolium* floribus conglomeratis Tournef. *Fl. v. h.*



undulatum & foliis subsessilibus canicollatis undulatis acutis subtus tomentosis, caule  
ramos. Lin. S. V. p. 740

*Electryum graveolens acutifolium*, caule alato D. D. Cl. Th. p. 30. t. 100. fig. 130.

Habitat in Africa

Caulis sesquipedalis teres striatus superne leviter canescens. Folia canis-  
cata attenuata bipinnaria et ultra subtus incana supra glabra  
caulina decurrentia altero latere totaliter altero ad dimidiam  
ramorum minus decurrentia. Corymbi terminales subsessiles. Calycis  
nitidi albido flavescenti

Walth. dwarf form det. Hutchins

involueratum G. foliis linearibus cuneatis elongatis mucronatis subtus tomentosis,  
capitulo terminali folioso

Gnaphalium involueratum herbaeum, foliis linearibus elongatis  
mucronatis subtus tomentosis, capitulo terminali folioso Forst  
prodr. no. 291.

Habitat in nova zelandia

Caulis herbaeus, <sup>ramosus</sup> filiformis lanato tomentosus, debilis, superne ni  
scus. Folia linearibus lanceolata bipinnatis, integris infer  
ne versus basin in petiolum attenuata oramine revoluta  
supra glabra subtus tomentosa lanata. Flores termina  
les capitati, foliis stellatis involueratis.



obtusifolium G, foliis lanceolatis caule tomentoso paniculato, floribus glomeratis conici-  
cis terminalibus Lin. Spec. pl. pag. 119 et L. V. p. 740.

Helichrysum Chrysocomo graphalodes virginiana annua, foliis obtusioribus,  
capitulis argenteis conglobatis Mon. h. 3. p. 80. f. 7. t. 10. fig. 19.

Helichrysum obtusifolium, capitulis argenteis conglobatis Mon. h. 3. p. 80. f. 7. t. 10.  
Dill. Elth. 1030. t. 100. f. 131.

Habitat in Virginia, Pennsylvania O

Caulis erectus, sesquipedalis, in superne ramosus, tomentosus, canisus. Folia  
lanceolata, recurvata, bipollicaria, nudiuscula. Flores terminales,  
conglobati, inaequales, subsessiles. Calyces conici, albi, acuti.

Dubito num specimen herbarii huius pertinet vel ad margaritaceum si mea  
nonnulli <sup>cum</sup> obtusifolium huius <sup>est</sup> margaritaceo vix affinis est, habitus vero vene-  
rior folia in acumine minus producta tamen non obtusa, Calycis nudiore  
videtur folia basi versus angustiora, bipollicaria subtus caniscentia minus  
tamen quam in margaritaceo, rami superne, florum subsessile.  
Squamae Calycis basi tomentosi squamae sessile, plerumque in singulis ramis  
conymbi. Squamae lanceolatae obtusa

Caulis simplicis <sup>lemi</sup> pedalis herb. Desfont

margaritaceum Jacq; foliis linear-lanceolatis acuminatis alternis, caule superne ramoso,  
corymbis fastigiatis Len. S. V. p. 74 O. Gmel. sub. 2. p. 107

Gnaphalium americanum Clef. hist. 1. p. 327

Gnaphalium latifolium americanum Baub. pin. 2 63.

Habitat in America septentrionali, Kamtschatka & 4

Rami etc. folia subtus lanato-tomentosi. Solia sessilia, utraque attenuata,  
acuta, supra vix distincta lana tenui adpressa bis: tripollicaria.  
Corymbi terminales pedunculati nudi. Calycis albi, squama infima sub  
tomentoso reliqua glabra ovata-oblonga obtusa vix retusa

---

attenuatis subtus lanato-tomentosis



purpureum G. foliis lanceolatis nudis, caule erecto simplicissimo, floribus spicatis termi-  
nalibus lateralibus. Lin. l. v. p. 748.

*Elechrysum spicatum* obtusifolium basi angustiori Dill. Elth. 131. t. 109.  
f. 132.

Habitat in America septentrionali

non vidi descriptionem confeci ex herb. L. Mantk. uti planta am. bor.

*C. nereum* Gr. foliis linearibus integris, calycibus cernis 8-10

fl. pag. 210

Habitat

michi ignota .



arabicum fr. foliis lanceolatis remotis petiolatis supra pilosis  
integris, corymbis terminalibus, caule ramoso tomentoso fl. ant

pag 210

Habitat

Mishi cyntha

cinereifolium gn. foliis lanceatis oblongis subpinnatis calycibus cineris  
Dorseth-fl. Amb. pag 210  
Habitat.

non vidi



repens 9. foliis linearibus caule repente recto, ramis erectis simplicibus <sup>et</sup> fimbriatis hinc Mart

283. \* S.V. p. 747.

Habitat ad C. b. p. 7

Caulis <sup>et</sup> repens, radice <sup>et</sup> simplicibus filiformi. fructu angulati quadrilateri  
rami frequentes alterni, ascendentes, quidam pollicares et ultra  
foliosi et floriferi. <sup>villis canescentibus</sup> folia filiformia frequentia approximata  
sunt fimbriata, subacuta, patentia obtusa, crispu  
cula supra planiuscula subtus convexa. Flores in cyma terminati  
sunt globosi <sup>glomerati</sup> magnitudine nuclei cerasi. Calycis parvi glabri, sunt mag  
nitudine foveae Cannabis, rubro flavescenti paululum nitidi

deductum 9. foliis linear-lanceolatis, calycibus radio albo lanceolato Lin. Suppl.

p. 358. \* S. V. p. 1249

Habitat ad Cap. b. p. p.

Caulis prostratus, herbaceus, siliiformis. <sup>linearis, uti tota planta</sup> Folia lanceolato-linearia, terne tomen  
tosa alba, <sup>temperata, uti tota planta</sup> nitida, conferta. <sup>ramis tergestis</sup> Corymbis terminalis fastigiatus <sup>simplex</sup> apophyllus  
Calycis ovatis cori, setaceo serioso: radio albo, lanceolato. Stipuli  
multi in calyce parvi. Lin

naudi



*pelosellum* G. foliis lanceolatis quinque nervis subtus tomentosis, caule nudo. (Cambis capite  
in Lin. Suppl. p. 364. & S. V. p. 744)

Habitat ad Cap. b. p. 2

Folia tria sive quatuor, radicalia, elliptica, obtusiuscula, subtus albo  
tomentosa, quinque nervia. Rapius foliis duplo longior, pilosus. Flores  
terminales in capitulum glomerati. Calycis subrotundi, villosi, mar-  
gine albidis. Lin.

non vidi

multicaule 9 tomentoso incana foliis cuneatis, radicalibus, caulibus linearibus, simplicibus  
pubescentibus

Habitat in Cap. Insula francie Commenstrada de Thouin 74

Caulis <sup>herbacei</sup> plures ex eodem radice, digitales, adpendentes, simplicissimi  
foliis <sup>radicalia</sup> tectis, incani uti toto planta. folia ad singulum caulem aggrega-  
ta, unguiculata, patentia, <sup>radicalia</sup> sive semperque lato, integerrima utrin-  
que incana, caulini approximata, linearibus lanceolata, basi parum  
angustiora obtusa erecto-patentia, <sup>radicalium</sup> radice longitudine radicalium sed  
parum angustiora. Flores <sup>obovate conici</sup> terminaliter <sup>hemisphaerici</sup> sessiles in capitulo basi foliis can-  
to magis nuda corollae <sup>cinereae</sup> <sup>radicalium</sup> dimidio minoris squama est albida exte-  
mo basi nuda tomentoso intimo lanceolata acuta cinnamomea apice patula  
Calycis alii steriles alii fertiles



Discretz Unona

unona diffeeta Lin. Suppl. pag. 270 + L.V. pag. 509.

Habitat in Surinamo

Cespitosa. G. incano tomentosa, foliis linear lanceolata, <sup>pub</sup> conycauleibus sim-  
plicibus; conycaulis terminalibus simplicibus.

Habitat in Insula Franco Commenso Thonua 4

Radix lignosa crassitie penno <sup>superiore</sup> <sup>caulis</sup> caulis plures digitales  
erecti uti tota planta tomento densa cineris simplicissimi. Colica  
ad basin aggregata, longiora, pollicaria obtusifolia inaequalia  
plana patentia, caulina distantia. Conycaulis terminalibus pedun-  
culi laterales subtriflori sessiles intermediis recurvatis solitarii  
piper nigro paulo majori ad basin foliolo uno vel altero Calyxes  
basii tomentosi. Squamae linear lanceolatae acutiusculae albae  
flosi flavi



antanthium *g. incano* tomentoso, foliis radicalibus linearibus cuneatis superioribus  
linearibus cymbo simplici

Habitat ad fructum maritimum, Comnesor Thonin

Facies *gnaphalii diorii*, <sup>utriusque formae et in plantis</sup> ad folia utraque incana foliis caulibus lon-  
gioribus patentioribus, ceterum planta digitalis tota in-  
cane tomentosa folia pollicaria, caulibus paululum majora  
flores in cymbo simplici terminali folium ad basin pedun-  
culi squama calycina lanceolata oblonga obtusa albo, basi macula  
fusa infans tomentosa videtur esse *doxia*

Sordidum *G. lanato-tomentosum*, foliis lineariibus apice membrana setacea appendiculatis  
floribus subumbellatis

Habitat

Dad. Dr Thoun

Habitus *G. divici*: caule herbaceo folisque lanato tomentosi, simplicibus pro  
erecto. Folia sessilia linearia bipollucaria, saepe alterna & stantia  
superiora acutius membranula fusca setacea terminata. Flores magnitudi-  
næ *G. divici*. Squama linearis lanceolata ferruginea fusca minime  
nitida



plantagineum J. Lam. prostratis procurrentibus, caule simplicissimo, foliis ro-  
diculis ovatis maximis Lin. Spei: pl. p. 1199 & L. V. p. 740.

Gnaphalium plantagine folio, virginianum Pluk. alm. 171. t. 340. fig. 9.

Habitat in Virginia &

Habitu margaritacei; sed folia radicealia pollis majora, ovalia. Divica, an  
tantum varietas Gn. Divici.

divicium g. farmentis prociumbentibus, caula simplicisimis, corymbo simplicii, floribus divi-  
Ed. Lin. l. v. p. 174 d.

mas. Pilosella minor Dod. pempt. 60. f. exterior

Graphaleum montanum flore rotundiore. Bauh. pin. 263.

foerana B Pilosella minor Dod. pempt. 60. f. exterior

Graphaleum montanum, longiore folio folio Bauh. pin. 263.

Habitat in Europa aridis apricis &

Caulis palmari vel pama ultra adpressus foliis linearibus subtus <sup>prostratis</sup> inae-  
nis, simplicisimis ~~in~~ tomentosis. folia plus radicealia ~~concolor~~  
mura supra glabra subtus in zona sanguiviana mucrone termi-  
nata. Corymbus terminali flori primum hemisphaerici maturitate  
oblongi. Squama oblonga albida ~~abte~~ interdum est tenoci per  
purascentes, obtusa minime nitida. Oculi fuscescentes

foliis ~~radicalibus~~ ~~fraternalis~~ foliis radicalibus lanceiformibus supra  
glabris



alpinum q. Sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, apophyllo capitulo, floribus oblon-

gis Lin. Spe. p. 1197, Ek. Don. 4. 332 L. S. p. 748

Graphaleum alpinum minus Benth. pen. 264.

Dilago alpina minor erecta Scheuchz. alp. 133.

Habitat in Alpidibus Lapponicis, Helveticis

Dacis Graphal-doriai <sup>subumbellato</sup> foliis caule, sarmentis ad radicem. Flores terminaliter  
pauci conferti, absque foliis. Calyx cylindricus basi sessile, sepe meo pidi-  
di lanceolatis, acutis, erectis, apice membranaceis. Doriae secundum Ken-

radicibus  
foliis cuneiformibus supra glabri

resellum ja



9. foliis linearibus subtus incanis apice retusis mucronatis floribus sessilibus  
subcapitatae cylindricae

Habitat in Bonaria Comneson Thaurin

Radix fibrosa, caulis plures vel caulis basi in ramos tres vel quatuor  
divisi rami adscendentes simplicis semi, interdum in ramo centati  
superne in nullo brevi florifero, superne intoni, palmarci. Folia  
fere Euphorbiae exigua retusa, linearia semisagittata cauliculis, ungui-  
cularia basi versus parum angustata supra glabra margine subreflexo  
subtus incano apice truncata, emarginata cum mucrone. Flores  
in axillis supremis conferti. Calycis cylindrici fere unguicularis glabra  
intidi squama exteriore lanceolata hyalina interiori linearis  
dorso vixide apice margineque hyalino. Semina velleta in  
cana, pappi plumosus, receptaculum nudum

Lupinum 9. caule simpliciter procumbente, floribus paucis Syt. nat. 3. p. 234.

Gnaphalium sibiricum Cavand. de foliis. Bot. mus. 107. t. 85.

Gnaphalium oblongo folio Scheuch alp. 2. p. 174.

Habitat in alpebus Helveticis

Planta subcaespitosa. Caulis digitalis, tomentosi uti folia, simplicissimi adscen-  
dentes. Folia ad radicem aggregata linearia ut extus vix latiora sunt  
angustiora 2-5 in caule remota. Flores superae sespales magnitudine  
filomatici, sespales albescentes approximati in axillis foliorum. Squama  
calycis lanceolata sordida flavescentes fuscis marginata

Stylis caule simpliciter spino, spica pauciflora terminata Hall. herb.

n. 144

Folia lineantibus utraque incanis

~~Folia simpliciter simpliciter simpliciter~~



4950 Spicata Graphalium <sup>herbaceis</sup> caulibus simplicibus, <sup>Graphalium</sup> floribus verticillatis, <sup>Saxiculatis, revolutis</sup> foliis linearibus ~~glabris~~.

Tilago egyptiaca pumila spicata Hortus sicus Petiverni  
Delago Cyperis minor spicata Petrus. Garoph. no 457. Tab. P. fig. 12. omnis.

Phryso oma spicata Corf. Cat. pl. Aegypt. pag. 73. n. 433.

Caulis plures herbae erecti, simplicis summi, ascendentes, digitales glabri, foliis floribus que beati

Folia saxiculata, linearia, inequalia, caecuta, revoluta, supra glabra, subtus submentosa, <sup>hinc</sup> unguicularia, suprema longiora.

Flores ex omnibus axillis a basi caulis usque ad apicem, glomerati, minuti.

Calycis quam bracteis, ferreus, nitido, ovato lanicolato.

(Ob habitum huius retuli, cum flores ob parvitatem in speciminibus sicis examinare non potui. Graphalium verticillatum nunquam vidi, ideoque dubitavi quomodo an differret vel non, ex descriptione enim Suppl. data nil certi statuere licet)

sub nomine cauliflori in herb. Desfont

*Spica*



multiflori polyandrum  
~~axillari~~

*G. incanum* foliis linearibus capitulis axillaribus sessilibus

Habitat in monte video Comtesse Rouin

*G. sylvaticum* caulis herbaceus <sup>et floribus per</sup> uti folia tamentosis; ramis; ramis  
alternis breves erecti stipuli folia bipollicaria frequentia patentia  
plana mucrone fusco terminata. flores ex omnibus fere axillis calicibus  
et ramorum in capitulo glomerato subsessile. Siliola calycina lan-  
ceolata flavo ferruginei nitenti

an foliatum la Mont

*Q. foliis lanceolatis undulatis subferratis pilosis corymbis terminalibus*



*Delphinoides herbacea*  
Sylvaticum g. caule simplicissimo erecto, floribus spicatis Lin. S. V. p. 749.  
gnaphalium majus angustifolium oblongo folio, alternum Bauh. pin  
263.

gnaphalium rectum Bauh. hist. 3. p. 160

Habitat in Europa sylvis arenosis &

Caules interdum pedales, erecti, simplicissimi a medio ad apicem  
floriferi <sup>ut supra in spica dicitur sunt</sup> calice <sup>calice</sup> spicati albedo lanati ut folia. Folia alterna  
bi-3 pollicaria lineari lanceolata superius versus angustiora  
inferne attenuata integerrima, supra lana tenui tecta viridia  
acuta. Flores in axillis foliorum 2-3. Sepala squamis lanceola  
tis margine & apice <sup>dentatis</sup> folia folia floralia inferiora caly  
cibus longiora superiora basin evanescenter

Jussum La Martini herb. 7us

foliis lineari lanceolatis crevis  
major ramosa

varietatem misit Bellardi ~~ramosa~~ spici floribus spicatis ex omnibus  
axillis squamis nitidis pallide ferrugineis

Norvegicum *G.* caule simplicissimo erecto foliis lanceolatis nervosis, floribus  
gracis

*Gnaphalium* fl. Dan. tab. 254. fl. Norv. n. 841.

*Gnaphalium* Norvegicum caule herbaceo simplicissimo erecto, foliis  
lanceolatis basi angustatis, floribus gracis, calycibus acutis  
nigrescentibus Petrii prod. no 902.

Habitat in Gronlandia, Islandia et alpebus Norvegiae

Habitus omnino *G. sylv.* ut fere varietas differt foliis triplo  
latioribus longioribus nervosis, Calycibus a nigro fuscescen-  
tibus

medium villarii herb. mus.

hanc *Sylvestricum* Linnæi esse contendit Smith in Brit. fl.  
plants veritas autem quod erant



oculis catis & caule prostrato, foliis ovatis glomeratis terminalibus vellosissimis Lin. Suppl.

p. 364. \* P. v. p. 744

Habitat ad C. b. p. c.

Caules filiformes, plerumque undique diffusis, subramosi, decumbentis, a caulis  
apice parum crassiores lanato tomentosi. Folia obovata vel subspathula  
to, lanato tomentosa. Et semper in lanis. Flores in glomerulis termi-  
nalibus, planiusculis lanis densa in orbiculis coherentibus foliis basi  
cinctis. Calyx ob tomentum densissimum album non conspicuus.  
Corolla parva, lutea, quasi umbellata in tomento

verticillatum G. caule simplicissimo, floribus verticillatis, foliis lineariibus Lin. Suppl. 364.

\* L. V. p. 749.

Habitat ad Q. b. p. c. 0.

Radix fibrosa. Caulis sylvaticus erectus simplicissimus, albus. Folia  
lineana angustissima. Flores per totum caulem verticillati ses. ples.  
Planta tota cinerea, ut etiam flores. Affinis G. sylvaticis Lin.

non vidi



uliginosum G. caule ramoso diffuso, floribus confertis terminalibus Lin. l. V. p. 749.

Fl. Dan. t. 854.

Gnaphalium longifolium humile ramosum, capitulis nigris Raj. herb. 295. Angl. 3. p. 110.

Habitat in Europa paludibus, ubi aquae stagnant O

Caulis ramosus palmaris nives lanatus. Rami alterni patentissimi  
folia linearia polliciana vel parum ultra extensa sensim parum  
catiora mucrone minuto terminata, integerrima. Flores in summitate  
in axillis foliorum sessiles conferti. Squamae calycinis sordide fusciscentes  
nitentes

indicum g. foliis lanceolatis, cauli ramosissimo diffusis; corymbis inaequalibus, calycibus intus  
coloratis Lin. fl. reyl. 3. 07 x V. p. 740

Gnaphalium latior folio, minus ramosum, capitulis pallescentibus Plukenet  
alm. 172. t. 107. fig. 5.

Habitat in India. C. b. p. 2

Cacres g. uliginosi. Caulis ramosissimus, palmans et ultra diffusus  
tomentosus, uti folia, <sup>incaeris</sup> folia alterna, lanceolata, <sup>infepta</sup> basi cespitosa  
attenuata, integerrima. Corymbi terminales ramorum parvis. Flores  
parvi. Calycium squama ovata laevio, unguate difformi squama dilata  
tis, rotundatis, albis; hinc flores fusi corona alba Lin.



tenero *J. Canatum* foliis <sup>petiolatis</sup> unciniformibus; floribus axillaribus terminalibus  
que glomeratis

Habitat in cop. b. <sup>peii</sup>

Habitat in: uliginosi caule ramisque simplicibus filiformibus <sup>nalmani</sup>  
uti folia et glomeruli florum lanatis. Folia pollicaria basi vesp  
attenuata subper in petiolum plana acuta Corymbi axillaris folio  
dual duplo brevior folia <sup>sub</sup> glomerulis florum calycis basi lanata  
squamo lineari obtusa nitida pallide flavescens

file file