

Gnaphalium

- + foliis argenteis
extimum *G. foliis sessilibus ovatis confertis eredit tomentosis, cymbo sessili*
Caniguttatum *grandiflorum G. foliis amplexicaulis ovatis tomentosis utrinque caniguttata* Cyma
terminali pedunculata
fructuans *G. foliis ovatis amplexicaulis trinervis subtus tomentosis; floribus*
capitulis terminalibus sessilibus.
sericeum *G. foliis lanceolatis nervosis utrinque ferrugineis siccis, et cymbis ver-*
maliali foliis
Ecclatneatum *G. foliis lanceolatis trinervis tomentosis, ramis annulato-*
terminalibus *Cnidatis, cymbis*
milleflorum *G. foliis lanceolatis vi resistentibus, cymbis fastigiatis ne-*
sessenti albidis, calycibus subcylindricis
emarginatum *G. foliis subtus tomentosis supra scabris: radicalibus petiolatis oblongi*
caulinis amplexicaulibus oblongi (an potius inter herbaeas pallor hanc)
arboreum *G. foliis sessilibus lanceolatis supra glabris margine revolutis, floribus subca-*
pitaliis, pedunculis elongatis

difolorum g. foliis sessilibus lanceolatis, calycibus albi: squamus inferiores incarnatis.
appendiculatum g. foliis sessilibus imbricatis lanceolatis apice membranaceis pani-

sa appendiculatis midas glandulatis
stellatum g. foliis sessilibus lanceolatis vellosis, calycibus acutis extus incarnatis.
Coronatum g. foliis sessilibus lanceolatis, corymbis compostris sessilibus, pedunculis apyl-
ler, calycibus coronatilomentosis

Cavandulifolium g. foliis lanceolatis subtus inaneis supra ramulisque piloso-sabi-
tis scabiosis

rosmarinifolium g. foliis sessilibus lanceolatis margine revolutis, supra scabios subtus
lomentosis, floribus corymbosis

humile g. foliis linearibus cuneiformibus ramulorum inani, floribus corymbosis; squa-
misi calycinis lanceolatis capitulo apice reflexis

hispidum g. foliis linearibus semiteretibus, foliis exstansis hispidis petulis, capitulis ver-
miculibus simplicibus non hirsutis genere Panus plumosus est

virgatum g. foliis subulatis mucronatis supra canescensibus, floribus umbellatis
mucronatum g. foliis sessilibus subulatis mucronatis, umbella composita, calycibus

subtriangularibus cylindricis
umbellatum g. foliis sessilibus subulatis tortis, umbellis simplicibus terminatis
sessilibus

concretae verticis culp

fastigiatum G. foliis verticibus glabriusculis, ramulis fastigatis, calycibus subgeminis sessilibus
basi vellosa - incanus int. exornatus niveis
enivider G. foliis sessilibus linearibus; calycibus ext. exornatus nudibus int. exornatus niveis
nativi
verticifolium G. foliis confertis verticibus squamis, corymbis ramosis, calycibus ext. v. ferrugineis
niveis

xx. *gracilis* *Lycopoma*

microstachys G. foliis subulatis mucronatis, squamis calycinis rotundatis
strobularia G. foliis linearibus subtilis incanus, corymbo composto, rami virgatis
ferrugineum G. incano-tomentosum, foliis linearibus, floribus corymbosis glomeratis ferrugines
ignescens G. foliis sublan. exfoliatis tomentosis sessilibus, corymbis alternis congregatis, flori
bus globoſis.
parviflorum G. incanum, foliis linearibus subcorduplicato caninatis undulatis apice re
flexo petiolis obtusis, cyma terminali
reclusum G. incanum, foliis linearibus corduplicato-caninatis margine planis
apice glabro reflexo, floribus cymosis
Terratum G. foliis amplecticaulibus lanceolatis ferratis supra nudis
rubiginosum G. incanum, foliis lanceolatis margine reflexis, corymbis terminalibus latiss
calycibus ferrugineis nudi

Eymosum G. foliis lanceolatis triangulari supra viridi pubescentibus subtus albo tomen-
to, cymis terminalibus.

orientale G. foliis linear-lanceolatis sessilibus, cymbo comperto, pedunculis elonga-

ta. Erasifolium G. foliis lato-lanceolatis subpetiolatis coniacis tomentosis, cymbo com-
perto, caule proliquo.

manticum G. ramosissimum, foliis lanceolatis sessilibus acutisquamulis, calycinis inti-
mis squamis auris

cylindricolum G.
radulum G. foliis ampliis caulinis spatulatis, cymbis aggregatis ramis patentibus

petiolatum G. foliis ordinis integerrimi petiolatis, floribus confertis terminalibus

spatulatum G. linearis tomentosum, foliis spatulatis undulatis bafi angustis dilatatis
amplicaulibus, cyme terminali

xx * herbaea chrysocoma

cylindricum G. foliis sessilibus oblongis tomentosis, cymbo inaequali, calycinis glabris
cylindricis sessilibus superioribus lanceolatis

pedunculare G. foliis spatulatis subamplexicaulinibus subtus tomentosis, calycinis

squamis acutisquamulis placentum G. linearis tomentosum, foliis planis inferioribus spatulatis superioribus subtri-
angulari, cymis decompositis, calycinis obtusis, somis placentis

nubifexi Graefskaliu[m] tormentosu[m] incasum foliis lineari bus supra Glabri
rami floriferi fastigiat i flori bus caputato s[ecundu]m plebis cylindricis
Habitat in aerea in v. Rohr n[on] 10

Caulis herbaceo adscendens ^{terro} ^{cc.} simplex ut folia subtriangularia
pedunculi publanoato tormentosie.

Folia ssp[erata] retorta nolleiana et paniculata ultra integra
ma supra diffusa pilis brevibus & hispidibus, vnde in aliis
rami floriferi feri superne, fastigiat sp[erata] forme.

Borei sed flesii Vermunalei ssp[erata] congesti.

Ralyces cylindrici pallide nubifexi nitidi
an albefexi sw.

dentatum Gr. foliis lanceiformibus dentatis, stipulis, cymbo simplici Rogier Lied

bat. 1514 S.V. pag. 746.

Roma aurea Meana, foliis obtusis tridentatis, capitulis oblongis Burm afr. 105-

T.C.D. fig. 3.

Habita in Otheopia t

Deleatur cum non diffat Athanasia flabellifera

minimum Gr. caule erecto ramoso, foliis lanceolatis acutis planis, floribus coni
et puberulentis lateraleibus terminalibusque Smith. & ang. 2. p. 873

Tilao minor Gerard em. 641.

Gnaphalium minimum Brach. hist. 3. p. 1. pag. 159. Lob. 4. p. 481.
Gnaphalium minimum erectum magis hist. Recd. 7. Feb. 11. fig. 3
Habitat in arenosis et glareosus frequens. ☺

Gnaphalium
Extrumum *Gnaphalium foliis sessilibus ovato congestis erectis tomentosis, corymbo sessili* Lin. Mant. 573 * S. V.
p. 745. Faecu. coll. L. p. 295.
Eleohrysum africanum foliis sessilibus panicolatis, capitulis congestis et rubello aureo
ans. t. 103.

Habitat in Capo. speit

Fruit est ramos crassitie digiti ut folia canato tomentosae; intus more lombu
li medulla replet. Et ova ovata Tripolitana erecta, ramos regentia indeger
rima, oblonga confertiora parvi, sessilia acutiuscula avenia. Corymbus
terminalis absque pedunculo communis, Pedunculis monophyllis prope uniflora
flores globosi, magnitudine extini articuli digiti embricati squamus subro
tundis, glabri, concolori obtusis, purpureis

grandiflorum g. foliis amplecticaulibus ovatis trinerviis utrigue lanuginosis
P. V. pag. 745. Berg. Cap. 245.

Gnaphalium Tomentosum, foliis in genibus subrotundis; superenobus acumi-
natis Burm. afr 213. 1. 76.

Habitat in Otheopia 5
Tame, illi folia Tomentosa - lanata. Folia amplecticaulia
approximata bipinnata, pinnas in latera superenobis remotis lanuginosae
attenuata. Pedunculus terminalis ^{folio vero vel altero} elongatus. Cyma terminalis
composita, hemisphaerica. Squama nitida ovata, acuta, glabra. Calyx
magisterius. g. oneatalis

Bergius habit folia 5 nervia supra vnde pectora

fructuoso. foliis ovatis amplecticaulibus, caule regente, cyma fasciata. Mant. 202.

PL. 74745

Habitat. ad L. b. sp. t.
Paulis fructuofus crassitatee digitii, rigidi; determinate ramosus; vellosus
foliis amplecticaulis, conferta, ovata, triangularia, obtusa mucronata
magnitudine extimi articuli pollicis; pubescentia tomentosa, supra vello
sa tandem denudanda. Flores terminales, congesti in capitulum
pefiple. Calyx extus flavis, intus albis. a grandi florō differt
floribus majoribus: foliis versis summatam non angustatis
glomeris florum non pedunculo communi pedunculato caule
legnose neffcente līn.

Līn descriptio optima. folia pollicana, obfusa triangularia, mucronata,
pubescentia tomentosa, foliis ppr. fere nieder, frequentia. Squamo extenso mino
niveo herb. Rogeni

floris non vidi

fernaceum q foliis lanceolatis nervis ferrugineis fendo nitidis conymbo terminali foliis.

Habitat in Apula Borboneo & Campania

remotus

Indet ramis teretibus & cicuticatis inferne annulatis cicatricatis & capitulo, ut folia percurrenti et basi calycum tomento ferrugineo
fusco aureo spissidante vestiti. Folia lanceolata 3 vel quatuor pollici
lata, pollicem lata, integerrima approximata obtusipila
subtriangularis, floralia ovato lanceolata pallidaria. Pedunculi
et axillae superiores in Conymbo magno hemisphaerio digesti. Flores
quoniam vel & hemisphaerii fistulis, pedis duplo majori. Squamae
lanceolatae sondide alba, et seniori obscuriori obfusciori, interiori
res adulteros reflecto. Corollula flava. Populus simplex

Heliotropolum La March

arenarius: Pon vol ~~velus~~ folius oblongis emarginatis basi trilobis integrise, peduncu-
lis unifloris, corollis infundibuliformibus, caule decumbente.

cicatricatum q. foliis Casuarinatis tormentosfera completae
foliis Casuarinatis tormentosfera Ramis subduktis rami cicatricatis conm
bo terminali

Habitat in Insula Palma Commissari Thonin 3

Trudet ramis terminalibus dichotomis superne foliis tormento denso vestiti
e capa foliorum pinni annulato cicatricati. Tolia semiamplexa aula
subtus obcurvata, biserrata, ^{acute} biserrata, ^{versispicea} mucronata, integerrima
^{Trinervia} plana, acuta, tormentosa. Cymbus terminalis ^{versispicea} glabro flos inv
cicatricatus foliis. Squame oblongo, niveo, nitido & loci magnitudine
pisi. Aliam

aliam ex Insula poli Francie huius organis similis nisi quod
folia tenuiora, tincta at minus tincta. Cymbus ^{Trinervia ex est foliis} Compositus. La
lyces flos foliis cinctus longitudine eisdem rot vers specie

Diversa

protegenter da Mar

confidetur ad his ^{rum} cum raro folio timenti.

que codolum Grapholium

habitat in Anjulo F. varia 5

Similis protocorda, sola eniana, flores nigro-antes herb Jus. de Thoun

trinervie In foliis sessilibus laniolatis Vines raro subtus argenteis
pannicula corymbosa terminali latae Dorst. prod. pag. 55
et tabita

non vnde

milleflorum. Gr. floribus corymbis fastigiatis inferenti albidis, calycibus pubescentibus

Driesen Len-Suppl. p. 362. & P. V. p. 747.

Hab. etat in Cap. 6 spec⁵

Caulis pedalis, valde canato tomentosus. folia crassifolia penne cyaneo-

folia lanceolata sime amplecticilia bis. triplacaria canata

tridentata folium late pedunculus communis elongatus adspersus foliis angustis lanceolatis remotis exponens

membrana arida ferruginea terminata. Corymbus termina-

ti compoitus magnus. folia arida membra nacea pallide

ferruginea castellata nitentia ad basim ramorum et ramulorum

calyx cylindricus crassifolia penne cyaneo unguiculans

glaber. Squama ovata oblonga obtusa f ferruginea fimbria

albo. Corolla flava

Phlomoides Ca Martini test Gust

— foliis lanceolatis canatis irrectibus

appendiculatis foliis fimbriatis ombriatis lanceolatis lanatis apice membra
nervosa plana appendiculatis his Suppl. p. 363. & t. V. p. 745

Habitat in C. b. specie usque ad cymam foliis vestiti
rami et folia lanata. Sola sequitur ana inferiora magis approximata.

Lemna peltata caulea superiore membrana brevi plana; glabra lente
genea terminalis, Rima terminalis globosa. Calyx oborati magni
tudine fere graph. orientalis squamo ovato glabro, acuto extenso
ferrugine pallide praeceps ferrugine vel superflue propositum apice basin
setifer et int. ms. flavae vix nitidæ

Cupulacrum laevatum forte. folia superiore membrana pubulata
terminalia Thomin. herb. quidam

(tricolourum)
caeruleum I. foliis pubescentibus supra scabri: radicalibus petiolatis oblongo;
undatum Caulis amplectens caulis undulatis Lin Suppl. p. 363 & S. V. p. 745.
Habitat in C. b. specie^t

inter majoris magna. Folia radicaria plura, petiolata, oblonga, integri-
ma, pubescentia tomentosa uti carnea et carnis, supra rubra
caulina amplectens caulis lanceolata 4-5 polliciana perfun-
diora basi dilatata margine reflexa, attenuata, undulata. Pan-
elis exsertus, simplicitermis 7 eis, cospicie penne appressis, sed ex-
tulor longissimus ^{un} deprimens. Pyram ^{compositus} terminalis magna pedunculata,
et pedunculis ⁱⁿ basi florum longis: griseis. Flores magnitu-
dine papilio ^{luteo} exaeque praeponit, interiore albi vel albido
flavescentes.

Crispum Lin. nomen triviale mutari cum jam sub hoc nomine aliud Gr-
eum in Systemate Speciebus habetur

arboreum g. foliis squalibus linearibus supra glabris margine revolutis, planis pubescentibus per anulus elongatis. Lin. Am. aead. 6. p. - n^o 53+

P. S. p. 745

Habitat ad Cap. b. sp. 1^o
Tristes altheae Ramis gracili terete lani. Folia f. supra glabra foliis exa rata sed
homines sunt a his incana plerumque vero vicina pedunculus terminalis
elongatus foliis uno vel altero diffusus. Flores in capitulis
globosis collecti oblongi. Squamis lanceolato capitate flaveentes
apice rubescendi interdum extenuo ferruginei intenore albi

Diploclorum g. foliis lesplebus lanceolatis calycibus albis; squamis inferioribus in
carinatis Linn.-spec: pl: pag 1191. & S.V. 745.
Gnaphalium frutescens Vomeatofem, foliis oblongo floribus cymosis Burm.
apr. 224. 8.79 fig. 4.

Gnaphalium pyramidale Berg

Habitat en. cap. 6 specit

Pauci suffructicif. Folia lanceolata, subter fomentoso - canata. Pedunculi
communiter elongati. Calycer glomerati: squamis inferioribus 6. brevioribus
in carinatis; interioribus duodecim aliis obtusis. Flores subgenui ha
bitum a carne lenoci non differt. Gola undulata.

a caerulea

fulvum la Martini herb Gurj.
foliola extenor ferruginea, intenor alba, folia lanceolata extrospic ^{ventata}
presentem herbas haec vix nisi varietas arbo. Burme vero diversa
non vidi. Planta sub hoc nomine a Thunb. multa est arborum

stellatum g. foliis fessibus lanceolatis vellosis, calyculis acutis estus incarnatis

Lin. Am. ac. 6p no 55. & Spec. pl. P. 1190 & S. V. p. 7640.

Gnaphalium Tomentosum, foliis undulatis, flore glauco Burm. agr. 225. t. 100. fig. 1

Habitat in P. b. Speci.

Canato-Tomentosum eretum. Caulis inferne ramosis rami erecti altitudine
caulis simplicis sparsi, alterni. Folia fessilia frequentia erecta, unguiculata
obtusa, undulata. Corymbus terminalis subplexus. Calycis evanescens
ab incarnatis squame lanceolato obtusifilo interiore albidior

coronatum q. foliis fessilibat lanceolatis, corymbis compotis lesplebus; pedunculis
aphyllis, Eolycebus coronatis. Lin-Spec. pl. pag. 1191. + P.V. 745.

Gnaphalium foliis oblongi acutis crassi et neanis, floribus albis umbellatis

Burm agr. 100. t. 6 fig. 3.

Habitat ad Cap. b. speci t.

Frutex Ramo teretibus, ut folia incani, tomentosi. Solia alterna
capit scapus angustata, unguem parum longiora obtusa mucrone
fusca vermunda, valde tomentosa. Ramuli ex aliis summos. Polygony
al compotis fere abique pedunculo communi. Pedicelli pedicella
partiales foliis subpetiolarioribus lateralibus inter medios longiori-
bus; fere ter apice calyces flosculi hispidae dense ferrugines hispidos
uti pedicelli subfusci, rathen squamo intensores apice dilata-
ti glabri albidi nivei.

lavandulifolium G. Solis cancellati subtus uncinis supra ~~frabiuſculis~~^{vel que}, rameo pels
ſinuſculis ~~frabiuſſis~~^{ſinuſculis}

Habitat in Madagascari Commerſor Thorin t

Rami teretis punctatis foliis superne et longioribus minutis
distincti frabiuſculi purpurascens. Solia ſeptem folia utrinque acu-
ta ſequi pollicana margine parum revoluta subtus. Tomentosa
meana ſupra videtis ſupra minutis copioſis ~~ſimili~~^{ſimili} crenatis vix
tamen ſtabro. Conybuli terminales compoſitus latus, foliolis
ad ramifications floreſ globofl. albido neſcenſtes magnitudi-
ne piperis ſquamis ovato

flores triple monos et quarn in coram onſiles

100 marni folium q. foliis pspilebus lanceolatis margine revoluti, supra scabros
subtus tomentosis, floribus cymosif.

Habitat in Q. b. spie ~~in~~ ad Balow.

Cauli frustis opis ramosus. ramis erectis tomentosi inaeani. Solieri
sem subfeme completa caulia lanceolata margine revoluta
subundulata unguiculata inferne confestiora superne remotis
ra f acuta, patentia supra scaberrimo subtus tomentosa
pedunculus terminalis elongatus. Flores primum pubig-
nitati demum cymosif. Calyx glabi squamis oblongo
obtuso primum rubei nebulosus percurrente demum nivei
flores latei

Ramuleo foliis linean. cuneiformibus ramulorum inaequis, floribus corymbosis squamis
calyx unio ^{lanceolatus} ovatis carinatis apice reflettis

Habitat in Cap. b. sive Dr Thunberg. 5

In trichos palmas inferne ramosis brevibus ramulosis, ramulis
simplicibus filiformibus erecto patentibus lineanis superne rapido
euloi foliis post durpi. Solia lineana semperque ulana, extrosum pa-
num latiora, obtusa fuscata & erecto patentia, glabra diffusantia
ramulorum sternitum apice versu apicem, ramam latiora tomentato
recta, flore 2 in singulo pedicello radiali pedicellati obovati
vix magnitudine piperi & Calyx basi tomentosa extimus apice
puncto purpureo cuneari lanceolata, intus cuneares basi villoso
apice ovato acuto niveo

Hippodium g. foliis lanceabis semiteretibus fuligineis exaratis hispidis patulis, ca
runculis terminalibus simplicibus den. Suppl. p. 363. & L. V. p. 747

Habitat in Cap. b. freit

Rami fileformes glabri. folia frequentia unguiculata basi versus
ramum angustiora supra folio longitudinali et arata subtus convexa ad
spissa setis minute rigida ceterum glabra. Flores terminaler seiles foliis
involverati calycis squamo cancellato villosa apice purpureo florentes.

Pappus plumosus

an hujus generis habet us omnino diversus

vergatum q. foliis subulatis mucronatis supra linea ciliatis, flonibus umbellatis.

Habitat in P. b. spec. 5

Rami Veretei ~~fraxini~~ vel fabri ciliati canescentes ramulosi ramuli fraxini vel
Tuberosellati digitatus. Folia alterna frequentia octa semiuirginata linea
subtus convexa glaberrima, supra linea longitudinali canescente raro
va apice terminata mucrone, riga distalis. Umbella terminalis sum
plex radiis pluribus semiuirginata in villoso canescenter. Calyx obverse
cuneatus pedicello planer longioris inferne villosi squamo extimo linea
re interiori lenean oblongo, nivei, obtuso.

numeratum g. foliis pubulatis mucronatis, umbella composta, calycibus subtrifloris
cylindricis Lin. t. V. p. 746. Berg. Cap. 262.

Lynchnia coronaria mononotisperis globulifera, foliis exalbidos geniculatis
caeruleo Plath. amalch. 134. t. 406. fig. 6.

Gnaphaleum fructu opum, foliis laniculatis congestis, glomerum calycis tuba
loso Burm. afr. 221. t. 79. fig. 1.

B. *Tristis Othopee* ex Cineracear., foliis repente aculeatis, floribus albis
coronatis Plath. phys. 410. fig. 2.

Gnaphaleum fructu opum, floribus variis capitatum Burm. afr. 223.
t. 79. fig. 2.

V. *Gnaphaleum fastigiatum*, conditum foliis lanceatis foliolis laniculatis
squamulibus, umbellatum Burm. afr. 223. t. 79. fig. 3.

Habita in Othopeia

vanae foliis interjunctis per punctatibus. flore 3. s. 6 ramos 5. f. 6

umbellata foliis pubulatis, cyma floribus cymospi cylindricis
Rami et ramuli propositi recte fuso conficentes. Tolia lapiaria irregulariter angusti
colora fusco glaberrima nitida moagine granum reflecta pubescentia non
Pyna terminalis pedunculis radice plurimo bipinnicarri folio uno vel altero
adspersi. Clavis in ultimis ramis aggregati subspiculis florib. cylindrici basi
villoso squamu ferruginei albi.
foliis velutina p. Rama terminalis differt foliis frequentioribus brevioribus magis revolutis pubes-
cens cana. Flores pedunculis ex radice primores cyme brevissimis flores
obtuse conici basi magis lanceolate squamu albido obsparsos.

umbellatum g. foliis fasciculatis pubatis rotis, umbellis simplicibus terminalibus
pedunculis Lin. Suppl. p. 363. f. 5. v. p. 747

Habebat in P. b. specie t.

Semissum linum g. mureato quoad herbam, diffit umbella regulari, flori-
bus majoribus Calycibus pulchri nubis. Refed Heranthemum syriaco calyo-
nis coloratis her.

non ord.

fastigiatum G. foliis verticibus glabris, ramis fastigiatis s^bt calyculis subgeminis p^spplebris
~~longo~~ basi incanis

Habitat in Q. b. pⁱei ab Bulow 5

Terrae humilis fructuamur ramosissimus ramulis subverticillatis fasti-
grabi incanis. folia alterna ^{marginata} ^{erecta} glabra patentia. flore-
in apice ramulorum 2-3 p^spples. Calyx obverse conicⁱ orbe basi
vellosi squamo linearⁱ lanceolata acuta extenuis adae-

cribrat. foliis squalibus linearibus, calycibus extenuatis undibarbatis: interioribus
incarnatis Lin. Am. Acad. 6 p. 99 - n. 574

Habitat ad Cap. b. spicis

Folium rami ~~angusti~~ rugato rugato, inqualebus. Sola lenearia remota, manu
tusima. Flores terminales paniculiflorae. Calyx exterior nudus est foliis
cineres - viridibus subtomentosus; interior ex squamis glabris, incarnatis, oblongo-

quo loco

Specimen herbari mihi monasteri

Veretifolium. Gnr. foliis confertis Verdinsculis, corymbis ramosis, calycibus cassis
fernigineis Berg cap. Len sp. 11938. V. p. 746. Berg Cap.

Mellefolium theophrastum, eneis foliis ineanum, flore specioso Planta alm.
251. v. 308. fig. 2.

Gnaphalium gnaphaloides, foliis Verdibus, ramis Erebenninis Burnat
217. v. 47. fig. 3

Habitat ad Cap. 6 sp. 15

Rami sub verticillati ramulofl. superne canescentes. Sola parva
margine revoluta frequentissima reclusa subtilis tomentosa, margine tenui
per ramulos decurrentia. Flores in umbella subamplexi vel corymbo.
Calyx oblongus ^{angustulus} ferrugineus & rotundus plenumque squamae cathe-
noce albido. Squamae oblongae obtuse