

Gnaphalium?

polycephalum Gnaphalium

Habitat in Carolina herb. Ruel.

Caulis suffruticosus, teres, erectus, in canis. Folia pollicaria, lineari-lanceolata,
acuta, supra glabra, subtus incana. Pedunculi superne ex axillis, frequentes,
solitarii, adpressi foliis paucis remotis linearibus. Corymbi simplices, ^{calycis} basi ^{triflori} ~~triflori~~ ^{homoceli}
si lanceolata, nitida & sordida flavi
obtusifolium Lin. exclusis synonymis

Ceylonides Gnaphalium

Habitat herb Desfont.

Caulis palmari, basi ramosus: rami ascendentes, filiformes, villosi. Cilia
linearia, semipollicaria, frequentissima, patentia, villosa. Pedunculi terminalia
et ramorum, solitaria, uniflora, saepe pollicares.

Cheranthifolium Gnaphalium

Habitat in monte vides Commerçon herb. Guis.

Caulis ramosus, crassitie fere pennis cygnea, lanatus: rami interdum caule
altiores, subsessili. Folia frequentia, sessilia, bipollicaria, lanceolata,
acuta, integerrima, tomentosa, supra minus, utraque, supra cordata, infima
versus radicem cuneata, 3-4 pollicaria, enervia, utroque uniana. Flo-
res terminaliter, subsessile. Calycis foliola ovata, aures pallido. Pappi
simplex

parviflorum Gnaphalium

Plukenet tab 394. fig. 5

La mark

It abitat in herb. Tusf.

Rami tomentosi. Folia lanceolata, attenuata, incana, supra virescentia.

Flores parvi in capitulo compacto rufescentes.

~~parviflorum Gnaphalium~~
parviflorum Gnaphalium

nodiflorum Gnaphalium

Habitat

ad A. fuscum

lanatum. Caulis erecti. Folio lanceo-lanceolata. Conymbi axillares, breviter pedunculati.

Canatum Gnaphalium

Habitat Herb. musci

Canato tomentosum. Caulis erectus. Folia semipollicaria cuneato-lanceolata,
Flores terminales, glomerati, sespiter. Calyces pallide flavescens

Gnaphalium

Helichrysum minimum tomentosum Ericifolium flore singulari, calyce albo.
Act. Paris. 1719. p. 291. 20

Habitat herb. Mus.

Planta longitudine digiti, puticulosa, ramosa, tota incana. Folia
conferta, imbricata, lineana. Flores terminali, subpedunculati, solitarii,
Gnaph. dioici majores, basi imbricati squamis foliaceis incanis. Calyx
foliola lanceolata, obtusa, alba, minute reticula. an potius stemmatidema?

Saturejoides Gnaphalium

La Mark

Habitat in monte vides Comnesf. herb. Gusf.

Tomentoso in animum. Flores apice glomerati, cylindrici reflexi, niti
Di. Folia linearia

involutum Gnaphalium

Dorsten

Habitat herb. Musci

Caules simpliciter, ascendentes, angulati, tomentoso incani. Folia sespita
3-4 pollicaria, lanceolata, acuta, integerrima, supra glabra, subtus to-
mentosa incana. Capitulum terminale, sespita, magnitudine aucti Cony-
li, cernitum folus 3-6. inaequalibus figura foliorum caulis. Calycis au-
rei?

pallidum Gnaphalium

Habitat in insula Bourbonis Rommes. herb. Tuspei
Facies Gn. margaritacei vel undulati, lanatum, unicatum. Caulis herbaceus,
adpressus. Folia semiamplexicaulia, lanceolata, integerrima. Peduncu-
li superiora et ex apice ramorum, dichotomi. Flores glomerati in apice vel
dichotomia. Calycis foliola externa virescentes, canescentes, interiores
nigrae ferrugineae.

eadem cum mea

Simplex Gnaphalium

Habitat in Pene herb. Guispei

Caulis herbarum erectus, simplex, inanis, vinctus foliorum basi. Folia semipol-
licaria, linearia, villosa, vincta, incana subtus, scabriscula, margine parum
revoluta, acuta. Flores in apice, glomerati, pallide aurei, basi foveato
si. Calyci foliola lanceolata, acuta, extima ovata.

involutum Gnaphalium

Habitat in monte video. Compositae herb. Guspei

Facies filaginis pygmae, caulescenti

angustifolium Gnaphalium

Elechrysum umbellatum maritimum hispanicum Tournef. Inst. r. h. pag
Barrel. u. 1125.

Habitat in Hispania herb. frus.

Tomentoso-incanum. Caulis adscendens, fruticosi. Folia sessilia, alternata, bi-3
pollicaria, linearia, margine parum reflexa, obtusiuscula, rami superne
floriferi, fastigiati. Compositi. Flores parvi, auri. Calycis foliola
extrema tomentosa, oblonga, obtusa

Serratum Gnaphalium

Habitat herb. Gussoni

Rami lanato tomentosi. Folia sessilia, basi subcordata, lanceolata, vix semipolli-
cana, tri nervia, utrinque tomentosa, proposita subtus, integerrima. ^{Corym}
bi terminaler, supra decompositi, contracti. Flores parvi. Calyx ^{us foliosa} intenuis
plicata
vix serratum Lin. ex varietat Cymosi

Gnaphalium.

Elechnysum ereticum foliis brevioribus et crispis capitulis minoribus Tournef.
Cor.

Habitat in Oreta herb. Jusf.

Planta spithamea, basi rami erecti, simplices, incani. Folia sessilia, vix unguicularia, linearia, villosa, erecta, revoluta, margine subrispa. Corymbi ternales, simplices. Pedicelli breves. Calyx villosus: foliola oblonga, obtusa, exteriora femiginea, interiora auria.

falcatum Gnaphalium

Habitat in monte vides Commeson herb. tuss.

incano-Tomentosum, subdichotome ramosum, pedalis. Folia frequentia, linearia,
obtusis, semipollicaria, patentissima, subreflexa. Flores in alis supremis et termi-
natis, seorsim 3-4. Calycis foliola lanceolata, sordide flavescens; basi tomento-
si

Cordi desponum Gnaphalium

Habita ✓

Reb. Guaf.

Canato-tomentosum. Caulis adscendens, basi ramosi, fruticatosi. Folia superiora ^{la} petiolata
obovata, pollicina, lanicolata; superiora distantia semipollicina, lanicolato-
cuneata. Corymbus verticillati, simplicis. Calyx lanatus purpureo-eri; pappi interna
alba

recurvum Gnaphalium

β. La Mart.

Habitat herb. Guis. 5

Rami superne lanato-tomentosi. folia sessilia parva decurrentia, frequentissime
approximata, vix unguiculata, lanceolata, basi angustata, mucronata, acuta
enervi, supra sulco longitudinali costatis, glabra, margine revoluta, utroque tomento
sa, patentia, subreflexa. Pedunculus terminalis, lanatus, folio uno alterove
ranosus. Flores in capitulo globoso collecti. Calyces parvi, fuscis perigonii, subvellopi
nitentes; interiores albi
a discolora diversa

eximiflorum Gnaphalium

Habitat herb. Rusf.

Caulis teres, superne lanatus, teritur basi foliorum. ^{longiuscule} folia frequentissima, ^{sepius} in
ferne versus sensim angustata, parte angustiore cauli adpressa, altera parte ovata
patentia, obtusa, supra glabra ~~subter~~ ^{obsoleta} sive lineata, pinnata, avenia, pubescentia
mentosa. Flor terminalis, solitarius, sessilis, magnus. Siliola calycis tomentosa, lan-
cesolata. Pappus simplex.

Gnaphalium

Gnaphalium eriticum foliis brevioribus et ensipes capitulis minoribus

Tournef. Cor. pag

Habitat in Creta herb. Mus.

Caulis basi ramosus, imis, pedalis

Genetium Gnaphalium

Habitat herb.

Thouars

In anisum Tomentopum. Folia linearia, semipollucaria, obtusa. Flores in corymbo terminali denso subsessile, sulphurei. Squama ^{calycis} ovata, obtusa, basi lanata. Calyx hemisphaerici magnitudinis in flocculosis

Carneum Gnaphalium

Gnaphalium

Habitat hab. La Marche
Caulis peripedales, samosi, etc. etc.

herbar

foliatum Gnaphalium

Habitat

est. Thonai

Coules Spithamari, ramosi. Rami simplicis et patentes semi

habes

Lithos nebrum Gnaphalium

Habitat in America? herb. Thourin.

Caulis herbaceus, simplex, semipedalis, tomentoso-lanatus. Folia semiamplexicaulia
lanceolata, acuta, basi attenuata. Corymbi terminales, compositi. Calyces
si purpurei lanati, superne sulphurei

laterale Gnaphalium

Habitat in St. Domingo herb. Thourinii

Caulis tomentosus, incanus, superne in ramos floriferos divisus. Folia sesipia sesqui
pollicaria, lanceolata, basi attenuata, integerrima - Compositi Corymbi compositi.

Racem. Gn. margaritacei

Grapholium

Electussem humilem ex promontorio sacro Tournef. 9. v. h. p.

Habitat Herb. mus.

Caulis basi diversus in ramos plures, palmatos, simplices

Gnaphalium

Habitat in monte sedes herbe Comnes. herb. Guaf.

Caules herbaceis spithameis, sublanato tomentosis incanis, basi ramiferae
rami simplices, erecti. Folia linear-lanceolata, basi versus apicem
angustata, acuta, integerrima, plana. Flores axillares, sessiles in
pedunculis brevibus conferti. Pedunculi apice folio ^{foliis} parvis. Caly-
cis foliola, ovata, attenuata, acuta, nitida flavo ferruginea

Gnaphalium

Gnaphalium candidissimum floribus. Rauh. hodoep. pari. 2. 5. 12. p. 104.

Gnaphalium foliis lanceolatis alternis, caule nudo erecto simpliciter, pedunculis
uni flori Gron. fl. orient pag. 107. no 261.

Habitat in saxo Libani h. b. Rauholfii 7

Radix superne in caules plures divisa. Caules erecti, semipedales, simplicissimi,
uti tota planta tomentosi. Folia amplexicaulia, inferiora cuneata, pollicaria,
superiora lanceolata, minor, squama frangosa vermiculata. Pedunculi superne ter-
ni, uni flori, intermediis brevior, squama una alterare arida adpressa. Flores
magnitudinis Heranthemi paniculati, argentei, squamas oblongo, obtuso.

tenuifolium Gnaphalium

Habitat in Madagascar sub la Martini

Caulis erectus, inferne ramosus, pedalis: rami floriferi elongati, ciliati
Folia frequentissima, unguiculata, linearia, angustissima, marginae revolutae, subtus nivesca, patentia. Corymbus terminalis, simplex. Calyx flavus
basi subtomentosus. Squama oblonga obtusa

Simpliopsis in Gnaphalium

Habitat in Carolina. Tosafo. Herb. La M. O

Caulis erectus, simpliopsis, pedalis, in ano tomentosus. Folia sessilia lan-
ceolata - cuneata, obtusa, remota, subtus nuda, supra viridia canescentia,
Flores superne conferti in spica solitaria. Calyx hemisphaericus, sordide
albus nitens

Fructum Gnaphalium

Habitat herb. la Martini

Caulis erectus, ramosus: rami erecti, uti tota planta, ramoso tomentosi. Folia
frequentia linearia, erecta, acuta. Corymbi terminaliter, compositi, glomerati.
Calyx basi tomentosus: foliola linearia, obtusa, citraui

asteniflorum gracilissimum

Habitat herb. la Martii

Caulis altitudine digiti minimi, simplex, erectus, inferne nudus. Folia frequentia, polliciana, lineari-lanceolata, acuta, incana. Capitulum Verminale sessile, involucriatum

Vide fig. in Illustr.