

Goodenia

Caps. 2 loculari bivalvi polyperma. Corolla longitudinaliter fissa
genitalia exserti. anthera imberbes

nat. plant. prope Siouldam

Goodenia calandulacea; foliis obovatis, crassis, scabridis; floribus axillaribus;
Cocculis Andr. repos. t. 22.
Habitat in nova Hollandia

Gladiolus versicolor; foliis linearibus emarginatis; flo

crotona Gardneri

Habitat in viciis et horti Rangoon 5

Rami fraxi, foliati, teres, annulati, inter nodos super ne incrassati. Folia
renulorum opposita, approximata, patentia, petiolata, ovatis, apicem versus
plenuaque latiora, integerrima, acuminata, utrinque nitida, punctuagum-
moso uscula. Petiolus brevis, sinuatus, striatus, supra convexus. Stylus
intra folia cito vixit, erecto, longiora petiolorum, apice scanosa. Flores
axillares, sessiles, solitarii, folio longiores, flori patentia. Calyx 5-gonus hinc
dehiscens apice obtusus. Cor. hypocrateriformis, tubus gummis p. videtur
calyci e multo longior. fauce nuda. Limbus 6-partitus lacinis ovales
obtusos supra venosus. Filamenta 0. anthera apice tubi adnata. Germen
triloculare pentagonum, bilobulare, polyspermum. Stylus apice dilatatus
Stigma margini apicis styli adnatum folio longiora mali contorto gummis
fero exaratum. Drupe oblonga umbilicata 5-carinata. Nux ovales
sub^{ly}lobulani pulpa repleta. Semina plura vidulantia ovata
plana.

Coryata Goodenia foliis obovatis dentatis, corollis, stylis, caulibus
glabris

Goodenia Coryata, foliis obovato lanceolatis dentatis Presl.

Major. V. 207.

Habitat in Nova Hollandia

non vid.

ramosissima Goodenia foliis linearibus lanceolatis subdentatis tan-
quam hispida, styloptica hispida corolla exteriori pilosa Smith
Bot. of N. H. pag. 15. tab. 5
Habitat in nova Hollandia

ramosissima G. Good. foliis linearibus - lanceolatis subdentatis cauleque hispido
style apice hirsutissimo, corolla calyci pilosa Act. Soc. Lin. 2. p. 349
Habitat

non vidi

Heterophylla 7 G. foliis integris dentatis lobatisve pelopis, fructu subrotundo
vixilla nuda in sicula Act. Soc. Lin. 2. p. 349
Habitat.

novi

Fructus 9 foliis lanceolatis integris dentatis ve carnosus glabris, corolla
exterior hispida, stigmatibus ore contractis act. Jac. Lin. 2. p. 349
Habitat

non vidi

belli d. folia 4 G. foliis obovatis denticulatis carnosis, caule nudis pilis
spicatis, corolla extus hispida, fructu quadri-valor. Clit. J. Lin. 2.

p. 349

Habitat

non vidi

paniculata 3. *G. folii obrato-lanceolati dentati corollae pilosi, caule
nudifloro.* Act. f. lin. 2. p. 340
Habitat ad portum Galkiponi

non vid.

albida 2 *G. Solus obovatis dentatis corollaeque glabris, stylo cauleque piloso*
act. sci. lin. 2. p. 340
abitat ad portum Thakipa

non vid.

ovata 19. folus ovatis denticulatis - serratis corollaeque glabris, fructu laeviss
act. for. her. Lind. 2. pag. 347

Habitat in nova caelestia

Rami angulati glabri folia opposita petiolata glabra, pollicia
ria, pedunculi axillares apice octotomi flores 3-5 in panicle
panicula

Le Vanica 09. Folis subrotundis quinque lobis^{se}, corolla extus lanata
caulis prostratus Cit. fol. Lea. 2. p. 349
Habitat

non vidi