

Gorteria

revoluta gotena foliis ^{trifolius} subulatis subpinnati, revolutis subtus tomentosis. an stato nun
gentibus.

Habitat in Cap. b. sui Di. Bulov. tomentosis

Index ramosus, ramis verebus, in canis rigida
folia opposita, septis, pollicaria, trispinula, revoluta marginem revolu
ta. superiora glabra, longissima, subtus in cana spina una altera
re saepe in canis, apice verminali spina flavescente,
pungente. Rudimenta foliorum ex omnibus at illis

Pedunculatus verminalis, erectus, folis qui pollicari, tomentosis in canis
uniflorus. Stilos magnus

Calyx polyphellus, foliolis subaequalibus; extimis structura foliorum
caulis, intentionibus lanceolatis, tomentosis, marginem subro
latis, hinc ut in 3-4 longis, extimo linearis, superne caulis
apice in canis capite
multos lobato, ciliis erectis

Corolla flava
semina lana alba, denso, in spina ut in spina.

lineari

*G. foliis linearibus mucronatis glabris basi ciliato serratis
scapo erecto unifloro Thunb. in Act. Soc. h. n. Haf. 18 par 2
neg. 2. tab. 1.
Habitat in cap. b. spec. O*

non ord.

imbriata Oedera foliis ovato lanceolatis imbricatis pa. patula

Habitat in Cap. b. spec. ad Bulos

Caulis proliferus gerbat a caepe foliorum dentata conferta patula nigra

Folia sessilia basi opposita semunquicircularia basi connata, glabra crassifolia
avenia, margine denticulato ciliata.

Calyx imbricatus foliola exteriora fructura foliorum caulis, interiora
angustiora linear lanceolata basi lanata margine villo integerrima villo
fo ciliata apice denticulata varietas forte
sanctus forte proliferus

barbata g. foliis elliptico lanceolatis dentato-angulatis, calycibus pedunculatis ciliato-fimbriatis Lin. Suppl. p. 382. * L. v. p. 784
Habitat in Cap. b. p. 4

non vidi

ciliolata G. foliis oblongis sinuato-incisis serrulatis, caulis ascendens, receptaculis palea

Ces. Bot. New. 3. p. 254*

Habitat in C. b. frei ☉

non vidi

Diffusa 9. foliis obovatis pelosi subtus tomentosis, ramis divi-
nicatis Thurb. in act. sci. h. N. Haw 4. p. 2. tab. 2

Habitat in Cap. b. spai

Caulis herbaceus

non vidi

uniflora G. foliis obovato oblongis obtusis subtus tomentosis
caule decumbente, pedunculis unifloris Thunb
in act. Haf. bot. nat. Hafn 4. p. 2. pag. 3. tab 3.
Gorteria uniflora Lin Suppl.

Habitat in Cap. b. spai

Caulis herbaceus teres a Capite foliorum annis
latus spithameus. Rami ramosi. Folio petiolo
~~to~~ attenuata margine reflexo indivisa supra
glabra subtus ruca nervo vindi cum petiolo
digitales. Petioli basi dilatati amplexu cauli.
Pedunculi terminales solitarii uniflori
Calyx campanulatus inaequaliter d. v. l. laci
nis ovatis acutis

— oblongis

non vidi

ngens G. foliis lanceolatis pennatifidis, caule depresso capis uniflori

Lin-Am. acad. 6. aff. p. 207

Anemopar mos foliis rigidis tenuiter divisi subtus nigris, flore aureo umbone
nigri ante Ras Suppl. 102.

An folis ramis decumbentibus, foliis linear lanceolatis rigidis, subtus argen
teis Mill. Dict. t. 49

Habitat ad Cap. b. p. ei X O

Folia radicalia petiolata linear oblonga, mucronata supra
vordia subtus nuda ~~sub~~ indurata et pennata. Pinnae
lanceolatae saepe solitariae vel bini simpliciter flexuoso
erecti foliis longiore Calyx campanulatus lacinis ovatis
radice lutei basi purpurei.

Partes botan. magazin pag 90. tab 90

— foliis linear-oblongis subtus albo tomentosis induratis
pinnatis, saepe unifloris Thunb. in Act. Soc. h. n.

Hav 4. p. 2. pag 4. tab 4

B Thunb. l. c. 4

n. d.

personata G. foliis lanceolatis integris serratisque, caule erecto floribus
pedunculatis hinc. Spec. pl. pag. 12034
Parnis athenicus peraphyllus, pilosello foliis incanis hispida, personata capiti
lis. Platin. phys. 273. fig. 6.
Habitat ad Cap. b. huius

Caules a radice saepe plures teres simplices pilosi flexuosi
digitales. folia alterna sessilia basi attenuata can-
cescolata vel oblonga supra pilosa hispida vix subhis-
picana integerrima dentataque serrata, radice altera
polliciana et magis duris, ^{caulina} ~~superioribus~~ vix uterum
flores terminalis solitarii. Calyx hispidus laciniis
subulatis spinis pungentibus.

personata G. foliis oblongis integris serratisque, caulebus
hispidis Thunb. in act. Soc. h. nat. Hafn. 4. p. 2. pag. 5.

incisa. fl. foliis integris, pinnatifidis que pelopis subtus
tomentosis, calycis glabro Thunb. in Act. p. h. n. Hab
4. p. 2. pag. 6.
Habitat in cap. 6. p. 0.

non vid.

uniflora G. foliis lanceolatis indivisis subtus tomentosis, caulibus unifloris
Depressis Lin. suppl. p. 302. t. 5. p. 704
Habitat in Cap. b. p. rei
an varietas G. argentis

pinnata G. foliis lyrato pinnatifidis villosis subtus albo
tomentosis, calyce hirsuto Thunb. in Act. Soc. Sci. Haf.
4. p. 2. pag. 6 Tab 5.
Habitat in Cap. b. spec. ①

non vidi

pectinata G. foliis pennatis super glaucis subtus tomentosis
lobis laciniis linearibus, caule erecto Thunb.
in act. f. h. or. G. 4. p. 2. pag. 7. Tab. 1.
Habitat in cap. b. p. r.

~~caule erecto~~

non vidi.

Thonnites *J.* foliis pinnatifidis glabris, caps. unifloris.
Thunb. in Act. Soc. Nat. Haw. 4. p. 2. pag. 7. Tab 4.
Habitat in cap. 6. p. 1.

non vidi.

Cernua g. foliis oblongis amplexicaulis dentato-spinosis patentibus glabris,
calycibus ciliato serratis, floribus cernuis h. suppl. p. 302. + l. v. p.

79^{p4}

Habitat in P. b. frei

gordana araneosa Meesburg. Gewasjen afbeelding. Tab. 40

~~glabris~~. Caulis aereus, flexuosus - crebrius ramosus, pedalis

Rami alterni. Folia ~~in~~ amplexicaula lanceolata

oblonga inequaliter dentata denticulis spinosis, pollicibus

in flore terminali solitarii cernui. Calyx ovatus

laevius umbriatis extenentibus brevioribus intercombus

lanceolatis, omnibus spinosis

cernua - foliis oblongis dentato spinosis glabris calycibus spinosis
his, floribus cernuis Thunb. in. Act. S. bot. n. 44.
p. 4. p. 10.

integrifolia J. foliis lanceolatis integerrimis hispido subtus
tomentosis Thunb. in Act. h. h. Harv. 4. p. 2. pag. 9. Tab. 2
Habitat in Cap. b. p. 5

rubra *cydonia*

Cleista *Q.* foliis linear lanceolatis ciliato serratis, caule
tomentoso erecto Thunb. in Act. f. h. nat. Hafn. 4. p. 2
pag. 9 tab. 6

Habitat in Cap. b. p. 5

caulis et rami nives tomentosi spithamei
rami et ramuli aggregato verticillati, fastigiati
folia sparsa bipinnata patentia supra terminata pinnis
floris remotis horizontalibus vel reflexis ciliata
supra glabra, subtus tomentosa alba, pollicariis
floris in apice ramorum ^{ulorum} solitarii. Calyx albo tomentosus
lacinis imbricatis lanceolatis serratis