

Gossypium

barbadense *G. folio superionibus trilobis integerrimis subtus rugulatis*

li

G. fontepiensis annum folio trilobo barbadense Pluk alm.

172. Tab. 100. fig. 1.

barbadense *G. folio superionibus 3 lobis inferionibus 5 lobis ovatis* ~~ovatis~~ *ramis impunctatis* Sw off. pag. 266

Habitat in Barbado.

Caulis 6-15 pedalis suffruticosus biennis ~~laevi ut in ramis~~
~~laevi ut in petioli~~ folia subtus pedunculati et calyceo
pubescentes. folia bipolliciana lobi lati brevioribus
quam in selegrop. Peti subtus in 3 nervis intermediis
pedunculati striati. Calyx extenor laciniatus interiori
dentibus 3-5 minutis. Capsula ovata subrotunda
glabra semina oblonga 8-12. nigra lana
facile separanda

punctatum Gossypium.

Habitat herb. Fusf.

Rami teretes, purpurascens. Sola bipollicaria, et rorsum triloba: lobi ovati
acuti, nervosus, a venis, ~~subtus~~ glabra, ~~subtus~~ glauca punctata, uti calycis
et nervi foliorum. Petioli longitudine folii. Calycis pollicaris: lacinis
lanceolatis attenuatis plurimis. Stipula lanceolata, ensiformes.

relegiosum J. foliis superioribus trilobis, inferioribus quinquelobis; ramulis petiolis
que nigro punctatis; calyce exteriori subtriphylo, seminibus nigri, lana
colorata adhaerentibus Sw. ib. p. 24

Habitat in China culta. Narkuy exinde conficitur lana pallide crocea

+ truncatatum
heterophyllum

9. foliis integris trilobis quinquelobis que lobis ovatis attenuatis
cibus villosis laciniatis

Gossypium truncatatum foliis trilobis acutis subtus unguem
bilobis, petiolis pedunculisque villosis, calycis extensor
profunde laciniato La Mart. Bot. 2. p. 135.

Gossypium religiosum caule hirsuto foliis trilobis et
5 lobis unguiculosis stylo exserto Cavon. Desf. p. 313
- tab. 164. fig. 1.

Habitat in Cap. 6. / per India orientali

Caulis 3 pedalis uti rami rubescentes impunctati
rami superne pilis albis hirti uti. Folio petiolis
sepe longiora ovata attenuata subtus villosa vel
triloba rursusqueloba unguiculosa. Stylo lan-
ceolato pedunculi petiolo brevioris. Calycis ambo
nigro punctati.

trifolium ~~J~~ foliis ~~trifolii~~ palmatis uniglandulosis acutis, calycis
extensi profunde laciniatis Caran Desj. 6. p. 311. n. 447. T. 166.

relegiosum G. foliis superionibus trilobis inferionibus 5 que lobis ramu-
lis petalisque nigro punctatis Sw. obs. pag 268 +

Gosypium relegiosum foliis trilobis acutis subtus uniglan-
dulosis: ramulis nigro punctatis ^{Lea l. V. p. 628}

Gosypium vitifolium foliis palmatis 5 que lobis acutis
subtus uniglandulosis calyce exteriori profundo lacinato ^{Churranomphii 3 lobis}
marit. Enc. 2. p. 135. & avon. Desf. p. 311. tab 166.

Habitat in India orientali

Caulis fruticosus organalis teretiusculus scaber. Ramis
lobi ovati oblongi
attenuati subtus
villosi ^{subtus} ^{subtus} ^{subtus}
breviter herb G. ^{subtus}
Caulis fruticosus organalis teretiusculus scaber. Ramis
angulosis striatis hirsutiusculis folia petiolata corda-
ta ^{subtus} 5 que lobis profunde divisa lobis ovatis atte-
nuatis pubescentibus. Poni 3 subtus in costis mediis
petioli longi. Calyx exterior subtriphyllus pube-
scenti punctatis foliola cordata lacinata laciniis
lineari lanceolatis elongatis: interior 5 que dentatis
Petala purpurea imbricata. Capsula ovata circumscissis
punctata 3-4 valvis 3-4 loculari, semina ovata
nigra lana pallide cinerea fuso alba obvoluta
ante adhaerens

huius varietas est G. rufum auctorem secundum Lamour-
ier ab anglis Nankin

reclinatum ^{integris} *foliis* ^{5-que lobis que lobis ovatis attenuatis} *superioribus* *lobis* *acutis* *puberis* *Angland* *alibi*, *rarior*
~~*in nigra* *pro* *statu* *Baron* *des* *6. 1. 164. f. 1.*~~
gossypium reclinatum foliis

Cal. folium G. foliis acutis infimis induratis, reliquis lobis subtus
iniglandulosis Murr. in Bem. Gött. 1776. p. 32. t. 1. T. V. pag
620.

non redi

penicillatus

9. Folio lobis acutis triglandulosis, calycibus extensoribus
An phyllis triglandulosis Curran. Desf. C. p. 313. no 44 y
tab. 168

Habitat in Peni 8

Caulis teres glaber tomentosis nigro punctatus. Folia magna
cordata subtus tomentosa: inferiora integra lato ovata
acuminata super non lobata lobis acuminatis
stipula lanceolata falcata. Calyx extensor mag
nus falcatis cordatis superne lobatis interior
5que crenatus. Corolla magna subulosa. Capsula
ovata acuminata semina nigra.

non vidi

ind. in un ^{lib} folio trilobis eglandulosis lobis cuneatis brevibus
fructu conico Carson. def. 6. p. 314. no. 451. V. 169. La Mart. Enc. 2. p. 134

Gossypium capax Rumph. herb. 4. p. 33. tab. 12.

Habitat in

ut petioli et nervi
foliorum peltati
Caulis 7-15 pedalis ramis superne subhirsutis. Folca sequipolli-
cana 3. interdum 5 que lobis basi subcordatis lobis subrotatis
mucronatis glandula in medio nervo (vel nullo Carson) superi-
ore lanceolata attenuata. Pedunculi foliorum petiolorum breviorum
lacini calycis extenones profundi 7. foliola lato ovata
Capsula 3 sulca 3 loculoni

glanduliferum G. folio squelobri glanduliferi: lobis tubis oblongis
acuminatis villosis Parvum Desf. 6. p. 354. n. 510

Habitat in Andam

valde affinis gossypio hispido suffert defecta glanduliferum foliosa
calycis 3. vel 5. dentata. Corolla calyce paulo longior

herbaceum Lin

mescherynotum

an ab herbaceo distinctum

herbacum g folus 5quelobis subtus uniglandulosis, caule
herbaceo

Gossypium frutescens semine albo Dod. pempt 66.
Lobel. wor. 656.

herbacum g. folus quinquelobis subtus uniglandulosis lobis
ovatis retusatis mucronatis Raven. Desf. p. 316.
Tab 164. fig. 2.

Lobis oblongis, obtusis ^{villosis} Hab. At in oriente ♂
si supra glabris Paulis teris ramis 3 pedalis junior hirsutus subtomen
subtus molliter ^{topo adultior albo superne villosis junior}
tomentosi hirsuti ^{petiolis usque uniglandulosis}
Folia cordata ⁵ lobis lobis lati breves villosis.
Petioli adulescentes folis congruis. Stipula lanceola
to attenuata. Peduncululi axillares solitarii uni
feri petiolo breviores. Folia calycis exteriori basi innata
ovata superne dentata ^{calycis} unis ^{calycis} subpolluciana interiori.
dentibus ovatis attenuatis subaequalibus, ^{calycis}
Congrua Cap. 74 Corulani spermata.

puberulum g. foliis puberulis obscure 3-5 lobis lobis acuminatis
calycibusque punctatis laciniatis glabris

Habitat in India orientali
flosa planta punctis parvis adspersa folia basi cordata
pubes uniglandulosa apice lobis brevissimis remotissimis
tres raro quatuor vel quinque brevissimi. Corolla calycis
eodem modo majori

herpatum 9 folio fere quibus subtus uniglandulosis ramis petiolisque
~~pubescentibus~~ herpatis *Caran.* d. sp. 6. p. 311. ~~no~~ t. 167

9. procerius foliis 3 lobis junioribus minoribus orientibus
Brown jam. 202-1. *P. Belm.* 172 t. 299. fig. 1. mala

herpatum 9 folio inferioribus 3-5 lobis, superioribus cordatis, ramulis
petiolisque herpatis (scilicet), feminibus vix adhaerentibus Sw
obf. p. 265

Habitat in india occidentali

Caeteris frutescens ovata, ramis herpatis. Folio superiorum cordatis
in cordata margine hirta: lobis inferiorum supra glabris

Petiolis nigro punctatis herpatis. Ponsibus 1. interdum

2. vel 3. Pedunculis punctatis. Calyx exterior hirsutus

lacinus ovatis. interior truncatus, 2. dentatus. Capsula

magna ovata nigro punctata. Semina ovata vix

lana ante adhaerens Sw.

Trenet Cotton.

non vidi

Mimathum g foliis rugulosis acutis ~~trifloris~~ unguiculatis
glaberrimis, calyce corollam superante. Cavan. Des. 6. p. 311
no 4414. 169

Habitat in Spahan

tota glaberrima. Caulis et petioli et pedunculi nigro
punctati. Foliorum lobi orbiculato acuminatis
segmenta calycis exteriora laciniata interiora 9que
dentatis punctatis. Cavan.

non vid.

arborescens foliis palmatis lobis lanceolatis; caule fruticoso
Carton. 1. p. 311. tab. 165

gossypium arborescens Gleditsch figur. Alp. exot. Egypt. 30.

Quadranti Rhed. bot. 1. p. 55. t. 31.

Gossypium rubrum Forsk. Egypt. no. 50.

Habitat in India orientali Egypto

Rami teretes scabri ramuli villosi uti petioli et folia.
Folia alterna pollicaria vel parum ultra lobi ⁵ ovato lanceo-
latis vel ovato lanceolatis obtusi mucronati, pinnis subtus
in nervo costali interdum quoque in duobus proximis. Si-
pula linearis lanceolata. Pedunculi solitarii breves lateo-
les. Calyx exterior parvis foliis cordato-ovatis late
geminis interdum dentatis. Capsula globose magnitudine
nucis avellanae