

Gouania.

1. Domingensis G. foliis ovatis acuminatis crenatis eglandulosis glabris
natis lateralibus
2. ^{nicot} ~~Durandii~~ G. foliis ovatis villosis incisive
3. Wilis G. foliis cordato-ovatis acuminatis glandulose serratis,
natis terminalibus pubescentibus.

Patroni Gou Gouan. Gouano species Richard.

1 *Domingensis* G. foliis ovatis acuminatis, ~~remotis~~ crenatis eglandulosis
glabris racemis lateralibus.

Gouania domingensis Lin. L.V. p. 912.

Gouania glabra Jacq.

Habitat in Caribaeis &

Rami teretes superne villosi. Folia petiolata angustiora quam
in *Vitis* folia, glabra, coriacea. Petiolus pubescens. Racemi axillares
res stipitati foliis. Pedunculus pubescens. Flores glomerulis sparsis.
Circum pubescens viridi fructus triquetri

Candicans Jorania

Habitat Caseno ad ripas fluviorum hest. la Mantua
Rami rigidi, teretes, glabri, fusco-purpureascentes, superne angulati. Folia petio-
lata, alterna, sequipollicana, oblonga, glabra, fenata, fenatibus emargina-
tis villosis, supra avenia, subtus tenuissime venosa, pallidiora. Racemi
terminaliter ramorum, simplices, caulis compositi. Olovi parvi, sparsi
indani aggregati. Cuschi nulli

orientalis Guania

Habitat in Tava herb. Puch. 5

Rami teretes, superne incano-tomentosi. Sola petiolata, sequi pollicaria, ovato-oblonga, remote obsolete obtuse serrata: serraturis glandula minuta, mucronatis, juniora utrinque villosa-tomentosa, adultiora supra glabra, subtus incana, nervi geminari.

Pedunculi basi cernosi, terminales ramorum, longi. Flores parvi, sessiles, uniani, glomerati, parvi

glabra *Gouania*

Habitat in America herb. Siciari

Caules glabri, superne angulati. Folia petiolata, 2-3 pollicaria, ovato-oblonga
acuminata, mucronata, venis subtus serrata, serrata non subglandulosa, subvenosa
sola. Peduncululi ad latera foliorum vel ex apice ramulorum, 4-5 pollicaria.
pedicelli sparsi, geminati. Cuscutae ad latus peduncululi basi, interdum 2-3.
Petioli semi pollicares. Ovary oblongus, glaber, per se nigro rari major,
rudimento calycis coronatus.

mollis *Quercus* foliis ovatis villosis subtus subtomentosis reticulatis

Habitat in Domingo de las Atenas

Ramipriferne teretibus sculis, superne angulatis, infero parte tomentosis. Folia petiolata, bi-stripticaria, alterna, ovato-oblonga, basi subcordata, crenato-ferratis, crenis glandulosis, subtus magis villosa, supra secundum venas tenuissime lineata. Pedunculi axillares, inferne articulati. Cincinnus simplex ad articulationem pedunculi, ferrugineo-tomentosus, uti pedunculus. Flores glomerati: glomeruli sparsi, ex his uncinato-tomentosi. Bracteae subulatae. Racemi tri-quadri-polliares.

Tomentosa Guianensis foliis cordato-ovatis; utraque Tomentosa.

Plukinet. tab. 162. fig. 3 et tab 201. fig. 4.

Habitat in Domingo. herb. Guss.

Rami inferne glabri, superne angulati, rufo-tomentosi; uti petioli et pedunculi. Folia pollicaria, subcordato-~~ovata~~ oblonga acuta, vel cordata attenuata, utraque tomento molli flavescente tecta, serrata, subtus nervosa. Racemi axillares brevissimi, terminales, pollicari. Fructus glaber, trinalatus.

Confer Banisteria foliis alternis lanceolatis serratis Lin. Spec. 427.
et Paulinia foliorum simplicibus lanceolatis serratis Lin. Hort. Ups.

mauritanica Guayana, foliis ovatis integerrimis subtus villosis

Habitat in insula Francia herb. Desfont.

Rami teretes, glabri, apice pubescentes. Folia petiolata, pollucina, ob
versifolia, cum mucrone. Stipula subulata.

Gouania

Habitat in insula Franco Comensis herb. Guss.

Rami striati, superne pubescentes. Folia petiolata, cordato-ovata, obtusa
nervosa venosa: juniora sericea, state glabra, excepto costa subtus, serrata.
Stipula sagittato-lanceolata, colorata. Racemi elongati, pedunculi
partialiter alterni; flores inferiores umbellati, pedunculi superiores
simplices

Stipulae in G. Dominicanae subulatae sunt

1 Domingensis Jouania foliis ovatis acuminatis, coenatis glandulosis glabris,
racemis lateralibus

Jouania domingensis Lin. Syst. Veg. p. 912

Jouania domingensis foliis ovatis acuminatis serratis subglabris
viridibus h. Mart. Encycl. 3. p. 1. pag. 4

Lupulus pyretro americana clavicula donata Plukh. alm 229. V
201. fig. 4. et. tab 63. fig. 3

Habitat in Gambou
latro per rami terres glabri apice villosi. Folia petiolata acutius
ovata hypoleucana base in ovata acuminata obtus remota
serrata glabra junior venella villosa racemi ad ellares vel
et apice ramulorum axillarum. flores aggregat glomeruli
remoti flores villosi

1. *Caperis* *C. arborescens* *ex stipulatus*, foliis ovato-lanceolatis petiolatis
In nervis denticulatis utrinque nudis Lin. S. V.

Habitat in Cap. b. p. et

Rami teretes pubescenti, pilis rarioribus adpressi. Folia petiolata
in Tripolliciana ^{compta} ~~in~~ ⁱⁿ Tripolliciana ~~in~~ ⁱⁿ Tripolliciana ~~in~~ ⁱⁿ Tripolliciana ~~in~~ ⁱⁿ Tripolliciana
brevissimum attenuatum acutum, subtupli nervi nervi versus
medium evanescentibus utrinque glabra margine denticulata
in pilis que longis ciliata prope in juniora. Pedunculi
terminaliter triflori pediculis parvis triflori
Calycis foliola ovata cordata acuminata hispida juniora
hispidissima. Corolla flava

2 incisa Gouania foliis ovatis subcordatis serratis incisissimis ramisque villosis.

Habitat in Insula Bobonia de Thuespeu

Habitat in

Rami teretes, vili ferrugineis, uti petioli dispositi. teretici

Coler petiolata, alterna, bipollicaria, basi sinu parvo ad insertionem

petioli, profunde serrata, profunde ^{ferruginea} ~~in~~ ^{venellae} ~~inferiora~~ ~~nerveosa~~, ~~arteria~~ ~~medulla~~
vix venosa, acuminate, nervis villosis. venosa conduplicata utraque venae

Stipula lanicolata, ferruginea. Cortex ex apice ramulorum, simpli

~~Alia dedit de Thoria specie forte non diversa, fructu minutis
rematis, cum flos vest in peltamine desideratur ad proventus
pronunciare acido~~

H Gouania mauritiana foliis subcordatis acutis inaequaliter serratis
tomentosis, tomento juniorum partium ferrugineo La Mart.
Encycl. 3. p. 1. pag. 4.

2 Tiliifolia Gouania foliis cordato-ovatis acuminatis glandulose serratis, racemis terminalibus pubescentibus. Fabrius & alii

Gouania Tiliifolia La Mart.

Habitat in Insula Bobonis In Tuspe

Rami purpurascens, flexuosi. Veretes, etate glabris.

glabro

Folia petiolata, alterna, ^{by pollicata et serrata?} late ovata, oblique nervosa, subtriangula, #

obscure venosa, obtuse retortiuscule serrata, subtus punctum fuscum ad apicem singula serrata, acuminata, acumine obtuso.

+ utraque glandula fusca

Petioles pollicares, velosi. Corchus inter folium terminale et pedunculum ^{velo} purpurascens.

Pedunculus palmaris vellosus. Floris pauci, copiosi; Corchus inter

Gouania in multorum

ovatus, glaber, magnitudine pisi

Gouania Tiliifolia foliis cordatis acuminatis venter dentatis utroque glabris La Mart. Encycl. 3. p. 1. pag. 5

1 glabrum E. ^{tenax} foliis lanceolatis ^{glabra} ~~superne~~ ^{subtus callosa punctatis} ~~racemosis~~

deternis

Habitat in cap. b. sp. 5

Rami parsi pubescentes superne parum compressi. Folia leoplii
forma, pollicaria avena vix scabra, glabra nisi verso
apicem subtus puncta nonnulla albida. Racemi ex alii
superne erecti. pauci flori bipollicares bractea ovata
cuneolata longitudine calycis. Calycis pilosi laciniis
cuneolatis pilosis longitudine tubi. Stamina corolla longiora