

Grewia

1. occidentalis G. foliis ovato-oblongis glabris serratis, pedunculis axillaribus ^{coratis} unifloris
2. populifolia G. foliis orbiculatis crenato-dentatis, pedunculis solitariis unifloris.
3. orientalis G. foliis ovatis crenatis utraque scaberrimis, pedunculis axillaribus trifloris
4. acuminata G. foliis oblongo-subrhomboidibus serratis acuminatis lobatis pedunculis trifloris
5. longata G. foliis ellipticis acuminatis, utraque lobatis basi ^{serratis} induratis, pedunculis trifloris
6. crenata G. foliis ovato-oblongis serratis lobatis, pedunculis lobatis
7. excelsa G. foliis oblongis serratis subtus tomentosis inanis pedunculis solitariis trifloris
8. velutina G. foliis ovalibus utraque mollissimis, pedunculis axillaribus ternis trifloris
9. hispida G. foliis ovato-lanceolatis mollebus, calycibus pubescentibus, pedunculis axillaribus ternis trifloris
- 10 glandulosa G. foliis ovato-lanceolatis acuminatis utraque lobatis, basi multiglandulosis, floribus solitariis subsessilibus

ord. fraxinea
in 1748. adh.
residens

11. *aphylla* G. foliis cordato-subrotundis subtus canis, pedunculis axill.
lobatis subquaternis petiolo longioribus
12. *tiliaefolia* G. foliis cordato-subrotundis utriusque glabris, pedunculis
subternis petiolo brevioribus
13. *paniculata* G. panicula terminali

multiflora Grewia

Habitat in Philippinis herb. Thoniam &

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, elliptica, tripollicaria, panem
acuminata, utrinque glabra, lora, trinervis. Petioli glabri, unguicula-
res. Pedunculi axillares, quatuor, petiolo longiores, tri-loci rari quadri-
flori. Flores pedicellati; ante expansionem globosi, imo, aperti lan-
ceolata parva, seta duo ad basin pedicellorum

carpinifolia Greene foliis subcordato-oblongis scabrisculis glabris serrulatis, pedun-
culis axillaribus solitariis brevissimis subtinflois.

Habitata in Guinea Thonning, Sp. 17.

Index 8-12 pedalis ramosissimus; rami teretes, sabri, supra ovales
armati, pubes brevibus stellatis, sordide cinerascetes. Folia brevissime
petiolata, bi- & tripollicaria, supra nitida. Stipula utraque setacea,
decidua. Pedunculi 2-3 triflori, petiolo breviori: pedicelli unguiculati
basi bracteo 2-3 ovata, concava, parva decidua. Flores ante explicatis
sem cylindrici, semi-pollicares. Calycis foliola linearia, spiralter revo-
luta. Petala calycis breviora. Nectarum squama in singulis petalo uni-
in unceolum connata

Rama fragile corticosa, globosa, scabriscula, sordide aurantia
acidula, tetrasperma, quadripartibilis. Semina ossea Thonning
50 pa bilocularia Thonning

Crotalaria Mansfeldi

Habitat sub La Martini madag.

Tota glabra. Rami cinerascens, inferne teretes, superne Vnguiti. Folia
terna, plicata, bipollicaria, oblonga, pinnim acuminata, supra laevia, avenia
subnitida, subtus venosa, flavescens. Stipula ovata, acuta. Conym
bus terminalis, supra decempositus, densus. Pedunculis compressis trique
tri. Calyx laciniis lineares, cuneatis, obtusis, semina quatuor

flores verticillato-terminis, ovatis, subsessilibus, laciniis calycinis longis
persistentibus 4. 393
madagascar

incana Java

Habitat in India orientali herb. Thonni
Rami teretes, superne incani. folia petiolata, subrotunda, vix simpliciter, sub
tus quinquenervi, utrinque ^{venis} incana, supra avania, serrata. Pedunculi axillares
terni, incani, folio longior. Pedicelli squae, umbellati, uniflori, unguiculato
superiori parum crassiores. Calyx uniflorus, incanus, ante aperturam oblonga
& lobes parvi. Calycis lacinae lineares: Germina Yonnetosi, incana

Institutum Deperis ni fallor

Betulina Grevii

Habitat in India orientali herb. Thourin

Rami superne tomentosi, inferi. Sola petiolata, semipollicaria, subrotunda, obtusa
la serrata, supra glabra, subtus stellato villosula, subsque nervis, utroque verso
su, basi infra gemma, serratura in aequales. Pedunculi axillares, solitarii
uniflori, longitudine folii, ^{medio articulati} Flori magnitudine Grev. occidentalis. Calyx in anis
foliolo lanceolata. Petala linearia

an populifolia herb

pulosa Grevia

Habitat herb. La Martk

Rami glabri. Folia sequipollicana, oblonga, serrulata, utrinque scabi-
ufula, trinerva: nervi villosi, ceterum glabra, acuta, basi obtusa. Pedun-
culi axillares, solitarii, triflori, folio breviores, apice plures 4 flori.
Cappula pulosa

obovata Grenia

Habitat herb La Manthe

Rami, caetero, glabri, scabri. Folia petiolata, bipollicaria, obovata, crenata
cuneo infima, glandulata
basi obtusa, utraque scabra, glabra, costis exceptis nervis subtus, simpliciter
ter venosa, tri nervia. Pedunculi axillares, multiflori. Calycis tomentosi.
Stigulo subulato.

Subtriflora Grewia

Habitat in Tava herb. Lus. 5

Rami teretes, superne scabri, subianescentes. Folio petiolata, sequi pollicaria, oblonga, subinaequaliter serrata, obtusiuscula, serraturae acutae, subtus tomentosa, inaequali, nervi tres, subrenosa, supra bellato villosa punctata, subnerviscula. Pedunculi axillares, 1-2 flori, unguiculares, petiolo parum longiores. Bractea magnitudine Piperis, glabra. Sepala lineares, parva, acuta, decidua
maxime affinis *Gr. eximia*

ulmi-folia Grenia

Habitat in Tava Herb. Lus. 5

Rami teretes, villis raris adpressis. Folia petiolata, 4 5 pollicia, ovata lanceolata, sesqui pollicem fere lata, acuminata, serrata, serraturis 5 binis nigricanti glandulosis, venoso, trinerviis, supra scabra, subtus, utrinque modo villis raris adpressis, subtus villosa, villis non stellatis, mollis, videntur villi aggregati in punctis tomentosis ad latera nervorum. Petioli unguiculares. Pedunculi axillares, pollicares, solitarii, triflori. Flores pedicellati, ante expansionem globosi (in Apr. acuminata oblonga) demum oblonga, uncinata. Bractea 3 ad basin pedicellorum. Calycis lacinis linearibus lanceolata unguicularibus. Stipulae parvae, deciduae, lanceolatae

quinque nervis Grewia

Habitat in Java herb. fus.

Rami pubescenti-tomentosi. Folia petiolata, tripollicaria vel ultra, ovato-oblonga
obtusiuscula, altero latere basi obliqua, ^{integerrima} integerrima, serrata, serraturis in
senariis 4-5 glandulosis, quinque nervis, supra arenata, villis flossatis ad
inversa, subtus simpliciter venosa, villosa, incana, parum acuminata
Petioli semiconvulsi, tomentosi. Pedunculi axillares, solitarii, 2-3 flori
petiolo duplo longiores: pedicelli umbellati, longitudine pedunculi, tri-
tus globosus, magnitudine pepeni
nunc levigatam colligenda

5/1/6

longifolia. Grenia

Habitat in Tava herb. Aust.

Rami, uti reliqua partes plantae villosi tomentosi, mollissimi. Foliorum petio-
lata, pithanica, ovato-lanceolata, supra incano-virescentia, tri-
nervia, vix venosa, subintegerrima, & qualiter acuta serrata, basi
altero latere obliqua, subbrevisima, serraturae infima ~~est~~ s. nigro
glandulosa. Stipulae pubulatae. Pedunculi axillares et terminales
solitarii, brevissimi, multiflori. Calycis foliola linear, lanceolata

obovata Grewia

Habitat herb. Tus. f. 5.

Rami teretes, cespitici, pennis asperis, punctati, scaberrimi, glabri. Folia petiolata,
tri-pollicaria, oblonga, basi vespis sensim angustata, basi obtusa, in nervis utrin-
que scaberrima, crenata, crenis infimis glandula impressa. Petioli unguiculata
res. Stipula subulata, semi-unguiculata. Racemi axillares, pollicares, solita-
rii. Pedunculi partim vlti 6 flori: pedicelli umbellati. Calycis scaberrimi
extus incani: foliola linearia

parviflora Grewia

Habitat in Philippinis herb. Frus. 5

Rami ^{ter-}erecti, purpureascentes, glabri, superne angulati. Folia petiolata, tri-
pollicaria, oblonga, acuminata, Inaequalia, venosa, utrinque glabra, scaberrima,
lennata, basi obtusa. Petioli unguiculares, ^{sub}canescentes. Stipulae setaeae. Pe-
tiunculi axillares, tres vel quatuor, duo longiores, duo petiolo parum brevio-
res, filiformes. Pedicelli 4. ~~filiformes~~ umbellati. Flores parvi. Calycis
foliola lanceolata, extus cinerea, intus glabra. Corolla nulla. Bractea
setaeae subpedicellis.

Serrulata Grewia

: Habitat ad Senegal herb. Grew.

Rami teretes, glabri: ramulicani, villosi, superne angulati. Folia petiolata, pollicaria,
tri nervia, subavenia, supra glabra, subtus incana, subtus pime serrata, basi obtusa
vel subvata, apice obtusiuscula. Stipula unguiculata, subulata, erecta, petio-
lo longiore. Pedunculi axillares, gemini vel terni, folio breviores, incani, tri-
flori. Calycis foliola lancea.

reticulata Grenier

Habitat ad Senegal herb. Lus.

Rami teretes, inferne glabri, superne villosi griseo subferruginei. Stipulae petiolatae, 2-3 pollicianae, cordatae, subrotundae, septemnervi, venosae, supra truncum versus lineatae, inaequaliter serratae, utrinque villosae, subtus canescentes. Petioli pollicianae stellato-pilosi grisei. Nervi lanceolati, unguiculares, intus glabri, extus grisei. Flores 2-4 ante inflorescentiam involucri. Stipulae involucri ovatae, extus villosae, intus glabrae. Bractea inter flores sessilis lanceolata. Calycis hirsuti.

Rottlerii G. foliis cordatis oblongis serratis acuminatis subtus villosi pedunculis
geminis trifloris

Habitat in India orientali a Rottler

Rami vix villosi proferunt superne folia petiolata frequen-
ter alterna 4-5-pollicaria sursum versus sensim
minora ~~vegeta~~ ^{tenuia} supra nervosa venosa ~~trineura~~ ^{pubescentia} ~~pubescentia~~ ^{pubescentia}
villosa auctoribus pilis raris minutis pallatis subtus frequen-
tibus venosa reticulata - petioli brevissimi. Pedunculi
pilosissimi uti pedicelli et calycis pilis densis flavescen-
tibus tecti. involucrium triphyllum folioli lanceolatis
lacinis calycis linearis. Sepala subulata

offensu hirsuta

pinnosa *Natica* scapo flexuoso fuscescente pubescente Lin-Mant. 59 + 1^o V. p. 301.

Natica aphylla

Habitat in aegypto 4

Præp folia nulla. Scapus erectus, spithameus, teres, uti rami ad presens punctum
numerosissimi fuscescenti. Hipulo ovato acuto ad basim singuli rami. Stami
alt. rami laxis marginibus tenui membranaceo. ramulis obtusi. Spica
ad apicem ramulorum terminales in apice ramulorum solitarii flores al-
terni. lactei 2bus exterioribus subrotundis concavis

obtusifolia *J. foliis oblongis glabris serratis serraturis infimis glandulosis*
redundantibus ternis solitariisque subunisfloris

Habitat forte in India orientali

Rami teretes superne pubescenti subtomentosi. Folia petiolata
alterna bi- & tripolliciana venosa glabra leviter basi
acutiora trinervi, obtusiuscule serrata: serraturis tribus
infimis per glandula supra minuta. Pedunculi axillares solitarii
vel terni unisflori vel biflori angulati petiolo parum longior
tomentosi uti calycis palea stellatis aequae ac in omni
genere. Pa. foliola calycis lanceolata septipolliciana
petiolo subtomentosi

affinis orientali

~~ramosa *J. foliis ovatis serratis ciliatis pilulosis, caulis ramisque pubescentibus*
erectis, paniculis compositis. Thurb. Prodr. pag. 55.
Habitat in C. China.~~

Dentalium

R. foliolis obovatis mucronato dentatis glabris, caule scabro
Thunb. prodr. fl. Cap. pag 52.

Habitat in Cap. b. p. 3

non vidi

occidentali *Q. foliis ovato oblongis glabris serratis, pedunculis axillari-
bus ~~unifloris~~ ^{inifloris} foliis brevioribus*
*Ulmis facie arbustula otheopnea, ramulis alatis, floribus
purpureis* Com. hort. 1. p. 165. t. 05.
Ulmifolia arbor americana, ^{fricana} floribus purpureis Plut. in
alm. 393. t. 237. fig. 1.
Q. grevia foliis subovatis Lin. L. V.
Habitat in otheopia, ^{subtombes oblonge}
*Rami teretes glabri. Folia minora quam in reliquis, in
ramulis unguicularia, interdum pollicaria petioli sub
pelosi.*

Grewia

*2 populifolia Grewia foliis orbiculatis pedunculis solidariis unifloris. ^{foliis congestis} ~~ramis~~
Chadara Venax Forsk. Deser. pag. 105. n. 23.

Ramulae ramosae; rami tenuis, glabri, ⁱⁿerascens.
Folia petiolata, alterna, sparsa, orbiculata, ⁱⁿequaliter obtuse
dentata, ~~dentibus~~ ^{dentibus} ~~in~~ ⁱⁿequaliter obtusis, unguiculata, ⁱⁿerose, supra
glaberrima, subtus pubescentia, pilis stellatis oculo armato
videndis.

Petiolus filiformis longitudine foliorum.

Pedunculus solidarius, filiformis, foliorum longior, ex eadem
gemma, uni florus. Flores ~~Grewia~~ ^{Grewia} occidentis ~~florum~~ ^{florum} panum mi
noribus.

Bractea bina, opposita, in media pedunculi, decidua.

Calyx pentaphyllus; folioli linearibus, obtusis, villosis, ⁱⁿterius
glabris, coloratis.

Petalum lineari, calyce breviora.

(Affinis quam maxime græv: occidentali, habitus vero laxior, folia
orbiculata Populi tremulae dependentia, Pili stellati subtus.

biflora G.

orientales
Asiatica

Grewia foliis ovatis ^{crenatis} utrinque scabris, pedunculis axillaribus trifloris. ^{solo brevioribus} tab. 13

2 Grewia foliis sublancoatis, floribus solitariis Lin. S. V. pag. 326. fl. reip. 3248

Pai-parea Rheed. Malab. 5. pag. 91. tab. 46. ^{Planta 40. fig. 40.} ^{invenitur crenata} ^{subtus}

Habitat in ^{India} India ^{occidentali} India ^{occidentali}
Folia obtusiuscula, basi utrinque saepe triglandulosa, obtuse serrata, punctis
numerosis, nervis profertim subtus quibus insident pili stellati. nervosa bipollicia

Petoli, pedunculi, rami superne calycesque inter se pilosi. tomentosi

(Distinguitur ab insipientibus figura foliorum et scabritie.)

Habitat in India orientali

Fructus magnitudine pisi majori

Folia oblanceolata, subacuminata, scabra. Pedunculi axillares, petalo
longioris, 3-5 flori ferrugineo pulverulenti: pedicelli longitudine
pedunculorum herb. 4.

4

acuminata

*G. folius oblongo subrhomboidibus serratis acuminatis basi
 bus pedunculis trifloris foliis brevioribus.*

Habitat in Madagascaris ad Dakt. 5

*Rami teretes glabri apice villo pubescentes. Folia petiolo
 sa bipollicari, medio dilatata, basi angustata subova-
 ta apice valde acuminata nervosa subtus pallidiora
 stipula subulata, ferruginea decidua. Pedunculi axilla-
 res filiformes ^{pollicari} sesquipedales. Pedicelli terni unguis
 dilatati ante involucrium 4. siphylum linearis decidua
 Calycis flores minores et calycis tenerioris quam in
 congenibus ante explicatum loboso*

affinis videtur Callicotyle

23
5

Coriata Gravaria foliis ellipticis acuminatis, basi integerrimis utroque lobis, basi integerrimis, pedunculis trifloris. ~~foliis~~ herombus foliolis calycinis lanceolatis.

Habitat in India Orientali Honez

Rami cortice purpura fiente albo punctati. Trinervi venosa
Folia brevisime petiolata, elliptica, acuminata, obtusa, extrorsum serrata,
basi integerrima, bi- sive tripollicaria. Ripulo pubescenter pubescentes

Pedunculi axillares, solitarii, petiolo quadruplo longiores. Pedicelli longi
tudine fere petiolorum.

(Differt ab ~~in~~ ~~specie~~ ~~foliis~~ ~~longioribus~~, ~~basi~~ ~~integerrimis~~ ex Candulosis,
pedunculis ~~trifloris~~ longis.)

6 crenata ^{foliolo ovato} foliis ovato-oblongis serratis lobatis, pedunculis unifloris calycis
Malococa crenata Torr. in. n. gen. 39. act. Lyp. 3. p. 179.

Grewia malococa foliis cordatis ovato-oblongis crenatis serratis
pedicellis axillaribus unifloris, fructu tetrafolio. Lin. Suppl.
p. 409

Habitat in lucis insula Tongatabu, atque in montosis infulis
Huaherine I.

Folia Grewia paniculata vel longata pedunculis unguic
ularis, pedicellis femina unguicularis

~~Differencia 6 et 7~~

23. exiella Grewia foliis oblongis subtus tomentosis incanis; ^{pedunculi triflori,} pedunculis axillaribus trifloris
7 Thasara arborea; foliis ovatis, serratis glabris Cosk. Despr. pag. 105
Folia ^{axillares} inequaliter obtuse serrata, supra ^{cinerea} teria nervosa venosa, subtus incana.
Pedunculi ^{axillares} saepe solitarii, triflori: pedicelli angulati.
~~Nota Grewia sub hoc genere differt Calyx enim superioris lacinum coronans~~
Ramiuli tomentosi
Petoli brevis stipula lanceolata attenuata tomentosa

Habitat in Arabia

45. Velutina grewia ^{ovalibus} foliis ~~ovato-oblongis~~ utrinque ~~veluti~~ mollissimis ped
culis ~~incais~~, pedunculis axillaribus subternis trifloris.

Chadara velutina foliis alternis, ovato-acutis, serratis velu
tinis basi obliquis Forst. Defer. pag. 106. no 25.

Habitat in
arabici

Caulis fruticosus. Rami tomento mollissimi uti reliquis partes
plantae.

Folia alterna, petiolata, ^{ovalibus,} ~~ovato-oblonga~~, intereum versus apicem
subangulata, serrata: sendis obtusiusculis, erectis
in aequalibus, obtusis, subtus albidis coro venosis, basi ob-
infimis ^{latere} altero obliqua pellucida.

Petioles brevissimi. Stipulae setaceae, residuae.

Pedunculi axillares 2-3. triflori longitudine petioli.

Flores minores quam in apatica

Obs. Grewia saliz folia lin. Stipp. pag. 409 Genera a Grewia
differt calyce superiore germen coronante et aliis notis.

Palloicorda difformis mollescens

hirsuta Grewia foliis lanceolatis ² ~~ovatis~~ ¹ mollibus, calycibus pilosissimis, pedunculis trifloris.

Habitat ad summities Montium Ind. Orient. Kong.

Rami ~~et~~ folia molliter villosa, molliter pilosi, proferunt ^{alters late breviora} pappi.

Folia brevissime petiolata, lanceolata, basi ~~ovata~~ ^{rotundata}, ~~acuminata~~,
nervosa, venosa, subtus villosa, subviridia, inaequaliter acute serrata,
sesqui pollicaria.

Apud ~~se~~ ^{taico}, longitudine petiolorum

Pedunculi axillares, terni, interdum solitarii, triflori. Flores subsessiles: involu-
cris triphyllis, lanceolatis.

Petalis brevissimis, oblonga ciliata.

(Bacili negotio distinguitur a reliquis foliis mollissimis lanceolato-ovatis

70 glandulosa Grewia foliis ovato-^{oblongis} lanceolatis acuminatis, basi biglandulosis, floribus
solitariis subsessilibus. ^{utroque lobis, serratis}

~~Ami. Grewia~~
Habitat in Imp. Franca. Isle de France d'eta

Rami scabriusculi

Folia ovato-lanceolata, acuminata, acuta, glabra, utroque lobis,
crenata. crenis 3. 5 basi proximis glandulosis.

Petiolus brevis

Flores axillares solitarii, brevissimi pedunculati.

Constitutio utriusque reliquis

pedunculi brevissimi in floribus in sepeo Grew

3
et da in Grew serrulata. folia ovato lanceolata
subtrinaria herb. Grew.

11
asiatica
Asiatia Grewia foliis cordato ^{subrotundis} subtus canis, pedunculis axillaribus subquaternis petiolo
longioribus.
~~Habitat in India Orientali~~

Rami pube canescentia:

Stem exacte figura et magnitudine Telio, supra glabra, quinque nervis: nervis
~~tomentosi~~ supra canescentibus, inaequaliter acute serrata
Petoli breves, clavati. ~~tomentosi~~

Pedunculi axillares. In fere quatuor superne terni, sesquipedlicares in flori:
pedicelli pedunculo duplo breviores. Stipula subulata petiolum fere equantes

~~Petala lanceolata~~ Petalis et reliqua ut in congeneribus
~~Petalis lanceolata.~~

Pedunculo gaudet longioribus quam reliquis speciebus hujus generis

Grewia asiatica foliis cordatis Lin. S.V. pag. 827. Mant. p. 122 *

Habitat in India orientali

Grosfelana ecclanica divicori herb. Herm.

asiatica La Martini est betulea ma fide h. L. m.

5-4. Ulisifolia Grewia foliis cordato ^{subrotundis} utrinque glabris, pedunculis petiolo
12 brevioribus

Habitat in India Orientali

Rami glabri, cortice fusco, cinereo minutissime punctati; juniores
subullosi

Folia palmata et ultra, nervosa, venosa, et ab lobo altero
basos panem breviora, obtuse serrata: serraturis subocyeali
bus

Petiole unguiculares, apice pulvenlenti, vix incrassati

Stipulae semicordatae, acuminatae, petiolo duplo vel triplo
breviores.

Pedunculi axillares, gemini vel terni, triflori, petiolo plerumque dimidio
breviores.

Involucrum triphyllum: folioli lanicolati, obtusi, concavi, longitudo

aeque pedicellorum
Calyx ^{extus} tomentosus, intus glaber, coloratus

germen breve petiolatum.

++ Fructus disco ² similis Gr. apathia diversa vero foliis duplo majoribus, obtuse serratis, petioli vix incrassati, stipulis semicordatis nec subulatis, Pe

o unculis petiolo dimidiis brevioribus minime vero ^{duplo} longioribus, floribus
duplo ~~majoribus~~ minoribus.

Microros ~~Lin. Cat.~~ Cateniflora Lin. Pl. Zeyl. ~~et Spec. p. 93 n. 208 et Spei:~~
plant pag. 792. quo in Syst. Veget. edit. 14. ad Grewiam asiatiam ab ^{Fl.}
Murrayamandebur potius huc referenda, cum folia glabra, ^{et} ~~stipula~~
se ferrata, stipula dimidiato-ovata et pedunculi petiolorum ^{separantes}
nostram potius plantam indicare videatur quam Grew. Asiaticam
in. Mant. pag. 122 de scripto, quo res ^{differt}, ~~apparet~~ tam ex descripti-
one Linnaeae quam ^{ex nostra satis apparet.}
A Grewia malococca ^{differt} fructu glabro ^{propter} ~~varique~~ alii ^{notis.}

Microros pedunculi axillaribus conferti dichotomis ^{Lin.}
fl. Zeyl. n. 208.
Handamanois Herm. Zeyl. 3. Burm. Zeyl. 113.

Microros Cateniflorum ^{Lin.} est omnino, vidi ^{dein} est herb.
Herm.

13 paniculata G. panicula Verminali

Schoger Collam Rheid. mal. 1. p. 105. t. 56

Microcos foliis alternis oblongis acumatis Burm. Zeyl. 159.

t. 74

Microcos paniculata: panicula Verminali Lin. fl. Zeyl.

2074 fide herb. Germann

Habitat in India orientali?

Rami vertes glabri. Folia petiolata ovata oblonga
trinervia utrinque glabra, pithamoua superne
obsolete serrata, acuminata, trans ^{long}versum oblique
subnata. Racemus Verminali compositus erectus
pithamou. Pedunculi alterni patentes bractea
lineari lanicolata utrinque ad basin singuli unia
pedicelli alterni triflori subsessile folio tomentoso
seceduo multifido involuati Calycis uniani

Grewia microcos Lin. f. H