

anema Loureni hujus  
generis Gussen

Guilandina

1. borduc G. aculeata, pennis ovatis membranaceis bijugis, aculeis foliorum  
petiolorum foliariis, racemo terminali composito
2. coniacca G. aculeata, pennis ovatis coriaceis supra nitidis bijugis, aculeis  
foliariis, racemi terminalibus compositi
3. borducella G. aculeata, pennis oblongo ovatis, foliis aculeis geminis.
4. nuxa G. caule inermi, foliis petiolo primario subtus aculeis geminis

axillans Gulandini

Aheed. Mal. C. tuberos

Habitat in India orientali herb. Fus.

Solida ovata. Flores tomentosi

4 nuxa Guilandina caule inermi, foliis petiolo primario subtus aculeis geminis L.S.V.  
p. 396

Nuxa Sylvanum Rumph. Amb. 5. p. 948. 50.

Habitat in Ambona, herb. fusc.

Legumina Coria fusc. len.

Stemba imparipinnata, 4 puga: foliola remota, patentia, quadripartita: pinnis  
ovata, nitida super, subtus pallidiora, acuta, opposita, bipollucari; venosa  
Petioli omnes fusco purpurascens. Racemi compositi: pedicelli sparsi.  
Calycis lacinae oblonga

Bondui *Guilandina aculeata*, pinnis ovatis, foliolis aculeis solitariis, legumi-  
nibus aculeatis.

Bondui vulgare majus polyphyllum Plun gen. 29.

Lobis ciliatis fructu flavo, foliis rotundioribus Roem herb. 2. p.  
40.

Frutex globulorum Rumph. Amb. 5. p. 89. T. 48.

Guilandina Bondui aculeata, pinnis ovatis, foliolis  
aculeis solitariis Ten. l. v. p. 396.

Habitat in India

Sordida luc. Flacant Madag. herb. Vaill.

non vid.

Phed. 6. tab. 20. ~~specimen~~ quod esse  
est. de la Martiniere. Pluk. non magis monent. et  
etiam Sloane obique datamento excluditur

2. *Conoclea quilandrona* aculeata pennis ovatis conacis supra nitidis bijugis  
aculis solitatis Racemis ternis vel quaternis compositis.

Habitat in India

affinis *Bonduc* forte varietas tantummodo. Differt folioli<sup>is</sup> parvis  
libus bijugis folioli duplo majoribus rigidis conacis supra  
nitentibus subtus pallidis flores majores  
*Samina basi peloponnesia*

paniculata

1 ~~Bondue~~ *Guilandina aculeata*, pinnis ovatis membranaceis trijugis foliis acutis  
solitariis ~~racemosis~~ ~~compositis~~ compositis, legumini vili glabris

*Panicum nullius* Bondue vulgare majus polyphyllum Plum. gen. 25.

*Rheed. mal.* *Cissampelos gloriosa*, lenticifolia, spinosa, flore spicata luteo, filiqua magna  
G. p. 33, tab. 19. ~~manente~~ Pluk. alm. 4. t. 2. p. 2.

*Guilandina* paniculata Lobis ceteratus fructu flavo, foliis rotundis cordatis Roan h. v. 2. p. 40  
an. petiolis *Tridax globulorum* Rumph. Amb. 5. p. 89. t. 40.  
que aculeatis

*Guilandina* Bondue aculeata, pinnis ovatis, foliolis aculeis  
fiori hispanica solitariis. Ca. h. v. p. 346. pedalis et ultra  
lati ciliatis

*Cyrena* ~~habitat in~~ *Malabar*  
toro glabra cordata fusca purpurea. Folia bipinnata 4  
legumini vili  
1 specimen ha  
mark Enc.

vel 5 pinnis pinnula 3 pinnis. foliola brevissime petiolata, pollicina  
na obtusifolia remota. Petiolus basi enormis a foliolo  
ad apicem aculeis prope recurvi petiolus partialis aculeo  
uno alterove plerumque datatum sub <sup>foliis</sup> a infertionem  
foliorum axuleus solitarius. Racemi <sup>vel gen</sup> ~~terminales~~ foliis dimis  
do brevioris enormes, compositi pedunculati partiales remoti  
pedicelli prope fileiformes

*Synonyma* ~~Nullius momenti~~ ~~abique datamento~~  
*detector.*

27 *Borducella* *Guilandina aculeata*: foliis pinnis oblongo-ovatis, foliolis aculeis geminis  
L. V. p. 396 *uniculique* *tomentoso*

Cajetti *Herb. Mat.* 2. p. 55. t. 22.  
*Borduc vulgaris* *mentis polyphallum* Plum. Gen. 25.

*Crista pavonis*, *glycyrrhiza folia*, minor repens *frinisissima*, flore lutescente  
nervis, siliqua latissima echinata, semine rotundo cinereo Breyn. prod. 3. app.  
33. t. 20.

*Lobus echinatus* fructu copio, foliis longioribus Sloan *Jam. hist.* 2. p. 41.

*Globuli majores* Rumph. Amb 5. p. 92. t. 49. fig. 1.

*Guilandina aculeata*, foliolis ovalibus <sup>retundatis</sup> ~~acuminatis~~ DC. *reyl.* 156.

*Glycyrrhiza*

Habitat in India

*Rami medulla fungosa, subullosi*. Folia duplicato-pinnata, foliolis ovalibus  
obtusis cum acumine *perforata*, in singulis partiali 6. 7. vel 8. parium. Flores  
in racemosis *specie*, calyce tomentoso, masculi. Her. DC. *reyl.*

*Rami teretes superne pubescentes* ad pres. *aculei* vario magnitudinis  
~~et~~ *copiosi*. Folia bipinnata <sup>trijuga</sup> pinnis pinnulisque oppositis, partiali  
bus 8. jugis inferioribus, pinnulis oblongis <sup>superius</sup> *glabris* subtus  
ullosi *minore* *minuto* *terminatis* *pinnosa* *tomentosa*. Petioli pubescentes  
sulcati *per* *aculei* *parvis* *pubescentibus* *apice* *fusis* *subtus* *ad* *singula*

par foliorum aculei gemini, partiales bipollicares aculei gemini ad singulum  
par pinnularum. Racemi axillares folio breviori <sup>pleniusque fere speciosius</sup> rigidi pedunculis pubescenti  
ti tomentosis <sup>sglatis</sup> aculeatis. Flores inferiores remotiores superiores conferti. Bracteo  
lanceolata floribus longioribus patentissimis reflexis. Calyx tomentosus. Legumen  
ovale villosum compressum aculeis longis obtusis. Leg



gemina *Quilandina aculeata*, foliis pennatis, calycis pentaphyllo, fructu gemino Lour fl. Cochinch. pag. 265.  
Habitat in sylvis Cochinchinae.  
Caulis fruticosus magnus pubescens. Rami multissimi  
dentes. Aculei multi, recurvi, sparsi. Folia simpliciter  
ternipennata, sine impari. Pinnis ovatis, obtusis, imbricatis  
geminis, glabris, aculeo solitario ad basin. Nervis  
terminales compositi latissimi. Calyx 5 phyllis  
folioli obtusi oblongi lanati campanulato per  
tentibus descendens subaequalibus. Petala calyce  
vix longiora ejusdem forma. Nectarum glandula  
4 orata. filamenta pilosa calycis inflexa aequantia  
anthera sagittata. Germena 2 longiuscula. Stylis  
totidem. Stigmata obtusa. Legumina 2 subrotunda  
compressa ciliata, locularia polyperma semina  
2-3 subrotunda nitida unevata unispina.

non vidi

~~montana P. panicula fr. neta, spiculis bifloris, flosculis basi villosi Hall~~  
~~herb. fr. herb. no. 1468.~~

Cochinchinensis <sup>Guilandina</sup> Hyperanthera foliis oppositis bipinnatis: siliquis subcompressis  
bivalvibus: seminibus nudiis

Anoma Cochinchinensis Lour. fl. Cochinch. pag. 200.

Habitat in sylvis Cochinchinae

Arbor 10 pedalis. folia impari bipinnata: foliola subovatae ceterum

non tomentosa minus. Panicula subterminalis floris albi.

Stamina <sup>exque</sup> alterna sive sterilia omnia adscendentia. Siliqua  
utroque attenuata. semina absque ala

— foliolo tomentosi

non vidi: un potuit Guilandina