

# Quivisia

Capsula quadriloculari conata, loculis mono-*spermis*

1. decandrum *Q.* foliis alternis lanceolatis, floribus racemosis
2. ovata *Q.* foliis alternis omnibus ovatis, floribus geminis plumbisve sessilibus axillaribus
3. heterophylla *Q.* foliis alternis ovatis integris pennatisfidisque, pedunculis axillaribus geminis unifloris
4. oppositifolia *Q.* foliis ovatis oppositis, pedunculis axillaribus trifloris.

• ovata Guinaja

Habitat herb. Guaj.

Rami glabri, teretes, ciliati cili, apice angulati, villosi. Folia vix pollicaria,  
oblonga, venosa. Peduncululi brevissimi, subpedicellati flori.

*Oppositifolia* *Qui vigilia*

Habitat herb. 4 usq. 3

rami ciliolati, glabri, superne compressi. Folia bipollicaria vel pa-  
rum longiora, oblongo-ovata, serrata, obtusissima, basi acutiora. Petioli angustula-  
res.



*Diandra quivisia*

Herb. herb. Quiv.

Racemi teretes, glabri. Folia ovato-oblonga, vel oblonga, apice obtusa, basi acuta, bipollicaria, venosa. Racemi breves, secundari. Pedicelli, uti calycis et corollae exteri conascenscentes. Pedunculi angulati.

nitidas *Torchelia* foliis simplicibus ellipticis glabris, racemis axillaribus brevibus nutan-  
tibus.

Habitat in India Orientali &

Rami teretes. Folia petiolata alterno bis. Tripollicaria obfuscula  
basi acuta venosa supra nitida. Petiolus unguicularis. Racemi solita-  
ri longitudine pedicellum simplicis pini & flon. Calyx glaber & dentatus  
Petala 5 cannae stamina 10

Quinque decem



4. oppositifolia G. foliis <sup>ovatis</sup> oppositis, pedunculis axillaribus trifloris  
Quercia oppositifolia: foliis oppositis ovatis integerrimis gla  
bris: floribus axillaribus, pedunculis trifloris Cavan. Des. Tab

214

Habitat

3 heterophylla <sup>altensis integris</sup> Quirisia <sup>ob</sup> foliis ovatis, pinnatifidisque <sup>pedunculis</sup> floribus axillaribus <sup>sub</sup> geminis  
<sup>unifloris</sup> Quirisia heterophylla foliis ovatis integris aut pinnatifidis: floribus  
axillaribus binis. Pavon. des. Tab. 213.

Habitat in Insula Francia Fresco t

Rami teretes rugosi <sup>ramuli</sup> superne compressi. Folia petiolata  
sparsa obovata vel oblonga basi acuta, integerrima glabra  
superius nitida subtus pallida <sup>vel, tenui</sup> vetcha pollicaria vel <sup>ramis</sup> ultra <sup>minor</sup>.  
Flores ex tuberculis <sup>subtatis</sup> axillaribus, geminis, brevissimis unifloris  
Calyx subtruncatus. Corolla extus pubescens



2 ovata Q. <sup>altis</sup> <sup>omnibus</sup> foliis ovatis, floribus subsessilibus geminis pleribusque

Qui ipsa ovata foliis ovatis alternis integerrimis: floribus subsessilibus axillaribus binis aut pleribus Cavan. Desj. Tab. 212.

Habitat.



<sup>alternis ellipticis racemis axillaribus</sup>  
Decandra Qu. foliis lanceolatis, floribus racemosis  
Quivipia decandra. foliis alternis lanceolatis glabris integerrimis,  
floribus axillaribus racemosis Pavan. c. 211.

Habitat.

Rami teretes glabri & supreme subangulati. folia petiolata  
alterna, tripollicaria integerrima obtusiuscula basi  
acutem utraque glabra venosa. Raci petioli usque  
quicquid. Racemi axillares longitudine petioli  
6-8 flori cernui pedicelli semperque unicelulares cernui  
calyx et corolla extus unisepali.

a Guarea via genere differt quivisia, differentiam in Capsula cona-  
cea ponit An Cavanillas, et nonne omnes capsula conaceo dicenda  
si carnosae vel succulentae ~~et~~ nomen capsulae aliud adijciunt, conaceae  
~~et~~ membranaceae non nisi gradu differunt hinc nullam differe-  
ntiam inter qu. et quw. venum ad est