

Guroelia

1. Tournefortii G.

Descript. vide inter observat. no 147

Tournefortii Gundelia L.S.V. p. 797. Gronov. Oneid. 251.

Tachyum Dioscoridis s. ~~Acub~~ Haicub alii ardey serapionis Rauwolf. s. 74. t. 74.

Eryngium Syriaicum, foliis chamolentis longis et spinosis Monf. h. 3. p. 167.

Gundelia orientalis, acanthi aculeati folio, capite glabro Tournef. Corol. 51. Pl. 2. p. 108. t. 108.

β. Gundelia orientalis, acanthi aculeati folio, floribus inter se purpureis, capite araneosa lanugine obfuso Tournef. Corol. 51.

Habitat in Armenia, Syria, Aleppo & ex hort. Paris. habui

Capitulum terminale, solitarium, foliis pluribus semper ~~et~~ aliis minoribus, lanceolatis rigidis circumsvallatum, ^{adque} calyx communis & fasciculi florum plurimum, 3 & flori, plerumque 5 flori compositum, rariorem ad basin capitulum ^{uni} flori receptaculo undique confectum in adnatis unatis. Bractea ad basin paguli fasciculi cuneata, amplectens superne ⁱⁿ aequaliter, spinosa dentata, attenuata, desinens in mucronem rigidum spinosum: palea proterea 3-5. figura bractea et minores et angustiores, omnes in medietate a receptaculo orto. Fasciculus pagulus constat tot calycibus tot quot flores, inter se tubis crassis ita concrescentibus in unum corpus obresse subpyramidatum, obtusangulum, ceteris totidem lobulis efflosum et limbi eandem a perianthem remanentem ~~discreti~~ ⁱⁿ pagulo lobulis connatis, inaequalibus sub quoque partiti, ovati attenuatis spinos centes marginibus inaequaliter den

tate pinnos, tubo breviora. Ovari omnes flocculati, unio in prozulo fascicu-
lo, subcentrali, hermaphroditi, fertili: ceteri q. s. hermaphroditi, steriles. Sterili-
um calyx propinquo ab ovario non distinctum. Cor. extus obsolete fusca
purpurea. Limbus intus lutescens, subinfundibuliformis, tubus prope
superior lateros, subclavatus. Limbus 5-que partitus; laciniis patentissimis lan-
ceolatis. Filamenta 5-que. Anthera filamentis longiora, in tubo 5-que dentata con-
nata, limbo breviora. Germina imperfecta, fideiforme, superius in raspetra
alveolo angustiore. Pappus margini subcupulani, membranaceo dentibus
tubo. Stylus filiformis, antheris longior, cylindricus, apice in vespa gracili
attenuatus, in corpus, glandulis pilosive hispulum. Flocculi fertiles corol-
lae proin, limbo tantum erecto. Humina ita proinbus nudo nudo
vibris. Germina amplitudine alveoli, oblongo ovatum, basi abrupte attenuatum
superne in collum coasum angustatum. Pappus cyathiformis dentibus
Stylus filiformis, superne superius parum imposit. Stigma bifidum, longitu-
dine corollae, recurvo spatuli obtusi. ^{Stigmatus} Semen germinae parva pro-
fusa inferne vix vix notum, contracta femina tinnica oblongum
subcompressum, fuso affixum coctum tubum