

Gustavia

angusta *Justaria* Lin. *Def. pl. Linn. p. 180. c. tab. Suppl. p. 313.*

P.S. p. 620

Pingara tetrapetala

Aubl. fl. Guian. p. 477.

Tab. 192.

Taparandua *Martyn* *traf. 109. puf. traf. 121.*

Habitat in Surinamo et Cayenna & dicitur a Richard

*Arbor ramis crassisulis, 20-30 ped ali. Folia alternata, subsessili
confertiuscula, superne lato cordata, basi angustiori, spi
thamoa s. pedalis, costae subnatae, utraque glabra. Re
dunculi terminales duos. 2. 1 flori, uniaxillati. Flo. specios
simus *Nymphaeae* albo major, disci s. receptaculo inter corollam
et stylen ample nudo calvoque.*

*Flores fragrantissimi. Lignum foetidum, tuis puant adhibetur
ad dolorem legatura. Flores verminales pedunculi ten
gesti. Flores in figura *Aubl. planta addita ad aliam speciem
pertinet huc hinc.**

*Folia superne approximata, brevissime petiolata, semipedalis
elliptica, basin versus sensim angustata, venosa, utraque
glabra, venata fenata hinc hinc mania.*

Pinguicula hexapetala Aubl.

Habitat Cayenna Richard

Rami teretes, sparsi, ciliatissimi, glabri. Folia ad apices ramorum, alterna, breviter sive petiolata, tripollicaria, oblongo subtriangula, membranacea, glabra, venis nervis extus sum per se lani remotis obscuris, acuminata, basi attenuata. Pedunculi medio bracteis lani oppositi. Calycis lacinae, ovatae.