

Haloragis

1. eriodia fl. foliis lanceolatis serratis dentatis floribus verticillatis
2. prostrata fl. foliis lanceolatis integerrimis, fructibus globosis

2 prostrata Haloragi foliis lanceolatis integris, fructibus globosis L. Herbaris
Toiss. Genera p. 62.

Habitat in Insula Botanicæ. Nova Caledoniæ, Pinarum insularum
Rami tetragoni basi cicatrifati. Folia basi attenuata, opposita
sespita acutiuscula, crassa avenia, unguiculata. Stipulae geminae
patentes aciculares rigida. Pediculi axillares sespites. Fructus
glaber uti tota planta, magnitudine seminis coriandri.

12-17 filamentosum *Ocimum* racemum ^{terminalibus} ~~aphyllis~~ foliis oblongis serratis superioribus integerrimis, fila-
mentis longissimis

Ocimum filamentosum; foliis ovato-oblongis, serratis, filamentis Corolla
duplo longioribus Torr. descr. pag. 100.

Truncus ramis tenuissime villosis, subcanis.

Folia inferiora oblonga, serrata, subvillosa, semipollicaria: superiora
lineari-lanceolata, integerrima, obtusa, mucronata supra glabra
subtus tenuissime villosa.

Racemula ramulorum ex omnibus axillis

Racemus terminalis, erectus; verticilli duo per floribus. Flores inferiores remotiores
et flores brevissime pedicellati, callosis in pedicellis, ~~longioribus~~

bracteis minutis, ovatis, mucronatis, caducis.

Calycis corolla duplo brevioris, villosi; dentibus inferioribus binis setaceis
superioribus ovatis obtusis.

~~Corolla~~

Filamentis basi villosis corolla duplo longioribus

Diverga ab *Ocimo* grandiflora de L'Herminier

Haloragis

1 Calyx superius quadrifidus. Petala 4a. Filamenta octo receptaculo inserta. Germen inferum - Nyli 4^o *Drypa nua quadrifidula* ^{Heret. fl. nov. fol. 4 tui pag. 12}

tetragonia Haloragis foliis lanceolatis ^{sem. separata & antatis} *fructibus tetragonis* ^{floribus vestri deato}

Tetragonia irifolia Lin. Suppl. 257. 4

Periodia erecta Mur: Com. gött. 1780 p. 3. 1. 1.

H. alata Gaeyh. m. p. 2. 332 uon 26.

H. canodea bot. beobacht. 1783. p. 73.

Habitat in nova Zelandia &

suffruticosa bipedalis ramosis, paniculatus, erectus tetragonis angulis scabris. Rami oppositi. Folia petiolata opposita, glaberrima ovata, lanceolata, scabra serratis pungentibus. Nervis nullis. Flores in summitate ramorum, axillares terni, pedunculati, ~~caerui~~ Pedunculi fructiferi reflexi. Corolla tetrapetala calyce longiora caduca. Stamina plerumque duodecim foliolis calycinis inserta uniat floribus petaloidis, et apetalis fructus tetragonus

Cenodia

Habitat in Novobomio herb. Thonini

Rami glabri, angulati. Folia sesipia, lanceolata, pollicaria, glabra, acuta,
argute serrata, alterna, venia, nervia. Flores axillares, plures, sesipis