

Hamellia

axillari subhirsuta, racemis axillaribus; floribus secundis triplatis, foliis ovato
auriculatis.

Chrysantha H. racemis terminalibus; foliis oblongis lanceatis acuminatis glaberrimis
floribus pedicellatis

grandiflora H. foliis longatis, tubo corollae ventricoso (an eadem cum sequente?)

ventricosa H. racemis terminalibus axillaribusque, corollae campanulatae ven-
tricosae, foliis ternatis

Corymbosa H. foliis lato lanceolatis oppositis glabris; panicula terminali; corollae
terminali

Rubea H. foliis oppositis ovato-ellipticis

colicinea H. racemis terminalibus coloratis; foliis ternatis subtus villosis
bispentibus

erecta H. foliis ternatis lanceolatis ramisque villosis, racemis terminalibus

padeni Hamellea


von Rohr no 65

Folia per nata ovata subtus canescentia Rami bifidi Corymbi
in divaricataura innumerum et apice quadrifidi ramis dichotomis

Culex Hamellii

von Rohr no 110.

folia utriusque glabra



*Hemella ex Infula
truncata*

Sentrifosa Hamellia raris in terminalibus axillaribusque, corollis campanulatis ven-
tricofis, foliis ternatis. Sw. Prodr. pag. 46.

Ex insula Trinitatis D. Ryani.

Rami teretes, glabri.

Folia petiolatis, ternata, saepe subspecta mox, elliptica, attenuata, integerrima,
venosa, venosa, glaberrima, subtus pallidiora.

Petiolus pollicaris. Stipula in ter singuli petioli, brevis, acuminata, ad-
pressa.

Comptis terminalis: ramis dichotomis

Calyx marginis superior, brevis fere, quinque dentatus.

Corolla pollicaris, singulatis, tubulosis, inferne angustatis, superne
 dilatatur. Laciniae ovatis.

Stamina si Camenta quaeque, corolla inserta: Anthera lineares. corolla
 breviores

Stylus geminum inferum. Stylus filiformis, longitudine corollae. Stigma
 intraspatum

Pericarpium Bacca oblonga, calyce coronata, quinque ~~loculari~~ loculari, polysper-
 ma

patens Hamellia foliis subtus tomentosis, tubo corollae cylindrico.
L'Heret. pag. 4

Rami trigoni vel tetragoni folia subtus magis pubescentia, supra nitidiuscula
tripulo subulata. Corolla tubus pentagonus. Calyce ruber. Bacca obsolete
pentagona, 5 quatuorlobis, calyce coronata. Th. Penn.

Hamellia patens, ramis trilobatis foliis ternis quaternisque oblongo-lanceolatis
floribus cymosis fecundis
Th. Penn. 2. p. 60 Tab. 221. fig. a

Sphaerocarpa Hamelia

Hamelia sphaerocarpa, ramis teretibus, foliis ternis oblongis, floribus
subdymosis & C. Penn. 2. pag 69 tab 221. fig. 6.

Habitat in Penna nemoribus

Paulis horzyalis, Rami terni, Yeter: Yeneri hirsuti, rubicundi.
Foliaterna petiolat, oblonga, undulata, integerrima, utrinque hirsuta,
venosa, nervi et veni rubri. Petioli foliis breviora, pumicci, superne sulcati.
Hypella interfoliacea, ovato-lanceolata, acuminate, decidua. Pedun-
culi ^{sub} corymbosi, dilute rubicundi. Flores ~~pro~~ secundi pedicellati. Calyx
sque dentatus. Corolla pumico-coccia. Tubi pentagonus. Lacinis limbi rubro
vires. Bacca globosa magnitudine cavis, calyce coronata, sive loricis
laxis, purpureo nigra, hirsuta. Semina orbiculata

coicinea. In racemis terminalibus celeratis, foliis ternato villoso-pubescentibus
Sw. prodr. pag. 46.

Lonicera Plum. ic. p. 210. f. 2.

Hamelia Jacq. herb. 72. t. 30.

Habitat in Hispania

Rami teretes superne villosi folia petiolata ternata ovata
tri-4 pollicaria venosa, nervosa supra glabra subtus villosa. Stipula
la subulata. Corymbus terminalis compositus dichotomus flores sespales
unguiculatis glabri

Perichymum aliud aboreicent. ramulis inflexis flore corollato
Plum. G. 210. f. 2. Jacq. Plum. apud 9. f.

ovatis subtus villosis

an pubens len.

axillaris Ham. subherbacea, racemis axillaribus, floribus subsessilibus
foliis ovato lanceolatis Sw. prodr. pag. 46.

Habitat in Jamaica, Hispaniola

non vid.

Chrysantha Ham. racemis terminalibus, foliis oblongis cuneatis acuminatis glaberrimis, floribus pedicellatis Sw. prodr. pag 46.

Lonicera Plum. ii. 210. fig. 1.

Campanula Brown. jam. 166. Tab. 14. fig. 1.

Habitat in Jamaica

Perilymenum aborescens ramulis reflexis flore lacteo Plum. Ac. 210. fig. 1. Plum. in mus. Juss.

non vidi

Lespeliiflora Hamellia? floribus Verminalibus sespilebus; foliis ternis glabris
acuminatis Willd. spec: pl. pag 901.

Amazonia Guianensis Aubl. Gu. 2. Supl. 73. tab 375

Hamellia glabra foliis ternis glabris, fructibus congestis sespilebus
La Marti Encycl. 3 p. 65

Habitat in sylvis Guianae
flos: nondum notus

mihi ignotus

Grandiflora Hamellia foliis longatis, tubo corollae ventricoso L¹⁴ Heret. Pest. Angl.
t. 7. Hort. Kew. 1. p. 229.
Habitat in America India occidentali &

~~non~~ eadem ac ventricosa Sw

Corypholoba H. foliis lato lanceolatis oppositis glabris, panicula Vermenali corollae
tubulosa

Habitat in India orientali F

Rami glabri folia petiolata pithamoa venosa integerrima utraque
attenuata. Panicula Vermenali ramis dichotomis floribus pedicellatis
alternis unguiculatis

verticosa 4 racemis Terminalibus axillaribusque, corollis campanulatis verti-
catis, foliis ternatis in pedic. p. 46.

Campanula L. Brown. jam. 166.

Habitat in Jamaica

non vidi

vide inter ameni

om Plum. 212 fig 2 notus
huc pertinet

trifoliata *Hamellia foliis petiolatis* ^{canaliculatis} *ternis ramis foliisque subtus villosis*
+ hab. in Ind. Occid. h
Rami teretes villosi. canaliculato
Folia petiolata, ternis elliptica utrinque acuta, patentissima
et integerrima, villosa profertim subtus, ^{fomentosa}, patentissima
et ultra
Petiolus villosus unguiculatus
Stipula subulata per erecta petiolo quadruplo brevior inter
singulum petiolum.
Flores paniculati.
germen villosum
Corolla et in Ham. patens

Conferatur + *Hamellia erecta* Jacquin

cutem
petens

ovato

Hamamelis foliis oppositis ellipticis ~~Rami~~

~~glabri~~ Rami saepe villosi interdum glabri

foliis ovato ellipticis utraque ciuta juniora subtus praesertim
villosa supra vix ~~in~~ versus marginem magis ut fere ciliato interdum

glabra

Floris in panicula trichotoma. | sessilibus in densa

stipula ad latera petalorum