

Hedyotis

Hedyotis hispida  
et verruculata) certe speciei Spermatocei fide herb. La Monte

biflora  $\mathcal{H}$ . foliis lineari-bus <sup>subtus</sup> marginis <sup>marginis</sup> scabris, petalis pedunculis axillaribus  
subbifloris stipulis setaceis

Habitat in India orientali

Caulis <sup>herbacei</sup> filiformis glabri tetragonae lineis decurrentibus  
in herbis ramosi rami elongati. ~~folia~~ folia sessilia oppo-  
sita palmata, glabra, acuta subtus pallidiora scabri-  
scula <sup>in venis</sup> inter nodos parum longiora. Stipula membrana teris folia  
connectens marginem setas 3-5 dimissas. Pedunculi axillares  
solitarii interdum oppositi plerumque biflori interdum unus  
nonnulli uniflori ~~in folio triplo breviori~~ vix semper unquam  
laevi pedicelli longitudine pedicellorum

ab  $\mathcal{H}$ -habaica diversis stipulis, foliis angustioribus pedunculis  
brevioribus ~~per~~ plerumque biflori

Graminifolia <sup>Hydrocotylis</sup> ~~Hydrocotylis~~ foliis linearibus, caule decumbente, panicula racemosa  
~~fructu~~ ~~pedunculo~~

~~Hydrocotylis~~  
Oldenlandia Anita pedunculis racemosis terminalibus, foliis linearibus, calice erecto bracteato Lin. l. V. pag. 162.

~~Hydrocotylis herbacea~~ Coffh. Cat. pl. arab. pag. 105. n. 20.

Hydrocotylis graminifolia: foliis linearibus, caule decumbente, panicula racemosa fructu, pedunculis plepquis Lin. l. V. pag. 147.

(Oldenlandiam fructam ab Hydrocotylis graminifolia specie non differre, evincunt specimen Herbarii Linnœani

variegata Hedysotis foliis lanceolatis, panicula dichotoma fructa, pedunculis  
lateralibus geminatis. ~~Stem~~ Stule erecto Wild-spec: pl. pag. 567.  
Habitat in Guinea 2

michi ignota

racemoso Hydrocotyle foliis lanceolatis, racemis axillaribus terminalibusque

Habitat in Guinea Isid.

Caulis herbaeus, erectus, glaber, uti tota planta. Folia sessilia, pollicaria,  
acuta, venia, nervia. Stipula utrinque membranacea connata, exaestivata.

<sup>ut nunc</sup> singula seta latera seta unica prope folium. Pedunculi axillares, folio  
longiores: pedicelli distantes, inferiores triflori, superiores biflori. Flores  
pedicellati, minuti. Tubus corollae brevis

# fructiferi  
recurvi

municata Hedyotis foliis linearibus lanceolatis, pedunculis bipartitis, floribus oppositis sessilibus, caule mucronato scabro.

Habitat in India Orientali Rottler C

Caulis erectus, semipedalis, inferne ramosus: rami simplices, uti caulis & margini carinaeque foliorum a papillis albidis frequentissimis scaber. Folia sessilia, sesquipollicaria, mediante membrana brevis basi connata, valde attenuata, avenia, <sup>suprema angustissima</sup> ~~pedunculi~~ gemini ex apice, plerumque cum pedunculo unifloro indivisum, plerumque simpliciter raro bifido. Flores superne, duum vel trium parium. Capsula magnitudine Coniadii. Semina nigra, ope lactis rugosa.

*pygmaeum Onchidoicarpum* folio lanceato lanceolato basi acuti

Habitat in Carolina herb. Ant. M. or. ch  
Rami teretes, glabri. <sup>non pubescentes</sup> Folia <sup>tripolliciana</sup> breviter petiolata, <sup>lanceata</sup> bipolliciana, lanceolata, glabra  
<sup>lasi</sup> utrinque acuta, venosa. <sup>vel trice oblonga</sup> Paniculi <sup>terminali</sup> axillares, solitarii vel gemini. Caly  
cis foliolata <sup>petalis 4-5 pl. brevior</sup> ovata, villosa. Petala <sup>exterior</sup> oblonga, pollicaria, uti grand. ungue  
ft nato. <sup>glaber</sup> Fructus oblongus, <sup>2-3</sup> magnitudine <sup>perum</sup> pini, <sup>longo mucronatus</sup> comae mucronatus  
Receptaculum, fructus magnitudine <sup>perum</sup> pini

galioides Herpatis foliis lanceolatis oppositis ternatisque caule que pilosis, cymis ter-  
minalibus axillaribusque subcrotomis

Habitat in Andea Orientali.

Caulis herbaceus <sup>nedatis?</sup> vel simpliciter ramosus, acuta tetragonus,  
tenuis, pilosus. Rami caule dimillimi, erecto patentes. Tota subpeltata  
f. opposita vel ternata, semipollicaria, <sup>basi apiceque acuta,</sup> utrinque pilis  
flavescentibus adspersa, supra convexa, subtus nervosa obscura nervoso-  
venosa. Stipula utrinque ad latus singuli folii, subulata, semienquivalaris  
pilosa. Pedunculi axillares et terminalis, subcrotomis ramosi, cum pe-  
dicello unifloro in divisuris: pedicelli capillares glabri. Capsula parva  
glabra, dentibus minutis coronata.



*Chenopodium folium Convolvulus*

Habitat herb. Gusf.

Caulis herbaceus, prostratus (volubilis?) pilosus. Folia petiolata, pollicaria, oblonga, remote serrato-incisa, obtusissima, glabra, venosa-nervosa, basi acuta. Petiolus semipollicaris, pilosus. Pedunculi axillares, 2-3 flori, brevissimi, hirsuti. Calycis laciniis lanceolatis, acutis.

sessili flora <sup>glabra</sup> Hedyotis, foliis linearibus subulatis, floribus axillaribus geminatis  
sessilibus, caule prostrato

Habitat in India Orientali Herb. Chonker.

Tota glabra. Caules filiformes, subtetragoni, remote ramosi,  
elongati. Folia sessilia, bipollicaria, linearia, margine revoluta, nervis  
integerrime acuta, mucrone rigidiusculo terminata. Stipulae seta  
civ. Capsula subglobosa magnitudine Conoclini coronata calycis dentibus  
canaliculatis ope lentis simulatis.

*Hedyotis conferta* foliis linearibus acuminatis, caule ramosissimo repente,  
floribus terminalibus solitariis fl. Peruv. l. pag. 57. Sub. 07. a.  
Habitat in Alpibus Peruvio

Caulis suffruticosus, ramosissimus, tetragonus. Rami confertissimi  
obtusae tetragoni repentes. Folia confertissima, <sup>connata</sup> parva, linearia, acumi-  
nata, glabra, plana, integerrima. Stipula subulata. Pedunculi  
terminaliter solitarii, uniflori. Corolla alba. Anthera faucem  
occludens. Capsula globosa, emarginata fl. Per.

*Hedyotis filiformis* foliis linearibus acuminatis, caule ramoso primo filiformi re-  
pente, floribus terminalibus solitariis & multinatis fl. Peruv. 1. pag. 57. Tab. 87. f. 6.  
Habitat Peruvia montibus frigidis

Caulis herbaceus, depressus, diffusus, ramosus, filiformis & tetragonus.  
Folia sessilia, linearia, seta terminata, integerrima, leviter ciliata,  
subtus striata. Stipula subulata, ciliata. Pedunculi terminaliter, uni-  
flori, solitarii. Corolla alba, limbo demum reflexo. Semina orbicula  
sa angulata fl. Peruv.

*Hedyotis juniperifolia* foliis lanceatis margine revolutis; caule ramosissimo,  
floribus terminalibus ternis fl. Penw. l. pag. 57. Tab. 07. fig. C.

Habitat in Pen Tamo altis et frigidis

Caules suffruticosi, prostrantes; semipedales, ramosissimi, tetragon.  
Ramuli conferti. Folia lancea, parva, juniperi, glabra. Stipula ore  
to, acuta. Pedunculi terminalis triflori. Semina oblonga, angulata  
nigra. fl. Penw

Hedysotis setosa foliis ovatis acutis cum acumine petiolatis, floribus terminalibus  
Liber Ter nio fl. Penn. 1. pag. 57. tab. 80. fig. 6.

Habitat in Cerdum montibus 3.

Caulis fruticosus, quadripedalis, erectus, ramosus & simus, ter. Rami conferti semi-  
erecti stipularum articulati. Folia breviter petiolata, ovata, acuta, cum  
acumine mucronis, obsolete serrulata, glabra, subtus bilineata, coriacea.  
Stipulae interfoliaceae, membranaceae, connatae, ovatae, acutae, superne multiflorae.  
Peduncululi terminaliter, terni, aliquando quaterni, uniflori, breves. Corolla  
purpurea. Capsula 2 loculari bivalvi: valvulis bifidis, semina nigra fl.  
Penn.

*Hedyotis thymifolia*. foliis linearibus, marginibus revolutis, floribus corymbosis  
flor. Penw. 1. pag. 56. tab. 86. fig. a

Habitat in collibus altis Tarma 5

Caulis fruticosus, bipedalis, erectus, teres, inferne nudus, ramosissimus. Rami  
erecti, obtuse tetragoni, hirsuti. Folia sessilia, glabra. Stipulae 2, inter  
foliaceae, bipartitae: lacinae dentiformes adpressae. Flores terminaliter. Pedunculi  
2-5 flori. Corolla alba. Capsula obcordata, bilobata, 2 valvi sulcati  
bifidi. Semina 2 in singulis loculis nigra fl. Penw.

Pedunculi tri vel tetra dichotomi

*Serpulloides Hedysotis*

Habitat he                      herb. la Martini  
Triticulus ramosis, dichotomis, glaber



Diffusa Hedysotis foliis lanceolatis acutis, floribus alternis pedunculatis  
caule procumbente Diffusa Willd. Spec. pl. pag 567  
Habitat in India Orientali

michi ignota

umbellata G.

Walth fl. Carol.

2 Tetrandra Peplis floribus tetrandris monopetalis An. Am. acad. 5. p. 412. Jacq. Amer. 10  
t. 100. fig. 29. L. P. V. pag. 345\*

Ammannia hirta, foliis parvis orbiculatis, floribus singulis ad alas  
Brown. jam. 145.

Habitat in Jamaica

Plantula tenella. Radix fibrosa tuba granulata. Caules teretes, glabri, bi  
polliares, ramis alternis rarisque, procumbens. Folia ovata sub  
cordata, obtusa, integerrima, glabriuscula, petiolata, opposita. Stipula  
utraq. parva coriata. Pedunculi uniflori, breves solitarii, axilla  
res et terminales. Corolla candida Jacq.

Tuberosa Aedyoti foliis subsessilibus cordato-ovatis summis quaternis  
floribus umbellatis. Terminalibus Sw. off. pag. 136. Tab. 6. fig. 2

~~Folia utriusque speciei~~

non vidi

manihota Hed. foliis ovalibus obtusis, floribus oppositis sessilibus Lin. Suppl. p. 119  
S. V. 147.

Habitat in Tranquebaria

Racis Peplis portula. Caulis plures, palmares <sup>prostrati</sup> ~~procumbentes~~, rami  
ramosi glabri. Folia oblonga <sup>ovata</sup> ~~oblonga~~ <sup>semicuneata</sup> ~~oblonga~~ basi in  
necrolium <sup>dehinc</sup> ~~dehinc~~ <sup>sub</sup> ~~sub~~ <sup>areolata</sup> ~~areolata~~ <sup>glaberrima</sup>. Flores brevissimi pedun-  
culati <sup>medicamento</sup> ~~foliosi~~ <sup>in mylonum</sup> ~~foliosi~~ <sup>in grollis</sup>. Siliqua glabra magnitudine seminis Conradi  
molle (ut videtur tetrapetala an igitur potius Oldenlandia) Calyce  
a Capsula matura facile discidens

rumula *Hedyotis* foliis ovatis acutis, floribus alternis pedunculatis Lin.  
Sesquipl. pag. 119. f. V. pag. 147.

Habitat in Tranquebaria

Basis anagallidis arvensis. Caulis, ramum ramosi laxes. Folia  
anagallidis utrinque acuta, vix petiolata, coria. Pedunculi  
laterales, solitarii, alterni, capillares, erecti, longitudine foliorum  
Capsula subrotunda, utrinque sulcis dentibus quatuor calycis corona  
ta, biloculari Lin.

fruticosa fl. foliis lanceolatis attenuatis, <sup>pedunculatis</sup> corymbis terminalibus involucriatis  
Cassia fruticosa, fl. pulvis integris  
Lin. H. Zeyl. n. 634

Valerianella foliis nervosis acutis, flosculis in caulum summo quasi  
involucriatis Burm. Zeyl. 227. t. 107.

Habitat in India orientali

Dacrydium Phyllitidis Ramis obfusce tetragonis glabris, articulatis. <sup>articulis semipollicibus fere</sup> folia breviter petiolata  
nobis <sup>velut semper longiora</sup>  
Lato lanceolata, <sup>attenuata</sup> multinervia pallide viridia. <sup>fere quod in pollicibus</sup> stipula ovata  
acuminata rigida basi petiolo adnata. Pedunculi ex ax. illis ul-  
timis oppositi terminaliter terni, <sup>ramificati quibus</sup> trichotomi folia duo lanceola-  
ta sub diversis primis pedunculi. Calycis hirtis apice

Hedyotis fruticosa foliis lanceolatis petiolatis; corymbis terminalibus  
involucriatis Lin. H. Zeyl. n. 634 P.V. p. 147

humilis  
Foliosa 9 foliis ovatis petiolatis glabris enerviis, corymbis axillaribus  
terminalibusque

Habitat in Thulea Haerem in Dahl.

Trunculus humilis ramis glaber ramis tetragonis <sup>subditis</sup>  
lomis. Folia petiolata <sup>parvis attenuata</sup> opposita sex pollicaria gla  
ba integerrima aerea enervia acutiuscula. Stipula

brevi acuminata folia connectens. Pedunculi axillares <sup>parvis</sup> oppositi

et terminales folio parvis longioribus, ramis <sup>subditis</sup>  
subfastigiatis folium utriusque parvum ad basin primi rami  
fixationis. Capsula glabra semine Rupeorum duplo major. Calycis la  
cimis subulato corolla semunquiclaris

Foliosa in herbano

Aunicularia Hedycotis foliis ovato-lanceolatis nervosis, floribus verticillatis caule bifario  
peloso

Muniquiti Rheed. mal. 10. p. 63. t. 32.

Valerianella palustris, foliis nervosis oblongis, flosculis ad caulium nodos inter  
foliorum junctas Burm. zeyl. 227. t. 108. fig. 1

Hed. Aunicularia foliis lanceolato ovatis, floribus verticillatis Lin. Flor. zeyl. p. 64 \*

S. V. p. 147

Habitat in Zeylone <sup>prope bipedalis</sup> prope rivulorum

Caulis herbaeus <sup>prope bipedalis</sup> erectus obscure tetragonus linea pelosa utrinque decumena  
te, articulatus ramosis. rami axillares patentissimi, simplices spitha  
moi. folia elliptica, inter gemma pollicaria, glabra, pallide viridia  
subtus nervis 9. suboppositis exstantibus; basi interdum cante membranula  
decemfida connata dentes inaequales lineares pelosi. Flores pedunculati numero  
si pedunculi capillares longitudine styculi parum longioris



capitata *Hedyotis foliis ovatis acatis, <sup>Stipulis setigeris</sup> pedunculis trifidis floribus capitatis*  
caule herbaeae

Habitata China et India orientali

Differt a fruticosa, caule herbaeae foliis ovatis acuminatis duplo  
brevioribus petiole supra lineato-paucinerviis. Stipulis brevibus  
petiolo adnatis in 4-5 laciniis setaeae divisi. Pedunculi axillares  
et terminales trifidi primis laterales parvales primum erecti  
suscipiunt demum horizontaliter patentes. Fructus magnitudine  
Conarum, Calyx glaber

α *Hed. auricularia* foliis petiolatis multo majoribus  
floribus per capitulum pedunculatis dignoscitur  
folia internodiis longiora  
stamina et pistilla corolla longiora

Herbacea Hedyotis foliis linearibus lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis  
geminis Lin. Fl. Zeyl. n. 65. & S. V. pag. 147

Oldenlandia tenuifolia: pedunculis unifloris alternis foliis linearibus; pedun-  
culo longiori Burm. ind. p. 37. Tab. 14. fig. 1.

Oldenlandia tenuifolia: pedunculis axillaribus solitariis unifloris: foliis  
linearibus subulatis Torr. prod. n. 57

~~Paspodagon Rheid. Mal. 10. p. 69. & 95.~~

Schanganon - pulle Rheid. 10. p. 45. Tab. 27 & Thun - Tonganam -  
pulle ib. Tab. 26. pag. 51

Caulis saepe sesquipedalis dichotome ramosis articulatus ad haeculum  
genuculum ramosis, glaber uti: tota planta foliis linearibus lance-

ata <sup>erectis</sup> uti vel interdum sesquipedalibus pedunculi gemini ad  
singulum ramificationem uniflori <sup>capillares</sup> ~~pubescentes~~ foliis brevioribus  
capitulo glabro raro. stipula minutissima ~~et~~ membrana brevis im-  
membrata inferne evanescens. Corolla parva

Stipulis brevibus siccis mucronatis

~~hott~~  
~~Trichotoma~~

Med. ? foliis lanceolatis lineato nervosis, paniculis axillaribus trichotomis  
cauleque hirsuto.

Habitat in Andra Orientali

Caulis erectus, simplex herbaceus hirsutus, prostratus superne, tetragonus sesqui  
pedalis. Folia <sup>pilosa</sup> opposita subsessilia utrinque acuta supra lineata  
subtus nervosa, pilosa in primis in nervis, sesquipollicaria. Cyma pani-  
culo axillares folio parum brevioris semel vel bis trichotomi folia duo  
parva subramificata. Flores in capitulo glomerati. Calyx  
hirsutus dentibus quatuor. Corolla infundibuliformis laciniis ovatis  
extus hirsutis filamentis quatuor corolla breviora

Trichotoma <sup>in</sup> herbano

graminifolia H. foliis linearibus caule decumbente panicula racemosa  
secunda Lin. Suppl. pars 114. \* S. V. 147

Alpne spargula foliis; capitulis brevioribus densis Pluk. mant. 9  
t. 332. fig. 2.

Oedenlandia fructa: pedunculis racemosis terminalibus, foliis  
linearibus, caule erecto brachiato Lin. Mant. 200. \* S. V. p. 162

Habitat in India Orientali, et alterni

Caules filiformes, debiles, pedales. Folia remote opposita linearia  
Corolla corulea. limbi lacinae ante meridiem patentibus, postea  
duabus reflexis, duabus erectis. Pedunculi terminales bis divi-  
si, flores breves pedicellati alterni, remoti saepe gemini

quomodo stipulae?

radix fig. 4. Pluk. n. 6. c.

redyoti herbacea. Goult. ad Dugm. t. 60

conolea *H. foliis linearibus subulatis, <sup>pedunculis subdici</sup> floribus racemosis, stipulis setigeris.*

Habitat in India occidentali

Caulis herbaceus filiformis, debilis, inferne ope lentis villosus <sup>simpliciter</sup> pubescentibus  
superne glabris. Folia sessilia pollicum <sup>internodiis breviora</sup> ~~angustissima~~ <sup>angustissima</sup> margine  
revoluta angustissima stipula utraque 4 <sup>stipula</sup> ~~stipula~~. Pedunculi  
in apice caulis gemini, patentes, <sup>pedicelli oppositi solitarii</sup> ~~pedicelli oppositi solitarii~~  
capillares <sup>remota</sup> ~~remota~~ <sup>circiter quini</sup> ~~circiter quini~~ utraque ad basin inferiorum  
foliorum <sup>minutum</sup> ~~minutum~~. calycis lacinae subulatae. Corolla parum  
longior quam in herbacea

herbacea Hedyotis foliis linear lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis  
len. Fl. rey. 65 \* S.V. pag. 147.

Habitat in Zeylona

Caulis semipedalis, patens. Folia opposita, lanceolata, raro repanda, avenia  
vix petiolata. Pedunculi duo uni flori, longitudine fere foliorum, ad sin-  
gulam caulis ramificationem. Corolla infundibuliformis, hinc ab Olden-  
landius diversa hen. Fl. rey. 6. 8.

Lippuda 41

Ritz: obf.

paniculata Hedycotis foliis lanceolatis petiolatis, panicula brachiata, florum  
glomeratis, corollis interne barbatis La Mart. T. Enc. pag. 270  
Habitat in Java  
Corolla profunde quadripartita

michi non nota



Serpylloides Hed folus ovatis, stipulis connatis vaginantibus ciliatis, floribus  
congestis seplibus terminalibus La Mark T. En. p. 271.  
Habitat in Guadeloupe

michi non nota

rupes vni H. foliis quadrifariis subulatis canaliculatis, floribus sessilibus axillaribus, corollis villosi tubo curvo. Sw. prod. p. 99

Thymelaea

Sloar herb. 2. p. 94. t. 202. fig. 1.

Thymelaea americana Jacq. am. p. 20

Habitat in India occidentali

Inter raros tripedalis. Rami diffusi basi saepe procumbentes, caete <sup>o longitudinali</sup>

glabri ramulosi <sup>foliosi</sup> cum erectis. Folia integerrima cariosa, nitida, dorso sulcata, petio-  
ramuli oppositi <sup>ovato</sup> lata quadrilinea nervosa. Petioli membrana uerti <sup>opposita</sup>  
frequentibus infero geminis Jacq.

brevis hinc superior

longior bipollicaris

tomentosi iniani secti

sempulis oppositis hinc

ovatis parum acuminatis

extus glabri ferruginei nitidi intus margineque villosi  
folia glabra sessilia reflexa acuta