

Глосаріум

Racemi

*Polystachyon* Hed foliis ovato-oblongis subtus venoso-reticulatis <sup>Racemi</sup>  
 axillaribus aggregatis folio longioribus  
 Habitat in India orientali Prothler 5  
 Caulis fruticosus teres superne angulatus caicani tomentosis  
 Folia petiolata remota ternata foliola sessilia reticulata  
 ovato-oblonga lateralibus altero margine angustiora subopu-  
 lea-bi-f. 3 pollicaria <sup>atrenuata</sup> ~~glabra~~ <sup>minutissime</sup> nervosa, subtus  
 petiolis venoso-reticulata punctata secundum venas villosi.  
 bypollia stipula decidua. Racemi axillares plures simplices  
 villosi <sup>tom</sup> vel basi subramosi longitudine petiolorum stricti pedunculati  
<sup>folius</sup> e capsula foliorum mucronati bractea ovata <sup>tom</sup> villosa  
 fo tomentosa uti calyces. Calycis profunde fissi lacini  
 lanceolatis subequalibus saepe breviter <sup>tom</sup> ~~saepem~~ breve dispermis  
 ob ovale leviter villosum turgidum  
 an potius glycine propter legumina

Senosum Hedysarum

Habitat in Barbara Desfontaine

Caulis vix ullus. Folia radicalia, 4-6juga: foliola oblonga, subtus, uti  
petioli, pedunculis & pice hispida, incana, supra glabra, venosa, semipol-  
licana. Stipula lanceolata membranacea. Siliqi radicales, folio lon-  
giores. Flores conferti  
Diversa a Tournefortii

phascoloides Hedy sarum foliis ovato cordatis glabris, racemis subquadrifloris  
leguminibus biarticulatis villosis, articulis obovatis.

Habitat in Porto rico herb. Fusf.

Caulis teretes, inferne glabri, superne angulati. <sup>Vernata,</sup> Folia pphascoli, utraque  
glabra, subtus glauca, acuta. Stipulae minutae. Pedunculi axillares et  
terminales, foliis longiores breviores. Legumina villosa, semipollidaria.  
articuli unguicularis

giganteum Hedysarum

Habitat Cayenna herb. Thouini

Caules herbarum, erectus, teres, pubescens, lavis, crassitie pennis cygneis, albis.  
Folia petiolata, ternata intermedium palmare, ovatum, fixenonum, uti latera  
licia oblonga, minor, obtusa: omnia integerrima, supra arena villosa, sub  
tus mollia nervosa, nervi flavescens, tenuiter venosa. Stipula semian  
gulata vides, utrinque in lacinia lanceolato-falcata divisa, acumina  
ta, erectis villosa. Panicula terminalis composita, pedalis et ultra. Bra  
ctea sub ramis primis stipulae similes. Flores parvi, frequentissimi. Legumina  
unquiculana incana, articuli rhombici, totius

*Tetraphyllum Hedyotum*

Habitat in cap. b. spec. herb. Thaurini

Caulis suffruticosus, teretes. Folia petiolata: foliola quaternaria digitata, lanceolata, unguiculata, sessilia, avenia, glabra. Stipula lanceolata. Flores non  
vidi

glomeratum Hedysarum

Habitat in Carolina herb. Rich.

Caulis ramosus.

Varia caule tenuiore, foliis linearibus lanceolatis, supra glabri venis extan-

libris

*Hedyosmum*

<sup>herb</sup>  
Habitat macao Incarnelle herb apud Tushen  
Racis *Hedyosi* cerniti. Caulis superne canescens. Folia pennata, trijuga;  
foliola petiolata, bipollicana, ovato-lanceolata, supra glabra, subtus venoso  
tenuissime reticulato, villosa - Spicae sive pollicaris.  
Similis cernito cui foliola oblonga



*Polystachyon Hedyformis*

Habitat in America septentr. herb. Richardi  
Legumina monosperma, oblonga, longitudine calycis villosa

habes

*nerosum Hedyfarum*

Habitat in Madagascar herb. fruf.

Caulis frutescens, teres, glaber. Folia petiolata, ternata: foliola petiolata lanceolata, pitha mox, attenuata, basi obtusa, supra glabra obscure nervosa, averia, subtus pallidiora, venosa, nervis venisque villosis. Stipula lanceolata, attenuata, semipollicares, glabra, striata. Stipula utriusque ad basin petiolorum parvialum, duo in intermediis. Racemi axillares, terminales, saepe gemini  
B. rachis subulata, semiginis. Pedicelli gemini vel terni. Legumina semipollicaria, teretia, articulata, villosula: articuli oblongi

rotundifolium Hedysarum

Habitat in Carolina herb. Ruch.

Caulis volubilis, herbaceus, pilosus, angulatus. Folia petiolata, ternata: foliola petio-  
lata, pollicaria, subrotunda, supra rarius pilosa, subtus frequentius pallida, subrenosa.  
Stipula ovata, pilosa. Racemi axillares, simplices vel subramosi, folio longiores. Pe-  
dicelli solitarii vel gemini. Bractea ovata, legumina pollicaria, articulata,  
canescentia, utrinque punctata: articulis rhombis subrotundis.

acuminatum Hedysarum

Habitat in Carolina herb. Rich:

Caulis erectus, herbaceus, pedalis, pilosus, uti petioli folia utraque venter et pedunculi. Folia pedicelata, ternata: foliola ovata, acuminata: terminale ovato-suboblongum, lateribus rotundatis, pollicem lateralibus latior et longior, subtus pallida et venosa. Stipulae setosae. Pedunculus terminalis, elongatus, subsessilis. Rami filiformes: pedicelli geminati, remoti. Legumina non vidi, affine nudifloro.

*Galegoides Adyfanum*

Habitat in Carolina herb. Pursh.

Caulis herbaceus, erectus, striatus, glaber. Folia pennata, <sup>vel pinnata</sup> trijuga: foliola alterna, pollicaria,  
lanceolata, remote nervosa-venosa, more fere galega. Stipula ovata, attenuata.  
Racemi axillares et terminales longissime pedunculati, multiflori. Bractea minuta,  
setacea. Ala et vexillum corina parum longiores. Legumen lineare, compressum  
sinuato-articulatum: articuli ovales

*Crotifolium Hedyosanum*

Habitat in Africa? herb. Nutt. 5

Caulis fruticosus, teres, erectus, inferne glaber, superne tomentosus. Folia petiolata, pinnatifida, bi-3 pollicaria, ovata, obtusissima, supra glabra, arena, subtus venosa, tomentosa mollia. Petiolus unguiculatus: seta duo versus apicem. Stipulae laniceolatae. Specio axillares, subsessiles, solitariae, pollicares - 2 ultra. Flores copiosi, conferti, parvi. Bractea subulata, incana - legumina recta, villosa, 5-6 articulatata, altero margine recurva &

*Hedyssarum*

Habitat in Pessia herb. de hesperid

Planta palmari, incana, ramosa: rami compresso teretes, patentes. Folia longe petiolata, 5nato pennata: pinna linearis-lanceolata, semipollicaris, mucronata. Petioli elongati. Stipula ovato, acuta, membranacea. Pedunculi axillares, longitudine foliorum, rigidi, inferam definentes. Flores circiter 5que, diflastes. Calyx quinquefidatus.

nonne jam mihi nota et descripta

Nerrophum Hedysarum.

Habitat herb. Ins. india orientali

Caulis fruticosus, inferne teres, glaber. Rami triquetri, teneri. Folia petiolata: foliola petiolata, ternata, pollicina et ultra, oblonga, acuta, lateralia parva minima, averna, utrinque glabra, juniora tomentosa inia na, subtus nervis obliquis incanis. Stipula lanceolata, incana, uti petioli. Petioli triquetri. Pedunculi axillares, aggregati, biseriati uniflori. Calyx lacina incana, subulata. Legumina vix semipollinaria, triperma, compressa, declinata, villosa, articulata, subrepanda villosa, subincanescens.



viscidum Hedysarum

Habitat herb. la Mart.

Caulis teres, superne villosus. Folia petiolata, ternata: foliola rhombica, interme-  
dio pollicari, lateralibus minoribus, acutis, subrepanda, mucronulata, supra scabra  
pilosiscula, subtus argentea, nervosa, subvenosa. Stipulae petiolae. Pappuli  
axillares simplices, ternales compositi, spatulati et ulmi. Flores geminati;  
distantes: <sup>pauci</sup> pedicelli unguiculati. Legumina lineari-oblonga, unguiculata  
obtusis, absque sinu. Bractea petiolae.

paleae cum Hedysarum foliis Vernati stipulisque ovatis, radicibus hirsutis

Habitat in America boreali? Hort. parisiensis ex herb. La Martini.

Caulis sesqui-pedalis, erectus, angulatus, uti petioli, calycis, bractea et stipula  
extus piloso hirsuti. Folia Vernata: foliola petiolata, vel parum ultra,  
obtusae, venosa, glabra, subtus sic abrupula. Stipula ovata, attenuata, mem-  
branaea, striata, unguiculari. Bractea stipulis similes, arida. Racemi  
terminaliter, erecti, spithamei. Pedicelli patentes sumi, semipollicares.  
Covolla conleca

(Hedys. canescens hort. Parisini)

Hydrangea  
Canada

foliis magnis, bracteis subulatis, cæcis, foliis longioribus.

*Stachys Hedysarum folios Vernati ovalibus sublineatis subtili villosis, saepe spicis  
axillaribus oblongis pedunculatis*

*Melilotus foliis subrotundis, spicis subramosis foliorum albis hirsutis et villosis*  
Raj. hist. plant. 461

Habitat in America boreali. Herb. Vaillant

Caulis erectus, simplex, villosus, striatus. Folia brevissima petiolata,  
terminale vix pollicare, lateralia parva minima, supra arenia,  
oblique lineata, mucronata. Stipula subulata, pedunculi ex omnibus  
axillis, cinerei folio duplo longiores. Flores approximati, frequentes  
in spica oblonga vato-oblonga. Calycis lacini lanceolati, villosi,  
canescentes

saevitates H. hirsut. hirta, hinc tantum villosa.

macrophyllum Hedysarum folioli ovato-cordati acuminati, racemi compositi  
elongati, pedunculi viscosi

Habita herb. Mus.

Solis petiolata, ternata: foliola, <sup>4</sup>tripollisiana, lata tres pollices  
lata, supra glabra subtus villis raris, lateralibus ovata, intermedium  
ovato-cordatum. Petioli tetragonii, supra sulcis & margine elevati,  
spithamei. Pedunculis triquetris: pediculis remotis, tenuibus villosis  
si: pedicellis geminis. Flores parvi. Legumina non vidi.

Hedyssarum

Habitat in Madagascari Commeson herb. mus.

Similis umbellato, ad caulis, foliolo subtis et legumina inia tomentosa. Do-  
licola oblonga, sesqui pollicaria, remote nervosa. Legumina 3-4 articula-  
ta. an modo varietas.

Cublandia

xxx