

Hedy sarum

uncatisque x foliis simplicibus

1. alhagi H. foliis lanceolatis obtusis, caule fruticoso-spinoso
2. nummularia tolium H. foliis perfoliatis, leguminibus uniaarticulatis in curvis caulis spinosis
3. styracifolium H. foliis cordato-obovatis retusis supra glabris, subtus tomentosis
4. moniliferum H. foliis oblongis leguminibus moniliformibus globosis articulatis pubescentibus
5. reniforme H. foliis reniformibus, caule torquato leguminibus compressis glabris <sup>sub</sup> venosis reticulatis articulis oblongis, stipulis subulatis
6. saronium H. foliis reniformibus emarginatis, caule torquato, leguminibus ellipticis, stipulis ovatis acuminatis
7. maculatum H. foliis ovatis obtusis leguminibus <sup>compressis</sup> altero latere repandis, stipulis subulatis
8. gangeticum foliis ovato-oblongis <sup>ovatis</sup>, leguminibus <sup>compressis</sup> altero latere repandis, stipulis <sup>ovatis</sup>
9. recurvum H. foliis oblongis, <sup>setaceo subulatis subtus villosis</sup> racemis terminalibus compactis, leguminibus recurvis hispida teretibus

- 10 republiana *H.* foliis lunatis: lobis retrofaliatis, racemo terminali, Leguminibus retrofractis in calyce inflato inclusis *Stipulis calycibusque serotinis*
11. bupleuroluam *H.* foliis lanceolatis acutis, caule inermi, *Stipulis serotinis* Leguminibus serotinis *Stipulis longissimis, Stipulis serotinis*
12. glumaceum *H.* foliis lanceolatis, stipulis calycibusque serotinis, Leguminibus compositis *Stipulis rugosis*
- 13 attenuatum *H.* foliis ovato lanceolatis, spicis axillaribus compactis, caule calycibusque margine pilosis, articulis Leguminum subtendens transverse rugosis
- 14 vaginale *H.* foliis cordato lanceolatis inferioribus oblongis, superioribus ovato lanceolatis Leguminibus distantibus serotinis rugosis, spicis glabris
- 15 trigetrum *H.* foliis cordato oblong lanceolatis, petiolis alatis, ramis trigetris
- 16 latebrosum *H.* foliis ovatis serrulatis, Leguminibus occultatis, bractea fornicata *Stipulis serotinis* *Stipulis serotinis*
17. imbricatum *H.* foliis cordatis sessilibus stipulatis: superioribus imbricatis floriferis
18. stricte bifidum *H.* foliis ovato oblongis bracteis prothalamum inflatis cordatis obtusis *Stipulis serotinis*
19. diphyllum *H.* foliis binatis petiolatis, bracteis geminis ovatis acutis sessilibus

- 20 junceum *H.* folioli lanceolatis, leguminibus unarticulatis rhombicis, pedunculis subumbellatis lateralibus
21. virgatum *H.* folioli obtusi cum acumine, caule angulato piloso, pedunculis capillariibus trifloris
22. lentiferum *H.* folioli ovales obtusissimi subtus villosi, racemulis axillaribus foliis brevioribus, leguminibus monophasis
23. senecum *H.* folioli cuneatis mucronatis subrotundi subtus villosi, floribus axillaribus sessilibus
24. triflorum *H.* folioli obcordati, caulebus procumbentibus, pedunculis unifloris ternis
25. repens *H.* folioli obcordati, caulebus procumbentibus, racemis lateralibus
26. stratum *H.* folioli oblongi, floribus axillaribus solitariis pedunculatis
27. spartium *H.* folioli ternatis simplicibus quetomentosis, caule dichotomo, floribus geminis, leguminibus articulatis
28. pulchellum *H.* bracteis geminis conjugatis orbiculatis lineatis
29. tomentosum *H.* foliis subtus tomentosis, caule angulato-tomentoso, racemis axillaribus, caule herbaceo
30. ascendens *H.* folioli oblongi subtus villosi, calycibus hirtis, leguminibus reflexis
31. ascendens *H.* folioli subrotundi subtus pubescentibus, caule tereti, ramis declinatis ascendentibus pilosis, racemis simplicibus erectis axillaribus
32. lineatum *H.* folioli oblongi lineati, racemis axillaribus pendulis

33. *Jupinum* H. folioli ovatis obtusifusculis, subtus incanis, caule ramoso procumbente,  
racemis simplicibus erectis terminalibus
34. *retroflexum* H. folioli ovatis subtus fereis, racemis erectis, leguminibus pendulis mul-  
ticapitulatis
35. *umbellatum* H. folioli ovato subrotundis subtus subincanis, ~~racemis~~ <sup>panicula</sup> umbellatis pedun-  
culis umbelliferis, caule fruticoso
36. *bracticulatum* H. folioli oblongis utraque villosis, leguminibus bracticulatis, caule fruticoso
37. *Cappadecum* H. folioli obcordatis, floribus axillaribus subsolitariis, leguminibus brac-  
ticulatis fereis hamosis <sup>teretibus</sup>
38. *capitatum* H. folioli obovatis subtus subpiceis, racemis axillaribus capitatis
39. *heterocarpum* H. folioli ovalibus racemisque terminalibus glabris, leguminibus articu-  
latis inferius submonospermo.
40. *visidum* H. folioli ovalibus, <sup>rhomboidibus</sup> pedunculis hispida, leguminibus membranaceis ovali oblon-  
gis integris corbis
41. *pleurosum* H. folioli ovalibus, pedunculis hispida, leguminibus lineantibus integris corbis
42. *bi-stolonum* H. folioli ovatis acuminatis obscure repandis subtus v. racemis terminali-  
bus
43. *racemosum* H. folioli oblongis glabris, caule frutescente erecto, racemis axillaribus  
erectis longissimis, leguminibus glabris
44. *caudatum* H. folioli oblongis glabris, panicula terminali, leguminibus tomentosi-  
caule herbaceo

buxifolium Hedys. spicis axillaribus imbricatis, bracteis strobiliferis multo subrotundioribus, foliis oblongis nitidis glabris

Habitat in Madagascaria Poivre ex herb. Turc. 5

Rami teretes, glabri, apice angulati. Folia simplicia, oblonga, venosa, glaberrima, pollicaria vel ultra, nitida, inferne versus parum angustiora. Spica foliis brevior. Bractea colorata, glabra. ad basin singuli bractea calycis gemini multo minoris bractea

membranaceum Hedysarum

Hedysarum <sup>hlycus</sup> trifoliatum membranaceum asperis Petrus.  
Caulis teres villosus, subanersens. Folia petiolata, ternata: foliolo oblongo  
ovata vel subhombroideo-ovata, pollicaria, subtus villosa, mucronata,  
venosa, seticulata, mucronata. Stipula subulata. Racemi axillares  
et terminales, sesqui pollicares. Flores parvi, geminati. Legumina pendu-  
la, linearia, latas villosula, unguiculata utrinque repanda, 4-5  
sperma.

Hedysarum

1 alhagi # foliis lanceolatis obtusi, caule fruticoso pinofo L. 1. V

Agul Prax. An. 74. v. 74.

genita graduum pinofo, foliis polygoni Bauhin. pen. 394.

Habitat in Tataria, Persia, Syria, Mesopotamia &

Caulis teres glaber ramifus. Rami alterni patentes. flexuosi.  
Spinis axillaris pollicares vel minoris teretes subulati  
apice ferrugineo floccositate. Solia petiolata cuneata  
crispifida <sup>nili</sup> ~~vel~~ <sup>complicata</sup> ~~et~~ <sup>adpressa</sup> emarginata.  
Flores in spinis 1.2. remoti, pedicellati. Calyx parvus campanula  
tus perichus lacus dentibus ovatis

fruticosa gaudet foliis lanceolatis  
legumina teretia, pollicaria: articuli irregulares, subglobosi. majores  
vel minores 2 articulos magis vel minus contractis herb. Turc.

nummularifolium  
rotundifolium

Hedyssarum

Hedyssarum foliis simplicibus ovalibus, leguminebus unarticulatis  
incurvis extus flexosis Tymb. Bot. 2. p. sub nomine rotundifolius

Habitat in India orientali horig.

Caules herbacei, prostrati, <sup>pedales;</sup> a linea utraque decumate ancapites,  
glabris inferne ramosi, pedales: superne pili raris adpressi.

Folia subpetiolata, ovalia, vel obovata, anguiculana, remota, mu-  
craonata, subtus punctata, utraque pili hirsidis adpressi minutis,  
prostrati subtus versus marginem

Stipulae ~~stae~~ <sup>ae</sup>.

Racemi axillares, pollicares, patentes.

~~Legumina~~ declinata, semicircularata, duplo longiora quam lata,  
intus <sup>interiori</sup> curvata, margine acuto, compressa <sup>superiore</sup> et <sup>inferiore</sup> ~~extus~~ <sup>exteriori</sup> ~~convexa~~ <sup>planata</sup>,  
aculeata stylo rigido terminata apice et latera interiori  
nudi ~~aculei hamosi dorso etiam~~ ~~loves~~ ~~canaliculati~~

Legumina declinata, semicircularata, dimidio longiora quam lata  
<sup>minuta</sup> intus curvata, margine acuto, dorso convexo-plana: aculei hamo-  
si plurimi ad marginem ~~exteriori~~ <sup>interiori</sup>, apice et margine interiori

Hedyssarum nummularifolium foliis simplicibus cursiformibus  
in fl. Tymb. 200. 1. ✓

Pluch. tab  
433. fig. 1.  
herb. mus.



onobrychis maderapatana nummulanofolis, oruthopodifolius

Pet. gar. 41. t. 26. fig. 4.

7

7 *Alysicarpum* *fl.* foliis cordato-obtusatis et basi supra glabris, subtus tomen-  
tosis Lin. Spec. pl. p. 1052.

Habitat in Asia

Caulis frutescens et tota planta villosa. Stipula lanceolata

In mea <sup>annua</sup> ~~caulis~~ caulis plures ascendentes tenues triquetri simplices. Cola-  
lariae *fl.* reniformis et triplo minorae subtus pilosae saepe axillares  
peduncululi pubescentes  
~~mea forte nil nisi varietas minor *fl.* reniformis~~

reniforme *H. foliis reniformibus caule tereti* Lin. Spec. pl. pag. 1051~~x~~

Burm. rad. 7. 52. fig. 1.

Habitat in India

<sup>legum. asan</sup>  
Caulis triquetris, filiformis, uti tota planta, glabra. Folia petiolata  
pollicaria latiora quam longa, parum emarginata venosa. Stipula  
minuta subulata. Petioli teretes filiformes. Racemi axillares et  
terminalis. Legumina pollicaria compressa coria glabra, venis subti-  
lis sine reticulato, mucronata. articulis oblongis.

reniforme *H. foliis reniformibus caule triquetris*

legum. leguminosa

4 moniliferum H. foliis orbiculatis leguminibus moniliformibus globosis-articu-  
latis Lin. Mant. 102. & V. p. 672

Hedyfarum moniliferum caulebus stipularibus, foliis orbiculatis solita-  
ris, leguminibus moniliformibus, articulis globosis Burm. fl. ind.  
pag. 163. Tab. 52. Fig. 3.

Habitat in India &

Caule prostrato, palmato. Stipula lanceolata, frata  
fianosa. folia oblonga vel orbiculata vix angustata.  
pedunculis axillari. Legumina <sup>sub</sup> papiculata, pedunculata vix  
articuli saepe 5 globosi pubescentibus, frabe ore lenti uncinata

herb  
mus  
Hedyfarum idem folis singulari profunde Toumef. t. v. h. 401. 26. 4  
Onobrychis nudiuspota orbiculatis foliis ornithopodii siliquis pit. auct. angl. 26. 4

moniliferum H. foliis oblongis leguminibus moniliformibus globosis-articu-  
latis pubescentibus

Caules prostrati, simplices, pilosi, superne angulati, saepe pedales lani-  
folia orbiculata vel oblonga venosa, supra glabra, subtus in venis majoribus  
pilis albidis minoribus. Legumina interdum 7 articulata, subracemosa 4-5  
herb 7 us

14 vaginale fl. foliis cordato lanceolatis, petiolis simplicibus, stipulis vaginanti  
bas. Lin. fl. reyl. 2874  
Genista articulata repens; foliis crassifolis planis acutis Burm. reyl. 104

749 fig. 1.

Habitat in China India &

Caulis repens monoflorus inferne Vers striatis ramis <sup>paucissimis</sup> <sup>differtibus</sup>  
paleaceis minutis <sup>vel</sup> <sup>hispidis</sup>, <sup>si</sup> <sup>uti</sup> <sup>petioli</sup>, <sup>marginis</sup> <sup>et</sup> <sup>costae</sup> <sup>foliorum</sup>  
inferiorum; superne triquetris glaber. Folia petiolata: inferiora oblonga  
basin versus vix angustata emarginata mucronata una ex ungui-  
culana superiore versus basin majora, subtus setis raris adpres-  
tis ad basin & superiora ovato-lanceolata attenuata polli-  
ciana vel sesquipolliciana. Stipula lanceolata attenuata si-  
scanosa <sup>superioribus</sup> <sup>pollicibus</sup> <sup>basin</sup> <sup>connata</sup> <sup>petiolo</sup> <sup>longiores</sup>. Petioli triquetri supra  
canaliculati. Racemi oppositifolii vel terminalis cum  
ramulo ulterius excrepente bis. Tripollicariis. Flores  
versus apicem gemini <sup>longius</sup> <sup>differtibus</sup>. Calyx ultra duplem folio  
folio 4to subtriplo staminum lateris, folioli subulatis longitudine  
corolla purpureo. Legumen quadrangulata polliciana serbia  
articula interdum parum in una articulo oblongi nigrosi glabris

Pet. garoph.  
Tab. 26. fig. 1.  
Herb. Mus.

vaginale H. foliis inferioribus oblongis superioribus ovato-lanceolatis  
cymis distantibus verticibus rugosi specii glabris  
mea omnino haec est ex fide Herb. Hermannii

procumbens fl. foliis oblongis subtus. caule prostrato & pilosissimo  
leguminibus racemosis geminatis submoniliformibus vellosis.

Habitat in India orientali

Caulis terrensus ramulosus utriusque foliis subtus et pedunculis pilosissimis  
inferne verticillatis. Folia petiolata, vix unguiculata acuta  
nervosa venosa nervis subtus pilosis. Stipulae antherales  
late petiolo longiores. Pedunculi axillares folio longiores  
pedicelli gemini distantes breves. Legumina vix  
vollicana 7-articulata articulis subglobosis apice utraque  
truncatis

71 Bupleurum folium H. folius lanceolatis acutis, caule inermi caule inermi, stipulis  
scariosis Lin. P.V. p. 672\*

Ornithopodium maderense spatani, bupleuri folio Pet. gaz. 10. 7. 11. fig. 12.

Habitat in India <sup>ramosis inferne teres</sup>

Tota glabra caulis superne triquetris. <sup>teretes</sup> Eolia petiolata bipollicaria, venosa  
glabra fere lineari lanceolata (indidem cordato oblonga Lin). Stipulae  
lanceolatae. racemus erectus palmatis. Flores partibus gemini. pedunculi  
brevi. Calyx basi turbatus folioli quatuor lanceolatae equalibus  
scariosi. Legumen ~~est~~ articulatum teretibus stylo terminato, loricis  
firmis. articulis quadratis

H. edysseum gramineum foliis simplicibus lineari lanceolatis, stipulis  
scariosis, racemi nudis, pedicellis bifloris, dentibus calycium barba  
to ~~destr~~ obs. fasc. 5. p. 26. fide leguminis ab ipso missum.

Bupleurifolium foliis lanceolatis acutis, leguminibus teretibus stylo loricis  
radix tuberculis granulosis stipata ex obs. Commes. in Anst. Bot.





(Folia in Hedyfano, byrduon folio, nummulari folio, molinifera et vaginale mure cedunt  
in eadem planta, melius igitur foret characterem legumina vero notas prosta-  
tiores probent, ideoque melius forte foret eas in differentias addere.

*Stenactium*  
*velosum*

17

H. foliis ovato lanceolatis, pinnis axillaribus compactis. caule caly-  
cibusque margine foliorum veloso. articulis fult leguminum pubes-  
centis transverse rugosis.

Habitat in India orientali.

~~manifera~~ vaginali maxime affinis. <sup>differt sed</sup> Caulis uti pedunculi petioli  
bracteis et calycibus marginis velos. Flores conferti in pinnis oblongis  
imbricatis intermixtis bracteis ovatis longitudine calycis. ~~est~~  
legumina non calycibus non longiora trif. quadrangulatis. articuli  
compressi profunde transverse sulcato rugosa ore lenti  
velosa latiora quam longa.

americana P. foliis ternatis: foliolis ovatis dentato-angulatis, fructu latera-  
libus. Lin. Spec. pl. pag. 1075. Corff. in act. Golt. 1789. p. 64  
Trifolium americanum Lobel. i. 2. p. 31. Dod. pempt. 567. Kunth  
num. 327.  
Habitat in America 74

10 Repentilioni. *H. foliis lunatis: lobis retrofoliatis racemo terminali, Legumini-  
bus retrofactis in calyce inflato inclusis her. Suppl. pag. 331. & P. V  
pag. 672*

Habitat in Cochinchina O

Caulis simplex filiformis, teris, pilis minutissimis raris adpressis  
racemo prodeunte exsertit ex aliis superioribus ramuli brevissimi  
folia petiolata, horizontalia, facie passiflorae mucronata  
byolles <sup>at</sup> angustiora biloba: lobis lanceolatis versus apicem retrofolia-  
tis obtusi, mucronatis, glabris, tri vel binerviis, mucro in medio  
inter lobos. interdum folia ternata, lateralia parva oblique  
cuneiformia. petiolus filiformis apice versus inflexionem  
fatis geminis. Nipula nulla vidi. Racemus terminalis. Flores  
geminis. Bractea communis lanceolata attenuata striata  
decidua. Florae perianthium calyx campanulatus villosus. lobi  
nunc lanceolatis in stam. acuminatis. fructiferis membrana  
eius venoso-reticulata: alba et carina refracta. Stamina  
coacta.

hesperium *H. folium canaliculati nervosi hesperis subter inanis ner*  
*ro ferrugineis Hed. canescens Aubl. fl. gu. pag 774.*  
*Habitat in Guana*

non vidi

16 <sup>606</sup> ~~Cabera~~ <sup>sum</sup> 4. foliis ovatis serrulatis, leguminibus occultatis bractea fornicata  
superna scanosa Lin. Mant 270. v. s. v.

Lens maderaspatana elatius folio Pet. gar. t. 30. fig. 11.

Habitat in India

Caulis suffruticosus nudus: ramis raris virgatis divaricatis teretibus.  
Folia petiolata, remota, vix manifeste serrulata, serraturis spinosis gla-  
brosa, magnitudine Vaccinii myrtilli. Flores axillares. Pedunculus  
lus brevissimus biflorus bractea foliacea supernata fornicata, cym-  
biformis, occultans fructificationem, ferruginea folioli castor-  
pili conigati. Legumen monospermum, subrotundum mucosum  
Lin. l.

recurvus  
9 <sup>var.</sup> ricinus aff.

foliis oblongo subtus villosi racemis terminalibus compactis  
leguminibus recurvis hispida.

Habitat in India orientali 5

Caulis ramosus glaber purpurascens teris. Rami villosi pilis  
adpressis proserptim superne. Folia simplicis pinnae brevis  
pinnae pinnolata lanceolato-oblonga vel ovata oblonga  
subtus pilis copiosis adpressis proserptim in nervis et costis  
uti et in petiolo et bipollicari obtusiuscula  
seta mucronata. Stipulae longae lato pinnatae. Racemi ex  
aquie ramulorum bipollicari brevis pedunculata. Flores  
copiosi parvi bracteis pinnatis longitudine florum calycis  
legumina unguiculata tercia, subarticulata pilis copiosis  
adpressis tercia



7 maculatum H. foliis ovatis obtusis Linn. l. V.

Hedysanum humile cappandis folio maculato Dill. Elth. 170. t. 141.

fig. 161.

Habitat in India Lynopes

Caulis teres tenuis pedalis superne angulatus pubescens  
folia petiolata ovata vel oblonga polliciana supra  
glabra ~~vel~~ <sup>ultra</sup> ~~maculata~~ <sup>polluciana</sup> pubescente pilosa pallidiora.

Stipula pubulata in petam attenuata. Setae duae sub  
versus insertionem petioli superne. Racemi terminales  
semipedales. Peduncululus filiformis. Pedicelli gemi  
ni vel tres tetragyni polliciana vel ultra. 5' ar  
triulata, altero latere repanda, pili minuti approp  
articuli oblongis

herb  
mus.

(Omobychia indica orientalis fagi folio alternis, filiculis specu  
longe dispositis Patav.  
Hedysanum indicum folio singulori acuminato Tournefort  
v. h. 401

quomodo tractes?

ganzgheum # foliis ovatis acutis serrulatis

L. V. p. 6727

Onobrychis ganzgheica monophylla, pliculis singularibus lobatis: folium  
per nodum internodia diffrimatis Planch. alm. 270. t. 50. fig. 3.

Hedyrum monophyllum latifolium. pliculis plurimis spica longa  
Sedgwicki Burm. zeyl. 113. t. 49. fig. 2.

Phaeolus montanus Bumph. amb. 6. p. 146. Tab. 66.

Habitat in India <sup>5</sup>  
~~in~~ <sup>non</sup> ~~superne~~ <sup>superne</sup> angulatis, pliculis nonnullis secundum

caulis ~~teretibus~~ <sup>angulatis</sup> adpressis: folia petiolata ovato oblonga subtri-  
angulosa pubescentia, supra glabra, in culta utraque.

Stipula subulata. Racemus terminalis semipedalis. pedicel-  
li gemini capillari. Bractea petiolaria. Legumina pollicia  
na glabra. 7 articolata <sup>articulata</sup> oblongo rotundata glabri. albero  
laxiore repanda florei minuti

an Forst. Hed. immaculatum p. 214 huius pertinet

differt ab H. aspero. stipulis subulatis, leguminibus compressis  
yang. foliis ovato oblongis

β ab huius vel maculati varietate herb. huius protus maculati cum folia  
subtus glabra, oculo armato tantum villosa paucis, stipulis lanceolatis-subulatis  
legumina racemosa paniculata

unicatus A acutis est capus, Leguminibus siliulatis hamatis folio longioribus, foliolis ob  
cordatis

17 *Trigonotrum* <sup>cordato ovato lanceolatis</sup>  
foliis oblongis, petiolis alatis, ramis trigonotis Lin fl. Zeyl. p. 286 x  
Burm. ind. t. 49. fig. 2. l. V.

*Onobrychis zeylanica*, auranti folio Pet. sic. 247.

*Onobrychis zeylanica* a monophyllos, caule triangulo, petiolis foliorum  
alatis Burm. Zeyl. 176. t. II.

*Phaseolus montanus* T. Rumph. amb. 6. p. 146

Habitat in India

Caulis triangulans, ramis glaber. Folia petiolata <sup>cordato</sup>  
lanceolata glabra, infera palmata superiora minus  
et parum attenuata. Petioli obovati. Stipula ovato  
lanceolata attenuata, frata unguiculari. Racemi  
ex axillis superioribus et terminales flores gemini  
bractea foliacea solitaria ad basin pedicellorum. Legumi  
na linearia vix polliciana <sup>recta</sup> vix pilosa compressa utra  
que obtusa articulis 8 oblongis altero margine repanda, stylo  
<sup>longo terminato</sup>  
Racemi elongati: pedicelli sparsi

17  
umbriatam 4 folus cordatis p. plebus stipulatis: superioribus umbriatis flori  
feris An. Suppl. p. 331 l. v

Caules herbes Habitat in Cap. b. p. ei

Caules herbacei, liliiformes, diffusi, ramosi. Folia acuta levia  
superiora majora, simillima, stipulata, subumbriata. Stigma  
lo femicordata, canosa patula. Flores inter folia supe  
riora, solitarii, sessiles, breviores, a foliis occultati.

differt a probrifero. Probilis: squamis di versa a foliis figura:  
cotenem convenit.

10) *Strobiliferum* H. bracteis strobilorum inflatis cordatis obtusis Lin. fl. reyl. tab  
209. tab. 34

*Onobrychis* India orientalis, fazi foliis alternis, filiculis pinnatis  
longa dispositis Raj. suppl. 234.

Habitat in India

Rami et ramuli tomento tenuissimo vestiti <sup>propter</sup> inferne verticilli  
superne <sup>propter</sup> compressi. folia ovato-oblonga parum acu-  
minata 3-5 pollicaria supra glabra subtus center pilosa  
stipula subulata, decidua. Racemi axillares folio  
longiores flexuosi, facie carpini. Bracteis alterna  
sibus veniformiter conduplicato imbricatis, pollicaribus  
membranaceo venoso reticulatis, pubescenter inter quos  
pedunculis trifloris

Cosonium H foliis reniformibus emarginatis caule triquetro her. Mart. 270  
L.V. p. 679

Lens maderapetana nummulanifolia Pet. gar. t. 32. fig. 1.

Glycine monophylla caule volubili, floribus paniculatis lineantibus  
Burm ind. 161. t. 80. fig. 2. pedalis

Caulis debilis glaber striatus. Folia petiolata feminequecula  
na latiora quam longa utrinque emarginata, glabra, maius  
later. Petiolus longitudine foliorum. Stipulae parvae ovatae  
striatae in partem attenuatae. Racemi axillares et termi-  
nales capillares, foliis multoties longiores, pedicellis geminis  
pediculis fere pedunculis pubescentibus. Bractea ovata stri-  
ata ciliata. Legumina parva ut feminequeculana sili-  
elliptica acuta.

Protalaria indica orientalis nummulanifolia floribus et plegis  
minimis Tournef. 4. v. h. secund herb. F. Saund. et Mus.

Plut. 105 fig. 2

19 *Diphyllum*  $\frac{1}{2}$  foliis peratis petiolatis, bracteis geminis ovatis acutis sessilibus  
Len. fl. reyl. 2917 L. V. Sw. obs. pag. 285

velam man. Rheid. mat. g. p. 161. t. 22.

*Onobrychis* di *Onobrychis maderaspatana* *diphyllus*, filiculis clypeatis hispatis, mi  
phyllon indico nor Pluken. alm. 270. t. 246. fig. 2. et tab. 107. fig. 1.

ut nunc que et qui  
reensis Petrus  
act. ant. p. 5.  
no 271. pag. 856  
pl. 129

$\frac{1}{2}$  *Hedyfarum* minus *diphyllum* Sloan. her. t. p. 105.  
 $\frac{1}{2}$  *Hedyfarum bifolium*. foliolis ovatis, filiculis apertis geminis inar  
ticolatis Burm. reyl. 114. t. 50. fig. 1.

Habitat in Indiis  $\text{\textcircled{O}}$

in India. In qua glabra in americana subtus pubescentia vel glabra  
Caulis teres procumbens basi ramosus, glaber. Folia petiolata  
duo in apice petioli, ovata foliola ovata cum  
glabra breviter petiolata altero latere angustiora  
resque ulata. Petioli foliis parum longiores. Squela  
lanicolata adnata infra basin libera, acuminata striata

racemes e Penn. herb. Spica axillares foliis longiores. 4-6 flori, fungula  
fusi differunt modo inter bracteis duas ellipticis adnata eodem modo ac  
foliolis bracteisque squela acuminata 3-5 nervis. Legumina compressa  
4-5 articulata: articulis subrotundis setis hispida.

mayombus



25 ~~et~~ ~~pastuum~~ ~~H.~~ foliis ternatis simplicibusque <sup>tubtus</sup> ~~sub~~ ~~velloso~~ ~~uncatis~~  
bas geminis, leg umenibus articulatis ~~R. Dainton~~, caule ~~distichis~~, flori  
Burm ind. 1667. 51. fig. 3.

Habitat in India 7

Rami filiformes superne vellosuli angulati folia unciniformia  
microchato ~~subtus~~ ~~velloso~~