

Heliconia

1. bicolor fl. foliis nervosis reticulatis basi attenuatis, nectario lappato libero
2. aurantiaca fl.
3. psittacorum fl. foliis glaberrimis nervosis basi rotundatis, inflorescentia glaberrima, spadice erecto abbreviato, nectario lanceolato adnato
4. hirsuta fl. foliis basi rotundatis simplicissime nervosis glaberrimis, inflorescentia hirsuta, spadice flexuoso, nectario lanceolato adnato

Ballia Heliconia radice tuberosa, foliis lanceolatis, sicapo foliis longioribus
spathiis remotiuscule alternis Act. Soc. h. n. Par. 1. pag. 107.
Habitat in America merid.

non vid.

Caribba Heliconia, foliis basi apiceque rotundatis, spadice erecto roseo albis.
Spathis distinctis multifloris, nectariis folio superiore indiviso Willden
Spec. plant. pag. 1007.

Bikai foliis amplifimis, florum spatulis concavis Plum gen. 50.
4c. tab. 59.

Heliconia Caribba ha Mart. Encycl. t. p. 421.

Habitat in Insulis Caribbae ?

humilis Heliconia. foliis basi angustatis apice, acuminatis, spadice erecto flexuo-
so radicalibus: spatheis distichis multifloris nectariis foliis superioribus
indentatis Willden. spec. pl. pag 1107

Musa humilis

Aubl. fl. guian. 2. p. 93.

Heliconia humilis foliis basi angustatis, nervis simplicissimis nectariis
adnatis Jacq. hort. Schomb. 1. p. 23. tab. 40-49

Habitata Guianae et Guayanae 4

non vidi

hirsuta #. foliis basi rotundatis simplicibusque nervosis glaberrimis,
inflorescentia hirsuta, spadice flexuoso, neitanio canaliculato adna-
to her. Suppl. p. 150. t. 1. v.

Habitat in America meridionali. Spadix
caulis et folia glaberrima. Spadix flexuosus. Spithamorum hirsutus
articulis versus proximam spatham incurvatus. Spatha alter-
na bifaria, canaliculata subulata canaliculata adscendens
inferiori major, canna hispida. Pedunculi 9-12. in alis spatha
nem, erecti, teretes, hirsutissimi, breves, aphylli uniflori,
utroque ad latera uncti praeteris subulati plani flore
brevioribus, sibi invicem serie unice incumbentes, intra
cavitatem spathae majori. Germen hispidum obtuse triquetrum
Corolla 2 petala. Neitanum canaliculatum complicatum
hispidum uti peniarisum her

onchi cynta

Bikai 4. foliis nervosis reticulatis basi attenuatis, nectario hastato libero
Linn. Suppl. p. 157. * S. V. p. 245

Musa Bikai Spreng.

- Bikai amplissimis foliis, florum sapulis variegatis Plum. gen. 50
B. Bikai amplissimis foliis, florum sapulis coecineis Plum. ik. 59.
V. Bikai amplissimis foliis, florum sapulis subnigris Plum. gen. 50

~~Habitat~~

Musa Bikai radice exita, spathis persistentibus Linn. Spreng.
p. 1477.

Habitat in Sumatra

Planta octo pedalis. Spadix flexuosus Spatha diffusiva
biparcia lanceolata attenuata quadr. s. pollinario glabro
nectarium conleum flor. novem.

Psittacorum H. foliis glaberrimis nervosis basi rotundatis, inflorescentia
glaberrima, pedicellis erecto abbreviatis, nectario lanceolato adnato
Linn. Suppl. p. 150 * L.V. p. 245

Habitat in Surinamo & flique obsiure nervosa
Caulis teris lani simplex. folia radicalia lanceolata, pedicelli
petiolata, statura Cannæ. Caulis alterna parva remota
fascia concuplata, Indefiantia, tria. quatuor lanceolata.
Pedunculi 4. f. 5. axillares breves uniflori. floes luteo et rubro
variegati. Nectarium ovato-lanceolatum, longitudine, dorso
ferè ad apicem petalo adnatum. Linn.

lanceolato-elliptica

aurantiaca H.

Habitat in C. b. p. p. c.

Spadix perispermatus: spathe alterno (non bifido) creta
lanceolata attenuata glabra quadr. pollicares. Flores sepales
Capsula pollicaris glabra oblonga

cum folia in specimine desunt nec necitum in planta p. c.
Determinare valeo, differentiam excludo

Benghalense f. caule erecto herbaceo, foliis alternis oppositisque canaliculatis
pubescentibus Lin. Mant. 217. ~~4th~~

Amaranthus India orientalis blabi folio transparente, paniculis inter
folia sparsi Pluker. alm. 11. t. 3. 34. fig. 5

Achyranthes brachiata caule herbaceo erecto brachiato foliis opposi-
tis glabris canaliculatis ovatis, spicis terminalibus lateralibus Lin. Mant
p. 504

Habitat in India orientali 5