

Helictes

baruenfis Helicteres foliis ^{obtus} subcordatis ^{biseriatis} subtus villosis, ramis pilosis.

Helicteres baruenfis: Decandrus, foliis cordatis serratis, fructu contorto papiribus
rectis Lin. L. V. pag. 325.

Habitat in India occidentali Dr. v. Bohr

Rami teretes, fusca griseo-fusci, inferne glabri, superne, ubi ramuli, adpressi
pili stellati

Folia petiolata, alterna, subcordata, ovata, b. s. tri-polliculari, nervis alte
nervata, obtuse serrata, acuta, tri-nerviis, supra avenia, pili ramibus
obsoletis stellatis adpressis, subtus pilosior, propositim in costa et venis
maiores.

Petioles unguiculares, pilosi. Stipula subulata, petiolo parum brevior.
Stipulae ~~obtusae~~ ^{multae} obtusae.

Redunculi terminalis, solitarii, unis flori et ceteri.

Fl. fova diffid. foliis ^{marginibus} utraque molliter villosis subtus tomentosissimis

angulata Helicteres

Habitat in antillis Herb. G. w. f. 7

Rami teretes, glabri, cortice cinereo: juniores incano-tomentosi. Folia petiolata, alterna, pollicaria, subnitida, venosa, quinque nervia, supra albedo-punctata, & nuda stellata, subtus mollissima, obtusa, inaequaliter remote dentata. Cymbi terminales: compositi. Pedunculi angulati, uti calycis pubescento-canescen-tes; glandula fusca ad basin proculi pedicelli. Calyx semi unguiculans. Petalorum unguis calyce longior: lamina linearis. Pedicellus germinis sesqui polli- cary. Capsula recta, glabra, semi pollicaris, non contorta, acuminata.

hispidus Helictes

Helictes spora β Aubl.

Habitat Capenne herb Desfont.

Rami teretes, et pilis stellatis hispidi, sordide cinerei. Folia breviter petiolata
4-5 pollicaria, cordato-oblonga, attenuata, supra adpressa pilis brevibus raris, sub
tus hispida, sordide cinerea, inaequaliter serrata, acuta, venosa. Squula subulata
unguiculata. Pediculi axillares, solitarii, folium ovatum pollicaria breve
petiolatum prope flores. Pedicelli 6, alterni, uniflori. Bracteae lineares, in
trinque ad basin pedicellorum, pilosae, purpurascens et duo albae sub flore
ovata attenuata simulata ciliata. Calyx hirtus, semipollicaris. Pedicellus
germinis glaber, angulatus. Germen hirtum globosum, cinereum. Styli 5que

Helictes folio pinnatis oblongis inaequaliter serratis subtus tomentoso
fi.

Habitat in Tara herb. Aust.

Rami teretes, superne villosi & tomentosi. Folia petiolata, subsessile, acuminata, venosa, supra stellato-villosa punctata, subtus mollisima. Hipula pubulata. Petioli subtomentosi, unguiculares. Pedunculi breves, uncinati. Anthera 10

Theobroma folia Helicteris

Habitat in Java herb Quis. 5

Rami villosi, canini, uti petioli, folia juniora et calycis. Folia pitha
mora, ovata vel subcordato-oblonga, attenuata, inaequaliter serrata, acuta,
venosa, supra oculo armata pilis raris stellatis, subtus villosa, tenera.
Stipula setacea. Spica axillari, pedunculata, solitaria, bipollicares.

confer. cum alia descripta

fructu Halimolobos

Habitat Capeno herb. La Martini

Rami, folia pubes, pedunculi et calycis villosi. Tota subsessilis, stipulicaria, cordato-oblonga, attenuata, subequaliter serrata, supra pubes, stellata punctata. Stipula lanceolata foliata. Spica axillares, bracteis lanceolatis umbriatis. Calyx tubulosus, semi pollicaris, hirsutus, setis perioribus longioribus. Petala linearia. Stamina 6. Agli 4

Colubia Helicteris

Habitat in Domingo Herb. La Martini

Rami teretes, apice tomentosi. Solca petiolata, alterna, pollicaria, subrotunda, angulato lobata subdentata, quinque nervia, subtus incana venis reticulata, facie fere luteo lobata. Corymbus terminalis incanus. Flores 5 petaloideos, parvos.

Caruensis Helictes foliis cordatis serratis, ^{subtus allopaliis pubescentibus} fructu contorto apicebus rectis her Mart.
122. N. pag 225. Jacqu. Amer. 236. Tab. 1494

Helictes arbor India ~~occidentali~~ ^{orientali}, siliqua varicosa et funiculi in
medium contortuplicata Pluk. alm. 181. t. 249. fig. 2. ~~foliis adpressis~~

~~Helictes~~ ^{propriis} India 5

Rami junioribus, pedunculi et Petoli tomentosi folia acuta serrata
subtus tomentosa albicantia, supra subpubulosa, petiolata. Stipulae pubu-
latae. Pedunculi multiflori terminales, propriis basi glandulosis
Rami veteres, purpurascens superne tomentosi. Folia petiolata
aeterna, subcordata, ovata, attenuata nervosa, subserena, mollia
e pilis stellatis, Ramen non incana ^{hisi} pubtus, uti petoli et fructus
iniquoliter serrata, tripolliciana. Pedunculi axillares, rari mon-
5. 6 flori. Fructus 5que pollicares, glabris apice subulato
Stipulae pubulatae. Pedunculi fructiferi 5que pollicares,
glabri, angulati her 4.

Helict. ovata La Martini resbus

~~quoad a Jamaicae ulterius differat~~

10. maiensis

subtus tomentosi acuto

Isora Helict foliis cordatis acutis serratis, fructu ovato contorto Lhv. prod. p. 90.

Helict. jamaicensis Jacq. Am. 235. T. 179. fig. 99. hort. v. pag. 67. T. 143

Helictes Isora deCandora, foliis cordatis serratis, fructu ^{Compos. to} toto contorto
Linn. L. V. p. 226. Linn. Spec. pl. pag. 1366. B.

Helictes arbor India occidentalis, fructu majore Pluk. alm.
102. t. 245 fig. 3.

Habitat in Jamaica ^{petiolo}

Rami tomentosi. Folia magna ^{venosa} in dorsum talia inaequaliter
obtusè serrata, utrinque mollia ^{et supra stellata} subtus magis tomentosa supra
viridia juniora incana. Stipula gemina petalis. Pedunculi
terminalis multiflori. bractea bina filiformes ad basin
petioli. Calyx subcampanulatus inaequalis quinque dentatus
dense tomentosus uti pedunculi et bractea. Petala albida
oblonga reflexa. Capsula quinque ovato spiritaliter ⁱⁿ toto tomen-
tosa

Herb
Gu

(*Helict. althaeifolia* La Martk
Isora althaeifolia, fructu bino et crassiore

althoifolia. F. foliis cordatis subangulatis serratis tomentosis floribus
axillaribus, fructu contorto La Mart

Habitat in Insula St Crucis

Flores plerumque gemini pedunculati. Folia 5-6 pollicaria alba
vel albida

eadem forte ac jamaicensis Sw

4 fora H. ^{atenuatis subtus tomentosis} foliis ovato-oblongis acuminatis serratis ped. racemulis axillaribus

4 fora muni Rheed. Malab.

Helicteres arbor Andra orientalis, plicata varicosa et funiculi
in modum contortuplicata Pluch alm. p. 181. t. 245. fig. 2.

Indica Indicus, fructu styli apice egresso sextupli, funiculo in
spiram convoluti constante Ray. hist. 1765.

Habitat in Andia Orientali,

Rami petioli pedunculi folia subtus et calycis albo tomentosi
folia acute inaequaliter serrata, basi latera altero angustiora
supra glabra et glaucos. petioli unguiculati peduncu-
lus longitudine petioli Flores alterni septes corat eo subulata
supra

angustifolia Hel. decandra foliis lanceolatis integerrimis, ^{publescentibus} fructu ovato recto
Obsech. Gt. 232. tab. 3. Lin. Spec. pag. 1366*. L. V. p. 226.

Habitat in China, t.

^{sequi pollicem}
Folia ^{supra} ~~supra~~ ^{nuda} pubes tomentosa venosa rugosa obtusiuscula
Stem breve petiolato. Flores ^{utrinque} ~~pedunculati~~ pedunculati calyx tomentosus
Petalas 5. Camena ^{utrinque} ~~bifida~~ ^{dentata} dente acuta. Stylus 1. Capsula
ovata tomentosa, minime contorta, Capsula 5 parallela
recte approximata

apetala Hel. Dodecandra Apetala, foliis quinquelobis, filiquis divaricatis

Gay. Amer. p. 116. t. 263. f. 74. Lin. S. V. pag. 826. Pl. Am. 307 +
Mey. & Willd. Herbar. Mex. 303. 454.

Habitat in Carthageno sylvis

Folia plicata semiquinqueloba, supra glabra subtus ^{sub} villosa, pedalis
Lobi ovato-subrotundi, acuti integerrimi. Petioli novem pollicares
Panicula caesa magno ad extremitatem ramorum. Flores foetidis
numerosi prode flavescenti purpureo maculati. Corolla et
Nectarum nullum ^{gymnosia} _{ta-ya}

non vidi

Carthaginensis Hel. polyandra foliis cordatis serratis fructu oblongo recto
non. l. v. p. 226. Faëgu. amer. tab. 150 Plant Amer. pag. 306

Habitat in sylvis Carthagensibus

Folia utraque comestibilia. Flores foetidissimi. Calyx a fusco luteo
petala purpurea. Flore et fructu tantum a Limbariensibus
differens. Faëgu

non vid.

undulata Helict. Deicandru foliis lanceolatis undulatis, flombus congestis
filiquis sive pallatis Lour. fl. cochinch. pag. 531.

Habitat in Sylvis Cochinchinae.

Arbor medicaria. Folia alterna, integerrima glabra, petiolata,
floris congest. subt. axillares. Cal. 0. petala 5. Antherae ad basin
germinis. Germen pentagonum, pedunculatum superum. Stylus
fileiformis. Hyma orbiculatum sive paritum. Pericarpium ple
que sive oblonga, crasso coriacea in formam pello expansa

hepeta Heliberti Decandra folis cordatis serratis, fructu strobilari
recto, hepaticisimo haur. fl. Corten. pag. 530
Habitat in Cortinethera.

Caudis fruticosis 6 pedalis, erectis, pilosis. Folis alternis
acuta tomentosa, petiolata, magna Pedunculis multifloris
axillares. floris obscure purpurei. Calyx tubo curvo piloso
Petala rotundata, parva basi denticulo acuta,

paniculata Heleuteris polyandra foliis ovatis acutis floribus panicula-
tis filiquis 5 f. cellatis lous - fl. Cort. pag 531.

Habitat in Cochinchina

arbor magna. Folii integerrima plana glabra alterna
petiolata. Flores rubescentes. panicula subterminalis. Calyx
nullus Cor. 5 petala. Anthera 20 gemini catenuliter
adherentes. Stylus filiformis curvatus. Stigmate convexo emar-
gnato. Siliqua bivalvis in orbem indurata

pentandra Helict. pentandra foliis ovatis, floralibus coloratis Hen Mand
294. S.V. pag. 226.

Habitat Sannami &

Folia alterna, acuminata, serrata. Floralia obscure purpurea
calycis bifidi setis ramosi. Petala longitudine calycis
Len.

non vidi