

# Heracleum

1. sphondylium *H.* folioli <sup>cordato obtusis</sup> pennatis ~~fr~~ lobatis, floribus unisformibus.
2. angustifolium *H.* foliis cruciatis pennatis: folioli linearibus, corollulis <sup>flexuolosis</sup>
3. longifolium *H.* foliis lanceolatis oblongis longispermis
4. glabratum *H.* foliis quinatis - pennatis glabris, folioli bis. trifidis:  
laciniis lanceolatis elongatis
5. elegans *H.* foliis quinatis - pennatis ternatisque, in senibus <sup>subtus</sup> <sup>scabri</sup> <sup>sillulatis</sup> <sup>vellosi</sup>
6. fibrinum *H.* foliis pennatis: folioli quinis: intermediis <sup>subtus</sup> <sup>scabri</sup> <sup>sillulatis</sup> <sup>vellosis</sup>, corollulis unisformibus
7. crenatum *H.* folioli octonis, ~~hinc ultimis subsplibus~~ <sup>intermediis subsplibus</sup> oblongis basi lobatis, <sup>inferius petiolatis</sup>
8. pubescens *H.* folioli 7nis lanceolatis obtusis serratis - incisi <sup>inferius</sup> <sup>pubescentibus</sup>
9. panace *H.* foliis pennatis folioli quinis <sup>intermediis petiolatis</sup> <sup>subtus</sup> <sup>pubescentibus</sup> <sup>intermediis</sup> <sup>vellosis</sup>, floribus radiatis

10. austriacum H. foliis pennatis utrinque rugosis scabris; floribus subradiatis  
11. alpinum H. foliis simplicibus; floribus radiatis



Tauricum Heracleum

Habitat in Tauria Meyer

8 stadia a basi inferae

Habitat in Duceo Caulis tripedalis, crassitie pollicis, erectus, ramosus, basi perennans  
bas a reliquis ~~superioribus~~ striatus Superne pubescenti: Rami infima inter

dum parum compressi. Folia subtripuna foliola bijuga  
infima quinato pennata, reliqua ternata, <sup>glabra</sup> pinnas pubescenti  
semi pollicares, glabra supra <sup>glabra</sup> obsolete verso 40 laterales 30ae  
bas a reliquis ~~superioribus~~ striatus Superne pubescenti: Rami infima inter

# basiaoli bifido, terminales trifido <sup>bas a reliquis ~~superioribus~~ striatus Superne pubescenti: Rami infima inter</sup> laciniis obtusa <sup>bas a reliquis ~~superioribus~~ striatus Superne pubescenti: Rami infima inter</sup> dentatis <sup>bas a reliquis ~~superioribus~~ striatus Superne pubescenti: Rami infima inter</sup> dentatis  
quo dentibus obtusis mucrone breviter mucrone involucrium

universale nullum parviale polyphyllum longitudine

laciniis calycis

unicis reliquis

longioribus casum

metallum persisteri

radicem uti dei villosi pubescentes. Calyx flores disci  
abortientes. Petala obcordata. Germina villosa stylis

longi

Dryas integrifolia Egeder

est & capus

*Gladiolus*

*Gladiolus* ex capus; foliis ensiformibus trinerviis, tubo corollae filiformi & spathis longiora Schreb. prodr. 104. Act. bot. h. n. Hoffm.

t.

Habitat in Cap. b. & p. 2

Totus glab. Folia duo radicalia, & capis breviora, margine & medio costa flavescenti-  
gata; caulina duo similia. Scapus palmatis vel spithameus; sin-  
plex erectus, flexuosus. Flores eiu'dem sex, albi. Spathae lanceola-  
tae bipollinares, lanceolatae, convolutae, panem acutae. Corollae tubi-  
tripollinares filiformis erectae, apice ampliatas & cernuus; limbi lacinae  
lanceolatae, obtusae. Schreb. l.c.



*Heracleum*

Habitat

h. Pant.

Caulis striatus, pilosus. Folio subbipinnata: foliola Injuga, petiolata  
par extremum sesile: pinna sesile, confluentes, infima excepta, lanice  
lata, acuta, remote serrata, subtus villosa, canescentes. Umbella  
multiradiata

*Humulium*

*Symphondyleum orientale humulus abrotanii folio* Tournef. Cor.  
Habitata in oriente herb. Fusj.

Villosum, inaequanum. Caulis sulcatus, angulatus. Stipulae subpeltatae, tripennatae.  
pennis multifidis, linearibus. Involucrum et involuella polyphylla, lanicolata  
marginibus membranacea, attenuata, villosa. Strobili abortivae. Semina hirsuta  
Fusjima  
an hujus generis



*Sphondylium* 4 folioli pennatifidis lobatis, floribus uniformibus Lin. S. V.

*Sphondylium vulgare hirsutum* Bauh. pin. 157.

Habitat in Europa memorosi 3

Caulis pubescens & spediatis herbis uti uti petioli  
folia tripega duo extrema p. spolia cordato oblonga  
laciniata serrata serrata uni frequentibus umbella  
non radicata

8 lobis plenis in herbis. vidi

angustifolium H. foliis <sup>11</sup>enuciato-pinnatis: foliolis linearibus, corollulis flosculo  
fis Lin. Mant. 57. P. V. pag. 202.

Sphondylium hirsutum minus, foliis veniiter laciniatis Plukn. phyt. 634.3

Sphondylium hirsutum, foliis angustioribus Bauh. prodr. 83. pin. 157.

Habitat in Europa boreali.

Salies Her. sphondylii Petioli <sup>valde</sup> strigosi propositi ad petio-

los partiales folia 3 juga par ultimis sespile.

pinnato laciniato laciniis lancea lanceolatis bi  
pollicaribus ~~remota~~ serratura una vel altera magna  
remota vel integerrimis infimis laciniis femeli ad  
basin extus ~~in~~ subtus venis pelosi. umbella non  
radiata involuero nullo.

Jaegu angust. duesa planta



*Longifolium* *H. foliorum pennis longis* f. n. l. n. pag. 282. *Facque fl. austr.*  
2. Tab. 1174.

Habitat in alpebus, ac stratis ?

Caulis 2-4 pedalis, pilis albidis aspersus, striato sulcatus. Foliorum  
nono semipedalis lanceolata oblonga, acuta glabra  
subtus opaca. in tenella planta folia palmata in longas  
lacinas. In *Solium* interdum nullum. umbella  
radiata *Wittm. sum. pl. p. 1524*

michi ignota

glabratum H. folus quinque pennatis utrinque glabris, foliolis bi  
s. trifidis laciniis lanceolatis elongatis

Habitat. ~~in~~

Saxino ampla et villosa. vena subtus in costa pelis minutis  
peraduro laciniam extorsum delescenti obbeso non  
cinnata

<sup>H</sup>  
sub nomine elegans dedit Dr. Seidelin



Elegans H. foliis quinato pennatis ternatisque sub inferioribus  
subtus molliter villosis

*Heraclium Elegans* Crantz Austr. tab. 2. fig. 1.

*Heraclium angustifolium* All. f. Jacq. fl. Austr.  
2. tab. 175.

Habitata in Austria 2

foliis 3. 5. laciniato serratis laciniis subovatis  
serratis serratis acuminatis

planta alia sub hoc nomine ex herb. Hafn.  
foliis ~~utroque~~ <sup>longis</sup> glabris laciniis lanceolatis ~~et~~  
~~que attenuatis~~ serratis non acuminatis

Crantzii figura satis ad H. panicis accedit sed lacini  
non minus attenuato an varietas Europ. H. panicis

an mea Jacq. convenit satis cum figura Crantz.  
sed confer. flor Austr

~~Das~~  
~~caudum~~ *L. caudis maculato, folioli pinnatifidis acuminatis* Len. l. V. pag. 202  
Faiqu. bot. 3. Tab. 30.

Habitat.

ad *Leguittium genulaceum* refert All.



Flavescent G. foliis pennatis: folioli quinque oblongis pennatifidis acumi-  
natis dentati margine scabri, floribus radiatis Willden. spec:

restitutus

pl. pag 1421-

*Hemicleum angustifolium* Jacq. fl austr. 2. p 46. t. 173.

Habitat in Australia 4

Sibiricum. H. folus pinnatis: foliolis quinque: intermediis sesquialteris; corollulis unifloris  
nibus Lin. Mant. 354 S.V. p. 201. Hort. ups. 65\*

Pastinaca foliis simpliciter pinnatis: foliolis pinnatifidis Gmel. Sib. 1. p. 21

Habitat in Sibiriā B

affinis Panaces sed humilior magis raris <sup>tantum</sup> veno subtilis pulis  
nyctis Jacq. Soliorum rostris basi barba alba densa

subtilis Jacq.



crnatum  
polyphyllum fl. foliolis octonis ut senis subsceptibus oblongis  
subtrilobis.

Habitat Lina Bayonnam

Caulis altus crassitie. Digit. profunde sulcatus lineis cla-  
vatis subpelosis scabris. Folio sesquipedale. foliola  
oblonga tri. quadrinerviaria basi versus utranque  
loto oblongo in superioribus tantum a latere inferiore  
obtusis supra glabra subtus villis in venis terminatis  
calycis majoris per omnia basi acuminata in petiolum  
vagina villosa. Sepala ternata laciniata  
semina pallida lineis quatuor purpureis a medio ad  
apicem a superiore attenuatis a sinu concuneatis  
inferne divariatis superne in apice coherentibus

~~etiam~~ cum fibrinis conjungit. La. Mark

pubescens fl. foliolis 7nis lanceolatis obtusi serrato incis. inferius  
et supremis 2 foliis glo  
Habita in Sibiria Mejer senso margine tantum villosa  
Caulis peltatis summo extremo tres subconfluentes infimo  
tripartito a reliquis diversa laciniis foliorum angu-  
lis obtusi dentibusque majoribus.  
Involucra et involuella vix ulla.



panaces H foliis pennatis: folioli quinis: inter medio-septibus; floribus radiatis  
Hort. Ups. 65 +

Panax spondylii folio Bau f. Heracleum Bauh. pin. 157.

Heracleum foliis pennatifidis Gmel. Sib. 1. p. 213.

Habitat in Apenninis Nivis 3

Caulis sulcatus crassus crassitie bipollicari altitudo huma-  
na pilosis vixis ampla nervos extus molliter  
vellosi. Folia alterna caesi inferiora quinato penna-  
ta superiora ternata subtus villosa subtomentosa can-  
scentia supra glabra magna <sup>pedicula</sup> inciso profunde  
in lacinas divisa lacinis lato lanceolatis serr-  
atis, attenuatis acutis. Umbello ex singulis alis  
terminalibus. Umbella ampla. Semina <sup>4</sup> unguis  
folioli paucis vel nullis. Semina ovalia, <sup>ungula</sup> ~~lata~~ lineis  
quatuor striata

a reliquis dynopteris qd lacinis foliorum attenuatis

folium subtus mollescens

*an*  
*Panaxium Heraclium* foliis pennatis utroque rugosis scabri floribus subradiatis  
Len Spei. p. 359 \* Mant. 354 L.V.p. 282 \* Jacq. fl. Austr. t. 61.  
*Phondylium alpinum parvum* Baud. prod. 183. p. 157.

Habitat in Alpibus Austro

Planta pedalis. Folia pennata, foliolis; ovato-oblongis sessilibus, serratis,  
utroque scabri, parum incisus, petiolis inferne membranaceis. Um-  
bello alba radiata. Similis *H. Panaxi* sed folia minora, licet in se  
magno, utroque scabra (nec mollia utroque subtomentosa subtusque  
pallida) venoso-rugosissima, utroque viridia. Foliola obcordata. Pedun-  
culi umbellularum scabri in *Panaxi* laxes. Flores albi radiati petalo  
inflexo emarginatis in Spe. et Mant.



tuberosum At foliis septeni, floribus radiatis radice tuberosa Molina  
hist. Nat. Chil. p. 113  
Habitat in Chile

non vidi

humilium *A. Solis byzantinati: foliis lanceolatis glabris, caule prostrato.*

Sill. fl. Delph. 2. p. 640 t. 14

Habitat in Delphinata

non vidi



<sup>at</sup>  
Spinum Heraeteum foliis simplicibus, floribus radiatis Lin. L. V. p. 203

Sphondylium alpinum glabrum Bauh. prodor. P. 3. 4. 83.

Sphondylium montanum glabrum, albo flore Barr. 4c. 55

Heraeteum foliis pennatifidis Ger. prov. 246.

Habitat in Helvetia Alpibus

Scapus nudus. Folia supra Rubi Chamomoni f. Dicus. cum H. austri  
conjungit Sequierius. culta folia supra glabra evadunt. Lin.

folia radicea cordata sublobata dentata glaberrima  
summa subcuneiformia

michi ignota Herb. Schem.

*H. calcinatum* Banksy folia similis *Leontod. Tarax.*