

Heretienia

Cithoralis Heretienia

Hardiana fomes

pag. 100. tab. 20.

Habitat in ripis estu inundati Rangoon 5

Arbor. Rami erecti, rigidi: Ramuli teretes, bulis obsolete, a ^{utroque} latere petioli
ultrajice decurrente, cinerei, fusco punctati. Folia, parva, petiolata, lanceo-
lato-oblonga, obtusa, integerrima, venis minutissime reticulata, supra auti-
da, pubes incana, punctis, fasci adspersa. Petiolus brevis, glandulosopunc-
tatis. Panicula axillari, folio brevior, patens, supra decomposita,
nuda. Pedunculi filiformes pubescentes. Flores parvi extra axillares, calice
pubescenti. σ Cal. cylindricus, 4fidus: lacina ovata, acuta. Cor. σ . Recepta-
culum orbiculatum, depressum in fundo calycis, cui insidet filamentum subre-
ctum calyce brevius. Anthera coadunata in unam, ovata, acuminatam
& ξ in eadem panicula pauciores Cal. et Cor. ut in σ . Filamenta nulla
anthera 4. Germeni basin ambiens, bilobo, versimile effata. Germen
ovatum ⁴sulcatum, receptaculo magno insidens acuminatum. Stili
4 brevissimi. Stigma 4lobum. Caps. 4. pedicellata orbiculata, marginata
dorso gibba, dorso connata lignosa. Semina solitaria, magna ovata

quest. lusi et ^{denis gelba} compressa intus. cara opus coriulifera. frutificatio fore demit aliquando addit

Littoralis Henderia Hort. Kew. 3. p. 546.

Nagam Aked. Mal. 6. p. 37. Tab. 21.

Samandura Lin. fl. Zeyl. 433.

Habitat in Zeylona.

Arbor Ramis glabris cortice cinereo. Folia ^{oblonga} petiolata alterna ovalia
palmaria et ultra integerrima, ^{transversim amplexu nervis sex} glabra subtus squamoso punctata
sul ut fere ut in Elcagno. Panícula axillari foliis multo brevior
minor pedunculis floribusque tomentosis. Flores brevissime pedicellati.