

Hermannia

paniculata Hermannia foliis inferioribus oblongis superioribus lanceolatis subtus  
mentis inaequaliter obtuse serratis, floribus paniculatis

Habitat in Cap. b. p. Her. Proyerii &

Caulis fruticosus, ramosus, teres, lavis, glaber. Folia remotis, petiolata, pollicaria et ultra  
asencia, supra glabra pubescentia, subtus incana nervosa. Peduncululi in ramis  
alterni, solitarii vel gemini, bi-3 flori. Flores cernui. Bracteae duae setae  
ad basin pedicellorum. Cappa angulata, tomentosa.

paniculata Hermannia foliis subtus tomentosis unisqualiter serratis



*micrantha Hermannia*

Habitat in Cap. b. Jaci herb. Rozeni 5

Caulis fruticosus, glaber, determinate ramosus: ramuli scabriusculi, a peli stellatis vix  
armato vixendi subullosi. Folia sesiplex linearis cuneata, semianguiculana, angusta  
glabra, obtusa, apice patula, complicata subt. ciliolata, unicum minore linear  
ad singulum latus folii. Pedunculi ex supremis axillis, solitarii, uni flori. 6 l. par  
vis, nutans. Calycis dentes subulati.

habes



Trifoliata Hermannia Cavan.

Habitat herb. Gusf.

Folii mollesima, subtus venosa, supra <sup>sub</sup>entrosum lineata, semi pollicaria

frabra Hermannia

Habitat herb. Gust.

Caulis & vellis ~~foliis~~ puber. Folia linguiculata, oblonga, utriusque ~~foliis~~ pilo  
sa, supra arenia, subtus nervosa. Calycis laciniis subulata.

proci umbro - Hermannia

Habitat herb. Guaf.

Rami superne adpressi pilis stellatis raris. Folia unguiculata vel parum ultra  
ferrata incisura, obtusissima, tridentata, superiora linearia, crassa, avenia, su-  
pra glabra, subtus pilis stellatis raris. Calycis membranacei, reticulati.  
Peduncululi 1 flori.



vesiana Germania

Habitat herb. Guss.

Rami sicubi, superne villosi. Sola semipollucina, basi attenuata, in ipso subpina  
natisida, dentibus obtusi. Superiora lanceata. Stipula ovata, acuta, attenuata,  
integra vel dente uno altero in parte. Bracteae superiores subulatae. Racemi  
in floribus, pedicelli indivisi.

althaeifolia H. foliis ovatis plicatis crenatis tomentosis. Lin. 1. 2

poeg

Thunb. Desf. no 10

Nelmea africana frutescens, foliis mollibus et inanis  
Comm. hort. 2. p. 151. t. 79.

Hermannia capensis, althaeifolia Pet. gar. t. 34. fig. 2.

Habitat in Olt. C. b. p. 15

mollissima

Tota tomentosa incana. folia petiolata oblonga polluciani

vel minor supra lineata <sup>octava</sup> in fere integerrima et trospu

culnata. stipula lanceolata <sup>integerrima</sup> <sup>pedunculata</sup> <sup>ex axillis</sup> <sup>superioribus</sup>  
secundi biflori solitarii.

althaeifolia H. foliis tomentosa incana foliis ovatis oblongisque venatis, stipulis  
lanceolatis

Hermannia althaeifolia foliis ovatis serratis - dentatis tomentosis stipulis  
foliaceis, floribus cymis. Cavan. Desf. p. 327. tab. 179. fig. 2.



condicans. fl. foliis ovatis subcordatis obtusis tomentosis, calycibus floren-  
tibus patulis subangulatis, stipulis subulatis Hort. Kew. 2. p. 412  
Habitat in Cap. b. p. 5

Rami teretes striati. Folia petiolata oblonga basi sub-  
plicata supra lineata striata subtus incana, crena-  
ta, semipollicina. Stipula parva. Rami termi-  
nales elongati. Pedicelli <sup>incani</sup> gemini subbiflori. Calycis  
angulati dentibus subulatis vellosi campanulati bractea  
lineari ser. fr.  
Sic meo an eodem cum fl. Kew

Folia oblongis plicatis lineatis



nicana H. foliis ovatis plicatis tomentoso- canariis stipulis parvis subula-  
tis Casson. Desf. p. 320.  
Habitat in Cap. 1. p. 5

nicana H. foliis ovatis truncatis apice dentatis canariis tomentoso-  
stipulis lanceolatis, racemis cernuis Thumb Desf.

no. 17.

Totus tomentosus. folia minus cuculiformia breviter petiolata  
a medio ad apicem dentata plicata nervi extantibus  
uniguiculati. Stipula lanceolata petiolo paulo longior.  
Calycis angulatus Thumb

ea ad candidante diversa  
~~a ab althaeifolia diversa~~

mibi ignota

plicata H. foliis cordato-ovatis denticulatis plicatis tomentosis, calycibus  
florentibus oblongo-ovatis subcylindricis Hort. kew. 2. p. 411.  
Habitat in C. b. p. 5

non vidi



*Salviafolia* H. foliis ovatis integris rugosis tomentoso-hispidis, flori-  
bus carnis Lin. Suppl. p. 302. L.V. p. 610 Cavendish. p. 320-4-100  
Habitat ad C. b. p. Thunb. Desf. p. 100.

Fructulus totus tomentosus. Rami elongati simplices, folia pollicu-  
na. Stipulae apice setaceo semurquiuilares pedunculati  
et sub ea flores cingentes pilosifolios calyce longiores.

non vid.

oblongis integerrimis pedunculis bifloris  
stipulis subulatis lanceolatis



involucra<sup>44</sup> foliis ovatis integerrimis acutis stellatis tomentosis

Thunb. Desf. no 4

Germania involucrata foliis ovatis acutis tomentosis flori-  
bus solitariis involucri, corollis revolutis Carun

Desf. p. 320. tab. 177. fig. 1.

Habitat in Cap. b. p. 5

Stem brevis, hispida e fetis fasciculatis. Folia prope  
brevissime petiolata subtus e tomento densissimo flavescen-  
tia. Antheris lanceolatis. Calycis hispida brevissime pedun-  
culati. bracteis lanceolatis. Thunb.

non vidi

vestita H. foliis ovatis plicatis dentatis rarisque tomentosis calycibusque

Thunb. Desf. no 15

Habitat in Cap. b. p. 7

Fruticulus erectus. Rami flexuosi tomento denso flavescen-  
te secti. Folia breviter petiolata apice dentata, acuta  
utroque tomentosa. Stipulae lanceolatae folio triplo breviores  
rariis floribus cernuis, Calycis et Caps. tomentosi Thunb

non vidi



venosa H foliis ovatis truncatis tomentoso stellatis apice dentatis Thunb

Desf. no 14

Habitat in Cap. b. p. 1/3

Frutex pedalis. Rami elongati, teretes, villosi. Folia brevis pime  
petiolata ~~et~~ utraque tomentosa, unguiculata. Calyx et bractea  
tomentosa. Flores in summitate ramorum Thunb

Differencia Thunb nil valet  
mihi ignota



cernua  $\frac{H}{H}$  foliis ovatis obtusis crenatis villosis, floribus cernuis Theob

Desf. no 11.

Habitat in Cap. b. p. 5

Fruticulus palmatis Rami teretes erecti flexuosi, villosi. Ramuli  
li capillares, subaphylli floriferi elongati. Folii petiolo  
ta obtusa, sicabunda. inaequalia unguiculata. Stipula ovata  
acuta minima. Pedunculi ex apice ramulorum capilla  
res, dentales. flores in apice pedunculi solitarii. bracteae in  
tendum in medio pedunculo ovatae. Calyx villosus uti. Capsula  
Theob

non vidi

~~pulchella Mah. caulis erectis terribus; foliis oblongis pennatifidis  
pedunculis bifloris, foliis brevioribus La Mart. Enc.  
Mahernia pulchella Cavan. des. 6. 8. 177. fig. 3.~~

non vid.



Dorata fl. foliis oblongo-lanceolatis tomentosis subtus nigosis: inferioribus  
sinuato-denticulatis, calycibus unicolatis angulosis Hort. Kew

2. p. 412.

Habitat ad Cap. b. p. p. t.

Sociis Herm. & Lavandulifolios

miki ignota

Scabro. H. caule scabro, foliis lanceolato-ovatis dentatis scabris, pedunculis  
bifloris, calycibus bibracteatis. Baran. Desf. 331. t. 182. fig. 2.

Habitata Cap. b. part.

Tota scabra. Rami virgati. folia parva apice crenata. Stipulae ovato-  
lanceolatae. Calyx diaphanus non inflatus. Baran.



*Trifurca* 4-folius lanceolatis integris tridentatisque ralemis sicca

Thunb. <sup>Did.</sup> <sup>Pen.</sup> <sup>Am.</sup> <sup>acad.</sup> 6 244 <sup>Bartr.</sup> <sup>pos</sup> 332. v. 178. p. 2.

*Althoa africana* frutescens, floribus aureis cochlearis per  
culis minoribus Volk. nonb. 24. 8. 24.

Habitat ad Cap. 6 spec.

Rami teretes rugati inferne glabri superne a pilis minutis stella-  
tis, incanis, scabri. Folia non unguiculata, integra acutius-  
cula vel apice tridentata petiolo in ramis fasciculato folio  
cum ut axillari unde eplopi & aggregati cinerascienti  
scabri a pilis stellatis minutis super inferum nuda.  
flores secund. d. stantes nutantes lacinis calycis lanceo-  
lato longitudine cal per corolla.

— lineamibus  
calycibusque pilosis

pedicellis

*hypsopholia* H. foliis lanceolatis obtusis serratis. Lin. Spec. pl. pag  
9424 Cavan. Desf. p. 330. t. 186. fig. 3.

*Althoa africana* frutescens, floribus aureis cochlearis pen  
dulis minoribus Vahl. nonb. 24. t. 24.

Habitat ad Cap. b. Spei

Frond. ex erectis. Ramis frangi superne scabri ramuli scabro  
tomentosi. Folia petiolata int. obtusa vel subtruncata  
tertiis tomentosa unguis vilano. Stipulae subulatae  
brevi flori terminales micropi. Calyx angulatus  
villosus. variet. foliis villosis scabri et micropi tomen  
tosi

arbuscula africana In capsulari etc. Platin. alm. mant. 24. pl. 1. tab  
339. fig. 7. herb. Mus.

— cuneiformibus exstropium serratis calycibus inflatis  
villosis

Herm. *hypsopholia* foliis obovatis obtusis tomentosis apice  
dentatis, calycibus inflatis villosis Thunb. Desf. n. 12



hispida H. foliis lanceolatis hastato-tomentosi pedunculis unifloris

Thunb. Desf. no 3.

Habitat in Cap. 6/pei 5

Fruticosa bipedalis. Rami teretes elongati inferne glabri superne villosi.

li. Ramuli breves. Folia in ramulis sessilia obovata obtusa flavo-tomentosa, serrunguiculata Flores axillares solitarii. Stipula lanceolata folii dimidio brevior. Pedunculi longitudine foliorum. Calyx et Caps. hispida. Thunb. affinis *Cavendishia*

~~ciliari H. foliis lanceolatis acutis integris serratisque ciliatis Lin.  
Suppl. p. 302. L. V. p. 611  
Habitat ad Cap. b. p. ei~~



Lavandulifolia H. foliis lanceolatis obtusis integerrimis Lin. l. v  
p. Cavan. Desf. p. 331. t. 100 fig.

Hermannia frutescens, folio lavendulo latiore et obtuso,  
flores parvo aureo Willd. Elth. 179. t. 147. fig. 176.

Habitat ad Cap. b. p. ei 5

Rami filiformes vel superne incani scabris Folia breviter  
reticulata lanceolata vel oblonga basi acutis apice  
obtusis cum mucrone minore conduplicata incana mollis  
fimo unguiculata. Stipulae lineares longitudine petioli  
Flores sesqui apices <sup>sub</sup> paniculata cernui calycis tomentosi  
uti pedunculis et pedicelli

Lavand. H. foliis lanceolatis oblongo lanceolatis obtusis incanis, pedunculis  
curvis

Herm. Lavandulifolia foliis lanceolatis integris tomentosis  
pedunculis curvis Humb. Desf. no 2

venudata H. foliis lanceolatis acutis lobis superne serratis Lin  
Suppl. p. 301. t. V. pag. 611. Caran. Desf. p. 329. Tab. 101. Fig. 1.

Habitat ad Cap. b. frei t

Tota glabra  
Rami teretes glabri. Eolia petiolata bipollicaria serrate  
serrata supra versus attenuata, acuta glaberrima arena  
subtus puberula. Stipula ovata lanceolata unguiculata  
pedunculi axillares <sup>in</sup> solitarii plerumque <sup>superius</sup> usque longitudine  
foliorum ~~inter~~ Calyx campanulatus latenter ovato

venudata H. foliis lanceolatis acutis extroflexis serratis glabris  
capulisque glabris Thunb. Desf. no 9



*Cleistanthus linifolius*

*linifolia* H. foliis lanceolatis pedunculis trifidis Burm. Afr. prod. 10

P. V. pag. 611. Mont. 256

Hermann

Habitat ad Cap. b. Spei

*Cleistanthus* H. foliis lanceolatis integris trifidis que ciliatis, caule decumbente Thunb. Desf. no 7

Caulis glaber teres. Ramis prostratis foliatis angulatis. Folia parva sessilia e gemma superius 3<sup>ae</sup> lobata in usum anterius medium trifidum, rarius dentato-spicatum, inferne valde attenuata supra sulco tenui, subtus costa robusta. Petioli et ciliata. Lateralia lanceolata stipuliformia medio breviora inter medium unguiculata. filamenta libera Thunb.

Hermannii *Cleistanthus* foliis lanceolatis integris prostratisque ciliatis Lin. Suppl. p. 302.

non vidi

*grosfulanifolia* H. foliis lanceolatis pennatifidis. Lin. S. V

*Hermannia* foliis obovatis acute incis, pedunculis bifloris  
Royer. beyd. 347.

Habitat in C. b. p. 5

*grosfulanifolia* H. foliis lanceolatis pennatifidis pilosis, caule erecto  
to fistuloso, stipulis ovatis acutis Thunb. Desf. no 22.

Interius erubescens purpurascens totus puber. Rami teretes.  
folia subpetiolata convoluta cinnamomea unguiculata  
Stipula ovata cordata. Flores racemosi pedunculis <sup>velut</sup>  
simplicibus vel bifidis Calyx campanulatus glaber  
Thunb. non vidi.



humilis H. foliis lanceolatis inciso serratis scabri, caule decumbente Thunb

Desf. ne 19.

Habitat in C. b. p. 5

Stemulis tenuissime villosis. Fami filiformes secundari

digitales biparti. Folia breviter petiolata nervosa pilis

stellatis hispida, subpubescentia. Stipula lanceolata. Flores

racemosi, terni. Bractea ovata subulata. Calyx et Capsu

la parum villosa Thunb

non vidi

alnifolia H. foliis cuneiformibus lineatis plicatis crenato-emargi-  
natis

Asterifolia africana tunc affulans oronidis verno singulari foliis  
Plukh. mant. 14. T. 239. fig. 1.

Hierma africana vesicaria fruticans et erecta, alni foliis  
calycibus et majoribus Com. hort. 2. p. 158. T. 70.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Rami sparsi divaricati saepe tomentosi scabidi ut ramuli  
folia breviter petiolata, <sup>sub ex. supra emarginata</sup> plicata tomentosa state glabra  
nervosa supra lineata unguiculata. Stipulae bene  
simo. Flosci racemae terminales secundae, bractea ovata  
acuta summa.

alnifolia - H. foliis obovatis plicatis crenatis tomentosis, stipulis  
ovatis acuminatis

Herm. foliis cuneiformibus plicatis crenatis tomentosis  
calycibus stellatis tomentosis Thuab. Desf. 12. 16

Hermesma alnifolia. caule fruticoso ramis diffusis, foliis cuneiformibus  
crenatis emarginatis, florum racemosis Car. Desf. p. 224. T. 179. fig. 1.



lineifolia <sup>mollescenti.</sup> H. foliis lanceis lanceolatis integris <sup>mollescenti.</sup> indentatisque incanis  
pedunculis axillaribus unis flori

Habitat in Cap. b. p. 5

Rami teretes filiformes striatissimi. Folia subsessili  
utroque incana unguiculata. Stipulae folio dimidio  
breviores lanceis lanceolatis. Calyx pediculi brevis  
calycis campanulati villosi.

~~lineifolia~~

*Filifolia* <sup>4</sup>foliis linearibus triquetris integerrimis Len. Suppl. p. 302.  
P. V. pag. 611.

Habitat ad Cap. b. spici

Frutex glaber fusco purpureus. Ramuli ultimi villosi scabri. Folia  
fasciculata sessilia linearia convoluta teretia, apice pungente  
glabra incurva unguiculata. Flores in ultimis ramis axillares  
pedunculis bifidis. Calyx submembranaceus. Folia fasciculata apparent  
et stipulis et pedimentis foliaceis ramorum axillaribus.

Folia filiformi linearibus glabri. Thunb. Desf. no 1

*Hermannia filifolia* foliis linearibus triquetris glomeratis, stipulis magnis  
canalicatis. Cavan. Desf. p. 332. tab. 100 fig. 7  
non vidi



~~Trifoliata & foliis ternatis sessilibus plicatis velut tumentosi spec-~~  
~~rept. Insuper~~

~~pl. p. 442 Mann 1731~~

Hermannia frutescens, folio oblongo molli cordato hirsuto

Boeck. hagd. 1. p. 273.

Habitat ad Cap. b. frei 5

Hermannia trifoliata foliis alternis tumentosi canis formibus; stipulis  
maximo foliis ovatis Cassanet. dist. p. 233. t. 10. fig. 1  
nardi

~~Triphylla fl. foliis ternatis petiolatis planis obovatis Lin Am.~~

~~ae ad 6 n. 254~~

Habitat ad cap. 6 spec

Triphylla fl. foliis aggregato ternis ovatis tomentosis dentatis  
calycibus campanulatis Thunb. Desf. no 13

Triphylla fl. foliis ternatis planis obovatis, medio petiolato majore  
Cav. Desf. p. 333. t. 170. fig. 13.

visita a Linnæo quo speciei Connari spec. Thunb non vidi



capensis

¶ foliis oblongis obtusis incisive serratis, floribus autem albis.  
Subsolitaneis Pat. et pag. 60. cum c.

non vid.

*myrsinifolia* # foliis pinnatis: pinnis linearibus subpinnatifidis integris glabris  
caule decumbente, stipulis ovatis Thurb. disp. n. 927

Habitat in cap. b. p. c.

Caulis suffruticosus flexuosus, tenuis sine pilosus, simplex, plerumque  
ex uno radice. Folia alterna remota, pinnis pinnatifidis  
fesso seu pinnatifido: pinnulis lanceolatis, integris, divaricatis  
vel potius reflexis. Stipula integra. Flores terminaliter  
solitarii, bini cernui. Calyx campanulatus pilosus  
Thurb.

non vidi



*pulchella* foliis lanceolatis pennatis fidis pennis integris unis perque  
caule erecto l. vi Lin. Suppl. p. 302. Cavan. Diss. bot. 6. v. 177  
fig 3.

an *Maheana*

*diffusa* # foliis lanceolatis pennatis-fidis: pinnis integris dentatisque  
pedunculis capillatibus bifloris, caule procumbente Lx. suppl.

p. 302. S.V. p. 611.

Habitat ad Cap. b. p. 5

*Hermannia diffusa* foliis lanceolatis unisp-pennatis-fidis  
pilosus, caule decumbente scabro, stipulis lanceolatis  
# Humb. Desf. ne 25. un. tabula

Caulis frutescens decumbens. Rami alterni secundi-  
vellopi, oppositi bifidis vel alterne ramulati. Folia breviter  
petiolata lanceolata acuta, unisp-pennatifida pinnis  
integris vel acute serratis, subtus pilosa, unguiculata  
# Lx. terminales cornu pedunculati pollicares  
oppositi bifidi. Calyx campanulatus villosus

# integris

non vidi



prostrata. H. foliis in se parvis fidei inferentibus oratis superentibus elen-  
gatis, floribus racemosis. Cavan. Desf. p. 329. T. 177. fig. 2.  
Althoea africana frutescens floribus aureis cochleari pediculis  
minoribus. Vahl. Numb. 24. 6. 2.

Hab. in Cap. b. p. l.

caulis prostratus filicatus. Petaliis crispis folia inferentibus  
peltatis uti rami subplexibus superne  
apiculatis.

caulis  
prostratus  
vel subtrifido  
superne vix villosa  
prostrata

caulis prostratus filicatus. Petaliis crispis folia inferentibus  
peltatis uti rami subplexibus superne  
apiculatis.  
Stipula cordata. Periclymenium  
natis; flores papaveris hinc Calyx campanulatus villosus  
Thunb. et Cavan.

H. foliis oratis in se parvis fidei subtrifidis, caule decum-  
bente stipulis cordatis oratis. Thunb. Desf. no 24

non vid.

sepiaria 4. caule tomentoso, foliis cuneatis pennatifidis pubes. velato peltatis  
fructibus magnis inflatis terminalibus. Cavon. D. S. p. 331.

Tab. 181. fig. 2.

Habitat in Q. b. per 5. ultimi c. anspicentis

nam <sup>to mentoso</sup> folia <sup>pubescentibus</sup> paucis in sepiaria basi cuneiformes. apice

infusa supra glabra. Hypanthia lobata. Antheris terminalibus.  
Calyx brevis. Capsula villosa

— foliis cuneatis cuneiformibus subpennatifidis pubes. v. r. v. s. que  
p. lobis capsulis inflatis villosis



obj. Tomento in omni Herm. stellata ideoque pro character specificato  
inferre nequit. Cuius folia mea adwersa a hinc fol. Syst Gmel