

Hernandia

Sonora Hernandia foliis ovato-cordatis peltatis vel basi petiolatis.

Hernandia sonora foliis peltatis Lin. - L.V. p. 847.

Habitat in Montserrat de Ryan. 5

Rami crassitie digiti minimi, tetragoni, ciliati, apice lentes  
tomentosi.

Folia ad apices ramorum, approximata, petiolata, alterna vel subopposita  
6-7. pollicaria, basi subcordata, apice obtusa vel acuminata, parum  
longiora quam lata, integerrima, utrinque glabra, supra nervosa,  
subtus venosa.

Petioles teretes, laeves, subcanescentes, vix tomentosi, interdum longitudo  
duae foliorum, versus medium folii inserti, interdum parum intra  
basin, interdum in ipso basi.

Comae axillares, solitarii. Pedunculi universales petiolo parum  
longiores, teretes, canescentes: partiales sesquipollicares. Folium  
subrotundum, pollicare, acuminatum, ad basin pedunculo  
nim partialeum. Flores in umbella composita: radii interna  
ni, unisepales 4. partiales 3. Involucri foliola 4. partialia  
triphylla, oblonga, longitudine radiorum

~~publ. de~~ ~~De~~ ~~ce~~ ~~le~~ ~~le~~

180209. Montfermeil.

origera 4 foliis ovatis basi petiolatis Ren.

Arbor origera Rumph. amb. 3. p. 193. t. 123.

Habitat in India orientali

Folia ad apices ramorum petiolata basi cordatata oblonga  
parum acuminata integerrima venosa, tri-5 nervia sive  
pithamboa glabra nervi subtus tomentosi. Petioli longitudi-  
ne foliorum tomentosi. Pedunculi tomentosi petiolo dimi-  
no longiores bractea lanceolata uti flores tomentosi

— cordatis oblongis

<sup>Art. Elect. 405. t. 23.</sup>  
Honora *H. foliis peltatis* Lin. fl. rep. 423. & Gaym. Amer 245  
*Gernandia* amplo hederae foliis umbilicatis Plum. gen. 6.  
Nova-veperiana oleosa, foliis umbilicatis Pluk. alm. 266. t. 108  
fig. 1.  
Arbor Regi Rumph. amb. 2. p. 257. t. 85.  
Balantine Pet. gar. t. 43 fig. 1.  
Habitat in India

— foliis ovatis subpeltatis

descriptionem quae inter ameni

Guianensis fl. floris plicatis ovatis acuminatis Aubl. fl. Gu. 2. p. 848. tab.

329

Habitat in Guiana

non vidi.