

Herniaria

1. glabra H. glabra, caule herbaceo  
2. hirsuta H. hirsuta, caule herbaceo  
4. fruticosa H. fruticosa, floribus quadrifido  
34. alpina H. hirsuta, floribus subglomeratis, caulebus suffruticosis, foliis  
oblongis oppositi

Lenticulata Hernand. ? ~~quo polygonum lenticulatum: Lin. Spec. 3077 LV pag.~~

~~Polygonum micranthum~~ ~~tenue folium~~ Bauh. prod. 131. Pm. 201.

habitat in Hispania montibus Espinal. Monpelii Cnyb. Lin.

Planta dubia et forte eliminanda. Figura Bauh. aequae ac planta in Syst. Veget.

secundum Specimen Herbarii ipsius Lin. et Crespa Cretica, in herbario Pluk.

eadem est. in montibus ad Espinal Plantam, ad genus Elleicri omnino

pertinet, legit Dr. Barnades, quam Lin. ~~St. Lenticulatam esse suspicavit~~

Et ut in eum natum exstitit Specimen herbarii Lin. sub hoc

nomine omnino Crespa Cretica, figura Bauhaumii allata ad

Crespa Creticam pertinere unumquisque patet qui illam unquam

viderit. Synonyma Bauhi Pluk. in: Res. huc non pertinere videtur

unde apparet quod hi omnes plantam foliis nitentibus esse perhibent

Lin. mollia, figura Bauh. à Pluk. et Pet. omnino dissepant.

ad Hernandam glabram uti varietas relata glabre plenior

Pluk. aln. pag. 302



multifidus Convolvulus vellopi <sup>tri</sup> foliis <sup>partitis</sup> linearibus <sup>dentatis</sup>, <sup>petua</sup>  
culis unifloris inter medio <sup>per</sup> pedunculis <sup>is</sup> unifloris  
Habitat in monte video Brasilia Commerçon de Thouis  
Totus vellopi.

Caulis tener.

Folia multifida petiolata: lacinae lineares hinc inde dentatae,  
longitudinaliter incisa, saepe integerrima in summo reflexa.

Pedunculi solitarii, uniflori, longitudine foliorum, versus apicem  
incrascati: bracteae binae sitae

Calycis lobula ovata, acuta.

Corolla quinqueloba: lobis acutis, linea lanceolata per singulum  
lobum pernigro-pelosa, interstitiis glabris albis

*Hernaria*

*Hernaria maritima* folio crasso

Habitat etc in Lusitania herb. Gusf.

Caules frutescens, prostrati, glabri, palmares

Det Gusfua

*Hormiana maritima* <sup>regens</sup> *Lusitana rotundifolia* Tournef. *Fruct. v. h.*

Habitat in Lusitania herb. mus.

Radix longa, descendens, superne in caules <sup>rami</sup> divisa; caules <sup>rami</sup> ramosi, diffusi  
breves.

habes

hispanica Hermaria

Habitat in hispania herb. musci

habeo

varietas *Hernandana*

Habitat in Italia herb. Musc.

Caules plures, diffusi, hispidi.

habes



alpina <sup>glomerata</sup> fl. floribus hirsuta, floribus subpeltatis, caulebus decumben-  
tibus <sup>suffruticosa</sup> ramosis, ~~radice perenni~~ foliis oblongis oppositis

Germania alpina glomerata hirsuta pauciflora, radice  
crassa sub lignosa Villars fl. Delyph. 2. pag. 556.

Germania lenticulata Ell. fl. Pedem. n. 205 p. auct.  
pag. 3 6.

Habitat in alpibus Europa australi 4

Radix crassa lignosa caules plures ramosis, <sup>confertis</sup> filiformi-  
bus. folia sessilia <sup>conferta</sup>, thymi magnitudine. Stipulae  
ovatae siccatae pilosae. flori pauci axillares

fruticosa H caulebus fruticosi, floribus quadrifidis Linn Am ac. 4. p. 269. Loef  
J. 1204

Polygonum hernandi folio et facie, per ampla radice lobel. 4. p. 85.  
N. Aub. hist. 3. p. 370.

Hernandi fruticosi, viticulis lignosis Baub. pin 302.

Habitat in Hispania &

Fruticulus sive ramulus ramulorum rigidus teres  
ad presens interdum ramis sparsi flexuosis in quibus  
corticis uneres transversum rugoso. Folii acerrati <sup>glomerati</sup> in  
capitulo <sup>glomerato</sup> parvo minutissimo, oblonga obtrusa plana  
glomerata in capitulo globozo parvo, glomeruli oppositi  
flores glomerati confertissimi in summitate ramorum

in hispania lecta vidi in herb. Mus. cum sequente Synonymi  
Polygonum fruticosum erectum hispanicum Baubl. 4. p. 713

Centiculata H. suffruticosa hirsuta, foliis ovatis Thunb-prodr fl.

cap. 1. pag. 4 P.

Habitat in cap-b-pnei

non vidi

herpeta A herpeta. Bauh. hist. 3. p. 379

Habitat in Anglia, Hispania, & Italia agris

forte varietas prociidanti

vix a prociidanti nisi herpeti diversa, quam tamen celta non  
deponit.

glabra H. glabra Bauh. hist. 3. p. 370 fl. Dan. t. 549

*Polygonum minus* f. *metastroma* major Bauh. pin. 201.

Habitat in Europa aprieis, glareosis sicca. C

Caulis plures terro adpressi ramosi glabri uti tota planta. folia  
oblonga sessile obtusiuscula parva magnitudine sex thymi frequentia  
opposita. Flores in axillis congesti coruosi.