

Helipenis

1. Infrigidus H. caule ramoso patente folisque lanceolatis integerrimis peltatis
2. matronalis H. caule simpliciter erecto, foliis ovato lanceolatis denticulatis, petalis mucronem emarginatis
3. inodora H. caule simpliciter erecto, foliis subhastatis dentatis, petalis obtusis
4. africana H. caule ramosissimo diffusis, foliis lanceolatis petiolatis acute dentatis sicabris, siliquis suspensibus
5. verna H. caule erecto ramoso, foliis serratis villosis inferionibus obtusis superioribus cordatis
6. acris H. caule ramoso erecto, foliis oblongis dentatis pinnatis glabris inferionibus petiolatis superioribus suspensibus
7. laevis H. foliis runcinatis, siliquis tripartitis

glabrata Hesperis foliis lanceolatis denticulatis glabris, caule teri

Habitat in Oriente herb. - Desfont.

Caulis erectus, ramosus; terres glaber. Folia frequentia, sessilia, sesqui
pollicaria, lanceolata, acuta, remota, super denticulata, glabra. Calyx
glaber. Petala violacea. Siliqua inermis, remota, quinquepolli
caris.

Cato Calmar

Hesperis

Leucogon maritimum minimum hispanicum verum folus emia Tournef Inst.
A. L.

Habitat in hispania herb mus

Caules palmares vel pithamei, tenues, prostrati. Folia linearia densa usq ad
terosa subpennatifida

glandulosus Herpersii

Habitat in Dauria arenosis Lib. Venterat

Caulis herbaceus, palmans, ramosus, utriusque folia inferne margine et pedunculi adpressus glandulosi, pilosus. Folia polliciana, linearia, integerrima, pilosa. Calycis pilosi

glandulosa Aesperia?

Habitat.

Herb Desfont.

Caulis digitalis, ascendens herbaceus, uti pedunculis punctis floribus, respro
adspersi. Folia sessilia, semipollucaria, lanceolata, basi attenuata, dente
utrinque 1-2, incisa, glabra, dentibus apice seta alba terminatis, basi
ciliata, ope lentis margine punctis resprois floribus & color ratione glandis
magis

Cheiranthoides Hesperis

Habitat in Sibiria & herb. Vent.

Caulis simplex, erectus, digitatus. Folia vix semipollicaria, lineana, integerrima
obtusis, ciliata. Calycis foliola lineana. Corolla purpurea.

incana Hispani

Habitat in Daunia rupestribus herb. Ventenat.

Caulis plures, simplicissimi, erecti, palmares, incani, uti reliqua planta. Folia
linearia, integerrima, infima minora, sublonga. Siliqua parva, incana

herb

parviflora Hesperis

Habitat in Dauno campis herb. Venetianat.

Cauli palmari, erectus, simplex, filiformis. Folia unguiculata, septia, linearia, angusta, pilosa, profertim radicalia. Pedicelli remoti, patentes. Siliqua semipollicaris, glabri, subulati.

glaberrima *Hesperis*

Hesperis orientalis, *glaberrima* Tournef. Cor. pag. 16.
Habitat in Cappadocia herb. Tournef.

a ludo specimen foliis oblongis superioribus ovatis viscosis villosis. Caulis semipedalis

habes

glaber Hesperis foliis sessilibus linearilanceolatis integerrimis subdentatisque
glabris, caule glabro

Hesperis leptanica, angustifolia, foliis dentato, flore purpurascente,
Tournef. Gr. h. p. 223.

Habitat in Leptanica herb. Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, superne scaber, glaber. Folia sessilia, tripollucaria
linearilanceolata, obtusifolia, integerrima, vel denticulo uno al
terove, scabriuscula, glabra. Racemi superne. Calycis canescentes, li
nearis. Flores purpurei. Siliqua non vidi.

bracteata
glaberrima *Asperis*

Asperis orientalis glaberrima flore magno violaceo Tournes. Cor.
Habitat in Oriente herb. Mus.

Caulis erectus, sesquipedalis, simplicissimus, villosus, canescens, fibrillosus,
teres. Cilia canaliculata; radicalia et inferiora petiolata, basi attenuata, sesqui-
pollicaria, extropium denticulata; superiora sessilia, erecta, acuta, semper minima.
Bractea superne, interdum ter. Calyx purpureo, pilosus. Siliqua erecta,
glabra.

Chaetocarpa Wed

indorta *Hesperis incana*, foliis lanceolatis infimis dentato subpinnatifidis, supremis
subintegerrimis, silyquis subtumulosi indortis
Hesperis orientalis, leucis foliis, ~~in~~ silyquis corniculatis et indortis

Tournefort. Cor. pag 16.

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Incana. Caulis erectus, frithamow, ramofus: rami patentis. Folia supre-
ma subintegerrima, omnia lanceolata, infima subpinnatifida - dentata.
Silyquis pollicares, rostro apice bidentato, dentibus minutis divergentibus.
subtumuloso. Flores. lutei.

ramosissima
Cercia folia Hesperis

Hesperis matronalis *Cercia folia flore minimo* Tournef.

Habitat in Oriente herb. Desfont.

Planta perennans, erecta, incana, ramosa. Folia unguiculata, lanceolata,
4, obtusa, integerrima, basi versus aristata, dentibus uno alterove notata.
Flores parvi, rubri. Siliquis vix pollicares, racemose.
an *Cheiranthus*

Hesperis ramosissima Desfont. fl. atl. 2. p. 161

afriana H. Caule ramosissimo diffuso, foliis lanceolatis petiolatis
acutis dentatis palmis, p. liguis sessilibus. Lin. spec. pl. p. 928 +
Leucopium gallicum Galeni folio Boer. p. 77. t. 42. fig. 1.

Habitat in Africa.

Caulis ramosissimus tenis scaber villosus uti folia & ligula
pili trifloridibus. Folia in petiolum attenuata sesqui
pollicina remote inaequaliter dentata obtusius. Petala
purpurea lineana angusta. Ligula tripollicari fere
sester obtuse mucrone acuto

Asperis sylvestris parvo flore Bauh. prod. 103. p. 202.

trifol
trifol

caule hispido ramofo patente L. f. V
Hesperis pannonica Pom. hort. t. 18.

Facque fl. austr. n. 2. 1. 102

Hesperis montana pallida Dodon. xosima Bauh. pin. 202

Habitat in Hungaria, Austria arvis J

Caulis erectus teres striatus uti tota planta pilosus. Folia radialis
in petalum attenuata caulina simplicia ^{bus linguata} canaliculata nudigeni
ma. Calycis lobula linearis canaliculata obtusa petalo dimidio
brevis. Petala linearia obtusa inferne versus attenuata pedic
flavescens senio fuscis pedic.

in pilosissima

foliis canaliculatis nudigenis

culta

matronalis β . caule simpliciter erecto, foliis ovato-lanceolatis dentato-
catis, petalis mucronem emarginatis. Lin. l. V. p.
Viola matronalis God. pempt. 161.
Heppens hortenfi Bauh. pin. 202.

β . Heppens fibinica caule simpliciter, foliis lanceolatis dentato-
serratis, petalis obtusissimis integris. Lin. spec. pl. p. 4274

Habitat in Italia β . in Sibina &

Caules erectus ramis villosus puberulus. Folia superiora
sepius ovato lanceolata remote denticulata tripollicina
pilis minutis adspersa. Palyces obtusi petala purpurea vel
alba lamina ovarata β . Differt caule duplo altiore petalis pur-
pureis. Sanguibus petalorum calycis duplo longioribus petalis non
emarginatis. Folia longiora angustiora magis serrata.

³ inodora H. caule simpliciter erecto, foliis subhastatis dentatis, petalis
obtusis Lin. Spec. pl. p. 927 Gaeyh. fl. austr. v. 4. t. 347. fl.
Dax. tab.

Hesperis? Clusius. 1. p. 297.

Hesperis sylvestris inodora Bauh. pin. 202.

Habitat Vienna, Manjalis P.

Similema H. matronali ut vix nisi varietas. folia secundum
Linne magis vel basi trans versa (in mea basi in petiolum
attenuata cauleque scabro & tuberculis raris quibus insident
peli calyx an aptus hinc forte potius matronalis pot. hinc
aufugit calyx non colorati. Petala absque mucrone. Stamina
non extra tubum corollae.

Planta Kaudschi mihi nota

talanica H. caule nudo flexuoso decumbente, foliis radicalibus
crassifoliis lanatis ovato-oblongis laciniatis Pallas
it. 1. p. 49 t. 1. fig. 1. 2.

serna ⁴ caule erecto ramoso, foliis cordatis amplexi caulis serratis
villosi.
Leucogonum ^{rum} mantimum albidum latifolium purpureo-violaceum

Cob. i. 333.

Rapistrum floribus leucogi marini Bauh. prod. 37. pin. 95.

Leucogonum mantimum latifolium Bauh. pin. 201. Mon. f. herb. 2.
p. 241. f. 3. t. 8. fig. 5.

Leucogonum minus rotundifolium, flore purpureo, Bauh. ii. 876.

Habitat in galloprovinciis mantimis O

caules ascendentes plures simplicissimi palmari vel semipedales
caulis inter ^{vel} ~~se~~ ^{inter} ~~se~~ ^{superni} glabrescunt. folia villosa lobata radicata
duo interdum ^{plura} canaliculata saepe bipollicaria vel ultra caulinam

aphyllis ^{parva} inferiora oblonga superiora subcordata polli polli
cana vel minor, pedunculus terminalis elongatus aphyllis
flos unguis petala linearia unguibus albis lamina violacea
calyx pilei rariobus. Siliqua brevissima pedicellata
supremi subsiles striata, tripollicares glabra

acni H. foliis oblongis dentato sinuatis glabris inferioribus petiolatis superioribus sessilibus

Heopreni acni foliis oblongo ovatis, dentato sinuatis, glabris, inferioribus petiolatis: pedalis subtundis obtusi *Boiss. Desf. pag. 110.*

Habitat in convallibus thalensis. O

Caulis pedalis subangulatus, glaber ramosus erectus. Folia inferiora nervosa crassius majora bipollicaria per petiolum decurrentia basi propositim [†] inaequaliter dentato sinuatis nervosi [†] superiora angustiora dentibus minoribus [†] ~~tamen~~ subsinuata. [†] Pedicelli [†] siliiformes [†] sessidi. Calyx villosus longitudine unguum. Lamina petalorum subtundis violacea. Siliqua pollicares erecta compressa tuberculata.

7
Lacina H. foliis multinatis, siliquis Len. P. V. p. 599 +
Leucopium lusitanicum purpureum, foliis eleganter dentato-
Herm. parad. 193. 7. 193.
Cheiranthus lacinus foliis lacinis dentatis acuminatis. Calycibus
pilosis, siliquis nodosis multinatis Len. Spec. pl. p. 926
Habitat in Lusitania O
Folia nuda lanicolata, angusta. Calycibus pilosis. Flores rosei
et colore trifies. Siliqua nodosa ^{pub} bicuspidata. Caulis ramosus
— pub

non vidi

~~Cheiranthus lacinus~~