

Herbes

hastatus *Habscius*

Habitat herb. *Husf.*

Caule villosus, villis stellatis, sulco descendentibus. Folia petiolata, bipollicaria, lanceolata, basi lobis lanceolato hastata, remota serrata, trinerviis, subtus pubescentibus pallidioribus, axillis armatis villis stellatis. Pediculi pollicares.

radialis Hibiscus

Habitat herb. huj.

Foliorum basi remote serrati; 2-3 nervis, attenuatis, acutis.
Caulis teres, glaber, uti folia.

Digitalis Hibernica

Habitat herb. huf.

Folia 3⁴-5-fida, subtus ^{poro} glandulosa in nervo medio. Calycis extenuis foliata
lanicolato.

membranaceus Hibiscus

Habitat herb. Turf.

Rami teretes. Folio tripollicari, cordata, ovata, obtusa, quinquenervi,
obscure venosa, sic uti stipula, sic uti lo armato subulosa, basi obscure lobata,
integerrima. Stipula subulata. Petioli bipollicares vel parum ultra. Ca-
lyx interior subiam paniculatus, fere pollicaris, subanescens: lacinae ovatae
acutae.

Trilobus trilobus

Habitat herb. Gusf.

Stemmi purpurei, crassitie pennis asperis, apice pilosi. Folia 3 pollicaria,
basi subcordata, 3-5 loba, quinquenervia, ^{intra nervat ea,} obsolete venosa, scaberrima, gla-
bra, nervis venisque, uti petioli aculeolati: lobi obtusi, crenati,

Capocarpus Hirsutus foliis ovatis subtus niatis

Habitat herb. Quif.

Caulis teres, inferne glaber. Folio 3-4 pollicaria, acuta, utrinque velloso
quinque nervia, subtus transverse remote simpliciter venosa. Petioli
longitudine foliorum. Pedunculus pollicari, crassus. Capsula flavescenti;
resubisima.

Campari *Glabifera*

Habitat herb. Fusf.

Rami teretes, glabri. Folia 3 pollicaria, vel parum ultra, subcordata, supra
glabra, oculo armato punctis stellulatis villosa, obscura triloba: lobi ovati,
acuti, intermedius attenuatus, integer rima, quinque nervia, subtus villosa,
subtomentosa, senosa. Calycis laciniis attenuatis subulatis. Corolla calus-
tomentosa

Sernigineus Herbifer

Habitat herb. La-Manthui

habes

Fraber H. h. f. f.

Habitat herb. ha. Martini

Caulis teres, tuberculis fungosis frequentissimis adpressis, uti petiolis et foliorum nervis
visibilibus. Folia petiolata, ^{globosa} inferiora squeloba, ⁴ superiora ² ovata, ² obtusius serrata, ⁷ superiora
oblonga, undulata: Racemus ⁴ terminalis, ⁴ elongatus. Pedunculus caestros
Calycis hispidissimi: exterior ophyllus, ⁴ foliola lanceata: lacina interiori
lanceolata, tuberculata

Linatus Herbicus

Habitat herb. tusc.

Caule glabro, aculeis prostris. Folia tripollicaria: lobi laterales ovati, venis minutis lanceolata, remote serrata, subquinq; nervia, subtus venosa, venis villosis. Stipula subulata. Pediculi semipollicares, petiolo brevioribus, hirti, intermixtis setis nonnullis longioribus, Calycis lacinus ovato, trinervis: nervi pedis nitidi herti.

Trifurcatus Hilbfur

Hal. Stat herb. Ausf.

Caulis teres, adpressus aculeis parvis, glaber. Folia bipollicaria, remote serrata, supra oculo armata rare pilosa, in lobis hastata; lobi acuti ovato-lanceolati, petiolo longiores. Petioli bipollicares, aculeolati. Calyxes hirti.

Ferrugineus Habitus

Habitat herb. Quis.

Folia pollicaria vel parum ultra, subcordata ovata, quinque nervia, supraavena
subtus venosa, subvenosa, obtusissima, basi sublobata, lobo rotundato, inequaliter ire
nata. Stipulae setaceae. Pediculus semipollicaris vel parum ultra

gossypifolius. Herbiferi foliis cordatis indivisi trilobisque subtus tomentosis

Habitat in Tara herb. Turf. 5

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, palmata et ultra, venosa, supra gla-
bra, lobi ovati, acuti, integerrimi. Stipulae setaceae. Pedunculi pappi
nae, axillares, solitarii, brevissimi, uniflori. Calyx externus deciduus
internus unicoloratus, brevis sive dentatus: dentibus setaceis. Corolla
tomentosa.

affinis populifolius

artus folius Heliosci

Habitat in St. Dominga & herb. Thaurini 5
Frustrifera. Rami teretes, pubes flavis hirti. Folia petiolata, bipollicaria, ovato-oblonga, attenu-
ta, inaequaliter serrata, 5que nervia, peti stellati supra in nervis flavascentibus: Petiol.
Pedunculi et Calyces. ~~exterior~~ flavo hirti. Pedunculi pollicares, solitarii
axillares, uniflori. Calyx exterior 12 phyllis: foliola linearia, calyce interior
brevisiore: interioris lacinae ovatae. Corolla pollicaris, pubesca. Stylus
longior
an Aichmanis species

Elegans Habitus

Habitus

Herb. Thonini

Caulis crispis pinnis asperis, hirsutus. Folio petiole lato, trijollitana, cordata,
subangulata, dentata, venosa, supra villosa, subtus tomentosa, incana. Stylis
setaceis

Microfus Abisus

ait.

Habitat in Carolina herb. Desg.

Caulis herbaceus, glaber, teres, glauco-purpurascens, teris. Folia petiolata, sive
peltata: laciniis lanceolata, attenuata, remote serrata, glabra, subtus venosa,
glauca. Stipulae flavae. Pedunculi axillares, folio parum breviores, uniflori.
Petiolo crassiores. Flores magni. Calyx exterior 12 phyllis, interior parum brevis
ov: foliolis linear-lanceolatis: interioribus laciniis ovato, attenuato, acuta

Scaber Hibiscus

Habitat in Carolina herb. Desfont.

Caulis erectus; teres, a spinulis 2-3 radiatis scaber, villis stellatis subinanescentibus.
Folia petiolata, inferiora 5que partita, lacina lanceolata, extus versus dilatata obtuseque dentata, intermedia pollicari, lateralium breviora, suprema linearia, pollicaria indivisa, omnia uti caulis caulibus similibus scabra.
Pediculis unguiculatis. Sepala subulata. Pedunculi axillares, solitarii uti calycis hispidi. Calyx exterior anacophyllus, longitudine interiori: foliola linearia, interne versus appendiculata: interiori lacina ovata.
Corolla tri-pollicari hirta.

humilis Helicium

Habitat in Angala St Thome America herb Desfont 5

Erutex spithameus vel semipedalis, erectus, paucis ramosis, glaber, cortice cinereo, rami angulati triquetri flexuosi. Folia pedicelata, vix semipollicaria, oblonga, integerrima, mucronata, trinervia, avenia, utrinque glabra. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, folio longiores, compressi, per se triquetri, crassiores. Calyx exterior nullus vel deciduus; interior glaber, profunde 5quefidus. Lacinie lanceolatae. Corolla pollicaris. Capsula vix magnitudine pisi. Semina lanata.

An H. populifolius Calyx deciduus

Nerisius Helipus

Helipus virginicus Walth

Habitat in Carolina Herb. Acad.

Caulis herbaceus. Folia glabra, hastata, lobis intermediis elongatis, lanceolatis
laterales ovata, attenuata, serrulata, subtripollicaria. Stipulae subulatae
Pedunculi petioli breviores. Calyx exterior 11phyllus. Sepala subulata
interiora laciniata ovata, nervis, acuminata, exteriora glabra. inter femora
si. Flores magni

asper Herbifer

Habitat in America septentrionali herb. Puch.

Herbacius. Ramis teretes, villosi, incani, asperi. Folia petiolata, bipollicaria,
subcordato-ovata, basi utraque lobo subcordata, attenuata, inaequaliter obtuse
ferrata, subsensu, villis stellatis aspera. Stipulae fetucae. Pedunculi axil-
lares et terminales, longitudine folii. Calyx exterior 5-phyllus: foliola
linearia: lacina interiori lanceolata. Capsula sive conus, monosperma
Semina glabra
ar virginicus

Subulopus Hirsutus

Habitat herb. Guss.

Caulis crassus, in penna asperius, incanus et ad apicem pilis longis exstantibus.
Folia bis. In pollicaria, acuta, obscure angulata, inaequaliter crenata, in
triangula villosa, subter mollia, incana, 7 nervia. Petioli pilosi, suprema corda
ta, ovata, minime hastata. Stipula setacea. Pedunculi semi pollicares,
crassi

calyphyllus Habifcus

Habitat herb. Ausp.

Rami glabri. Folia si abriuscula, supra glabra, subtus pilis rarissimis, venosa, crenis mucronata. Stipulae semipollicares, angustissimae. Petioli villosi, Peduncululi unguiculati. Calycis laciniis in setam attenuatis.

negosus - Habrosus

Habitat ad Senegal herb. Aust.

Caulis suffruticosus; Rami subtriquetri, subreflexi, anguli obtusi villosi ca-
nescentes. Folia petiolata, semipollicaria cordata, acuta, crenulata, villosa,
subtomentosa, supra, pubescentia, subtus venosa incana. Stipulae lineari angu-
latis. Petioli longitudine foliorum. Pedunculi axillares, solitarii
uniflori, longitudine petiolorum. Calyx tomentosus, parvis, et distinctis
lineamentis longitudine interioris: lacinis interioribus ovatis, trinerviis. Cap-
sula eque, triquetra, dorso convexa, rugosa, spermatophora. Semen oblongum
laeve

Senegalenfis Herbifera

Habitat ad Senegal herb. Guisf.

villosa tomentosis. Caulis superne glabrescens. Folium pollicaria, petiolata,
inæqualiter acuta crenata, subtus incana, subvenosa. Stipula unguis u
lares, setaceo. Pedunculis foliariis, cum ramo unifloro petiolo brevior

acuminatus Hübnerus

Habitat ⁱⁿ herb. Turp.

Caulis e villis stellatis inanis, teres. Folia 2-3 pollicaria, cordata, attenuata, adrosam lobo utrinque parvo acuto acuta crenata. ~~Stipula fetacea,~~
utrinque submollia e villis stellatis, subnervosa, subvenosa. ~~Stipula~~
fetacea. Petioli pollicares, uniflori. Capsula hispida.

micans Herbifer

Habitat herb. Rusf.

Folia tri-pollucaria: lobi ovati, supra minus villosi, interspersi stellis e pulis parum
longioribus, subtus cinerea nitentia, mollissima, 7-9 nervia, inaequaliter pro-
se et acute serrata. Calycis interioris laciniis ovatis, obscure tri-nerviis

palmatus Hibernicus

Habitat herb. Guoj.

Folia quadripollicaria: Cili oblongi ex utroque remota obtuse serrati, obtusi,
senosi, intermedium tripollicari: laterales breviores, subtus obscure
senosa.

Spicatus Habscar

Habitat herb. Tusc.

Cauli retrose pilosus, ~~sp.~~ superne copiosior, ut petioli hirti. Solca bipollu-
ria, utrinque scabra, pilis densis, rugata: lobi ovati obtusi. Sepala lineari-
lanicolata. Ovaria axillares, superne in spica 3-4 pollicari. Calycis his-
pidissimi incani.

~~18~~

columnaris Halimifolius

Habitat herb. Fusf.

rami teretes, superne pulverulento incani. Folia quinque nervia, bipollicina,
venis pime venosa, subtus villosa, vixi canescentia, adata supra glabra. lobi
obtusif. Calycis interioris laciniis ovato, obtusif. Petala dimidia parte longi
tudinaliter ^{homocotyle} villosa, dimidia parte teneriora, pilis sparsis gemeratis nitentibus

Virginiae 4 foliis inferioribus cordatis acuminatis serratis:
superioribus hastatis Lin. Sp. pl. 981 + Jacq. Coll. 1. p. 123
Alcea f. ~~Bamia americana~~, parva flore, petalis rotundioribus
Planch. 6. f. 4.

Habitat in Virginia paludosis, siccis &
asper. villosa tomentosa. Folia cordata, attenuata, inaequali-
ter serrata. Pedunculi multiflori. Corolla radiis 5que hirsuta
in 4. asper villosa et minor herb. Rich.

Tiliaceae # foliis cordatis subrotundis indivisis acuminatis crenatis,

Paran: desj. Caule arboreo, calyce extenore decemdentato Lin. V. p. 624
page 51. no. tab. Len. fl. rayl. 2594
55 fig. 1.

Panti J. Tali-panti Rheed. mal. 1. p. 53. t. 30

Alcea indica Finlayson, flore luteo malvaceo Plukin. amalt.
6. p. 355. fig. 5.

Malva arborea Mantzonia, folio subrotundo minore, cili-
minuto, subtus candido, cortice infusis ductili Sloan.

Publius incanus hes. 1. p. 215. t. 134. fig. 4.

Stipulis oblongis Novella Rumph. amb. 2. p. 218. t. 73.

calyce extenore Habitata in Andria & cicatrinata
decemfidio Ramis teretes inferne glabra superne tomentosa incanis. Foli-

ketmici amplius petiolata sparsa venosa diametro tripollicem acuminata
fimo folio cor supra glabra subtus incano tomentosa 7 nerva glan-
siformi; glandula in nervo intermedio subtus. Petioli longitudine

vario Plum. fere folii incani. Stipulae semian-plexicaulis oblongae
obtusae membranaceae extus subpubescenti pollicem

Plum. 4 con. Pedunculi axillares solitarii incani uniflori
credito

Calyx ^{incanus} laciniis calycis extenoris et interion lanceolato
extenore extenore ^{nanum bene} americana utique gaudet foliis crenatis ac 4nd. Orient.

glaber
Linné 4. ^{glaber} foliis ovalibus trilobis, pedunculis solitariis articulatis unifloris, caule herbaceo
Scopol. Dal. inf. 3. p. 33. V. 17

Lept. aspo Pav

pentacarpos 4 foliis inferioribus cordatis angulatis: superioribus
subhastatis, floribus subnatis, pistillo cernuo Lin. Spec. pl.
pag. 98. t. 1. p. 150

Hedmia palustris minor, folio angusto, flore parvo purpureo, ^{basif.}
fructu depresso pentagono Linnich. venet. 155. t. 91.
Habitat in paludosi Venetia 4

Caulis superne pubescenti canescens folia petiolata ^{basif.} subcordata
ovata triloba basi ovata intermedio productione gemma
utrinque oculis armato pallato pubescentia ovata glabrescens
subnatis sesqui polliciana acuta obtusa ^{basif.} s. nervia
subtus pallidior. Stipula parva setacea

Pedunculati

folia breviora

Calycis canescens extenor diaphyllus foliolis linearibus longi-
tudine fere interiori: interior profunde s. quefidus laciniis
ovato lanceolatis. Corolla magnitudine Hibisci phoenicea

Hibiscus pentacarpos caule annuo glaberrimo foliis cordatis
subhastatis acuminatis serratis floribus subnatis
Caran. des. pag. 145. tab. 66. fig. 2

subcordatis
Hibiscus purpureus L. Thales

militaris H. foliis hastatis serratis attenuatis, ^{glabris} petalis bifidis Cavan
Desf. pag. 352. Tab 190. fig. 2

Habitat in Louisiana 5

Caules teretes, simpliciflori teretiales, uti tota planta glabri
Folia petiolata, subcordata. Stipula subulata arcuata &
pedunculata axillares et terminales crispae. Cal. exterior
12. 16 folioli lanceolatis interior longior lobis unis squarosis
vix. Corolla purpurea Cavan.

non vidi

hastata *Al-* folis lanceolato hastatis serratis, capsulas ^{glabris} tomentosis
Alcea maderapatana hastatis folis glabris, pericarpio tantum
velloso Pluken. tab 117 fig. 1

Hibiscus hastatus folis hastatis serratis glabris, floribus magnis
solitariis, fructu parvo tomentoso Cavan. Diss. pag 194. tab. 30 fig. 1.

Habitat.

Caulis subtomentosus. Folia bidentata petiolata. Stipulae capillares
peduncululi superne, axillares solitarii longi. Calyx 4 exteriore foliolo
o. linearifidulatis interiora parum minor laciniis attenuatis. Cor-
pallians. Caps. globosa.

acuminatus. H. Locus cordatus attenuatus serratis tomentosis inferioribus subtilibus
Capsulis pentagonis
Alcea indica frutescens hastato folio etc: pentagone compacta duro
ex squae cellulari totidem semina acutidentis Pluchalm. 13. Phyt.

Tab 7. fig. 1

Hibiscus acuminatus caule tomentoso, foliis cordatis acuminatis
subrotundis acuminatis, fructu pentagono tomentoso depresso
Cavan. Desf. par. 144. Tab. 50. fig. 2

Habitat

Caulis, uti tota planta tomentosus, teres. Stipula subulata, pedunculata
et axillares solitariae per pollicem. Cal. exterior 7. & phyllis
folioli linearibus angustis acutis. interior paulo longior lacina
attenuati. Capsula depressa. Semina glabra

Atheopiceus fl. foliis subcuneatis subtridentatis: summis oppositis,
floribus terminalibus Lin. Mant. 250. P. V. p. 631.

Alcea vesicaria foliis *Atheopicea* morphum redolens; foliis
summo margine crenato Plukh. alm. 13. t. 254. fig. 2.

Habitat ad C. b. p. ei 5

fl. bifidi ovatis, foliis ovatis integerrimis ciliatis trinerviis subtus
vellosi, floribus axillaribus solitariis, pedunculis foliis brevibus
Cavan. disp. pag. 143 tab. 50 fig. 3.

Rami teretes villosi. folia petiolata oblonga subcuneata summa
quicquidiana vel pollicaria tridentata, trinervia papilionaria
subtus frequentioribus nupentibus subciliatis petioli
inquinata et stipula setacea Calyx foliolis 10 pubulatis
interno brevioribus interno lacini lanceolatis hirsutis

trinerviis villosi

rigidus. Hilpin. foliis cordatis ^{lobis pinnatis} ~~in~~ ⁱⁿaequaliter crenato-dentatis
calycibus extenuatis ⁵fidis laciniis ovatis
Habitat in India orientali Robles

populneus H. foliis cordatis integerrimis caule arboreo Lin. fl. def.

2584

Buranti Rheed. mal. t. p. 51. t. 29.

Novela Littorea Bumph. amb. 2. p. 224. V. 74.

Habitabit India

Rami teretes purpurascens superne pubescentes.

Folia petiolo 4a fere palmata attenuata ^{vel 7.} 5 nervis

utroque glabra oculis ambo utraque adpersa punctis
^{subpunctis} ~~subpunctis~~ albidis praesertim subtus vix venosa. petioli

li f. 3 pollicari. Stipula lanceolata. Calyx exteri
or foliolis 3bus lineari cuneatis concavi. interior pauca

minor coriaceus obsolete 5que dentatus. Corolla
4 pollicari extus pubescens. Capsula orbiculata

compressa glabra intus diuro 5que trilocari loculi
polypermi

fl. populneus caule arboreo, foliis cordatis acuminatis
integerrimis glabris, calyce exteriori triplyllo
deciduo Bavan. des. pag. 152. tab. 56. fig. 1.

glabris

mei ranthus # foliis subrotundis integris serratis, corollis reflexis obli-
quis, Lin. Suppl. pag. 368. L.V. 628. Caron. de J. p. 154. Tab 66

Habitat in India orientali O

caulis plures teretes foliis subtus pilosa. foliola calycis
externis 7. petalis. Capsula subrotunda. Semina Caruigi
rosa

rhombifolius H. foliis rhomboidalebus ext. orisum crenatis Cavan. Des.
pag. 156. tab. 69. fig. 3.

Habitat in India orientali.

Caulis frutescens glaber, uti tota planta. Folia petiolata
petiolo duplo longiora trinervi. pedunculi axillares solita
ni breves. Calyx extenor folioli 7. lineariibus longitudine
intenor interior lacunosus Cavan.

retusus fl. foliis oblongis retusis ^{extropum peratis} apice dentatis subtus margine que
velosis, floribus axillaribus terminalibusque.
Habitus Æthiopiæ caule fruticoso minimo: foliis ovato retusis
apice dentatis, floribus axillaribus terminalibus
Pursh. Disp. pag 149. tab. 61. fig. 1

Habitat in Cap. b. p. 17.
Indes maxime affinis fl. Æthiopiæ. Rami villosi floside canescentes
Folia petiolata alterna supra opposita, semipollicaria
vel minora extropum utrinque dentibus tubis obscure truncata
avenis margine villosa supra glabra. Stipula linearis villosa
pedunculi solitarii Calyx exterior 5-9 phyllis foliolorum linearis
margine villosa uterque brevioribus. Lacinia interiori lacina
lata ciliata. Corolla calycis duplo major. Capsula globosa
loculis 1-2-3 spermiis

negunda ~~4~~ suffruticosus, hispidus, ramis simplicibus, foliis oblongis serratis,
limbo cœvula reflexo, seminibus lanatis. Len. suppl. p. 310. f. v
neg. 629

Habitat in graminosis Zeylone 5
~~suffruticosus~~. Ramuli limbi simplicissimi nigri. folia per
sa. stipula setacea. pedunculis axillaribus. Len

3-4. microphyllus Hibiscus ^{Hibiscus} foliis ovalibus ^{hirsutis} ^{antheris} ~~concoloribus~~ ^{exterioribus} sematis, caule fuscioso
Hibiscus flavus; floribus decandris; foliis petiolatis, ovalibus, sematis, obtusis,
tabris tabris defr. pag. 126.

Cortex ramis junioribus; hirsutus foliis calycibusque hirsutis, pilis stellatis
folia petiolata, ovalia, subrotunda, semiunguicularia, a medio marginis
serrata, acuta, subquaque nervia, subtus magis hirsuta.

petioli foliis longiores. stipula minutae, setosae.

pedunculi axillares, solitarii, longitudine foliorum, versus apicem geniculi
cati, craspires.

calyx exterior 10 phyllis: interior foliolis setosis: interior ~~longior~~ interior pentaphyllus: foliolis lanceolatis, exteriori brevior

unilateralis H. foliis ovatis acutis mollibus serratis, anthero ad alterum
Catus tubi: stamuum Cavan-dus. pag. 15. D. tab. 87. fig. F. e.

~~Habitat in sylvis Inf. H. Dominici~~

Nedmea frutescens monifolia, flore purpureo Plum. i. 160. fig. 1.

~~Habitat in sylvis Inf. H. Dominici~~

Caules fruticosus ramosis. folia attenuata sesqui polliciana
vnde abbreviata. Pedunculi axillares solitarii. Calyx ex-
tenor foliolis 9. linear-acutis longitudine internodi. Corol-
la coriacea polliciana. Caps. membranacea fassa rotunda
magnitudine nucis arellano sive striata Cavan.
anthero tantum ad alterum latus Columna filamentum

non vidi

Rosa sinensis H. foliis ovatis acuminatis serratis, caule arboreo
Linn. fl. reyl. 2604 Cavan. Duf. p. 150. Tab. 69. fig. 2

Scherer-panti Rheed. mal. 2. p. 25. v. 16.

Alcea javanica arborescens, flore pleno rubicundo Breyer
cent. 121. v. 56.

Deos festivalis Rumph. amb. 4. p. 24. v. 3.

Habitat in India

Rami teretes glabri apice pubescenti. folia 2-3 pollicia
na basin versus integerrima, glabra, attenuata trinervi
na tenuissime venosa petioli pollicares pubescenti
state glabri, stipulae setae semurquiculatae, pedun
culi axillares solitarii longitudine petiolo longiore uni
flori. Calyx ^{subpeltatus} extensus folioli setae lanceolati in tenor
campanulatus lacini ovati acuti extensus duplo
longior. Corolla tripollicaria. Genitalia corollae
longiora

attenuatis glabris

cordifolius H. arboreus, tomentosus, foliis cordatis ovatis serratis, flori-
bus pedunculatis terminalibus, calyce polyphylo lineari ob-
longo Lin. Suppl. p. 309. V. p. 629
Habitat in America meridionali 5

non vid.

Capoiarpos. *H. foliis ovatis oblongis attenuatis obtuse serratis tomentosis subtus*
in Panis

H. biflorus Capoiarpos. *Folium ovato lanceolatis magnis cretato*
serratis tomentosis subtus lanis, capsula ovato-acuminata
setosa Caran. *duf. pag. 159. tab. 170 fig. 1.*

Habitat

Caulis fruticosus. Solica longe petiolata, acuta 4-5 polliciana
5que nervii. Pedunculi axillares solitarii crasse vix polli-
cari. Petioli longitudo ne foliorum. Calyx exterior folio
12-13. lineabus longi ciliati, interior longior lanceusova
tri-ternervii. Capsula ovata conica, setis nupercantibus
teuta. loculi polypermii Caran

guianaensis H. foliis ovato-oblongis denticulatis, capsulis alveolatis, aculeis
recurvis Aubl. fl. gu. 2. p. 700

• Habitat in Guiana

non vid.

Sorarius A foliis cordatis crenatis scabris, calycibus et Venionibus
retibus apice dilatatis Lin. Suppl. p. 311. t. V. p. 620
Habitat in Surinamo

~~nona etiam s. d. n. p. s.~~ non vid.

tomentosus ^{subrotundis}
Senegalenfis 94 Folius cordatis subangulatis tomentosis ciliatis stipulis utriusque geminis

Habitat in Senegal. Folius cordatis subangulatis tomentosus: calycis umbrato interno breviori externo cancellato. Pavan. Desf. pag. 160 tab. 60. fig. 1.

Habitat in Senegal.

Planta valde tomentosa. Caulis teres ramosus. Folia longe petiolata cordata sive renata stipula subulata utraque basi. Pedunculis axillaribus solitariis. Calyx exterior foliolis 10 lineariibus annatis exterioribus cancellatis interno lacini lanceolatis trifidis intus glabris. Corolla calycis parum major. Pavan.

non vidi.

unus H. Tomentosi, foliis reniformibus crenatis, calycibus lanatis
Lin. suppl. p. 309. & V. pag. 620. Cavan. Desf. pag. 161. 167-171
Habitat ad Cap. b. p. ei 4

Ceviter ^{unus} Rami et petioli Tomentosi uneres flarescente. -4
Folia petiolata alterna, diametro ^{trans} versali 3 pollicia
in dimidio longiora fere ^{et} nerva ^{venata} petioli ^{sub} pediculis
caute nudis ^{subtus} villosa ^{et} tomentosa ^{et} lanata, petioli
sape foliis 3-4plo longiora. Calycis praesertim exterior
tomentoso lanatus sed de albicante exterior 12 profunde
12 partibus laciniis linearibus lanceolatis. interior 2 plo
longior campanulatus membranaceus ^{et} squamulosis
senosus. Corolla calycis parva brevior ^{et} purpurea ^{et} extus
villosa. Stamina brevia. Capsula parva subglobosa
acuminata tomentosa loculis 5 per me semina glabra

- Corolla longioribus

Semigenes. *Q.* caule tomentoso ferrugineo, foliis cordatis oblongis obtusis
basi dilatatis, scabris. Cavan. *duj.* pag. 162. tab. 60 fig. 1.

Habitat in Madagascaria

Caulis ramosus, uti tota planta interdum, tomento brevi ferrugi-
neo tectus. Folia petiolata, longitudine petiolorum.

Dentata glabrescentia medio sinu subangustata. Stipula
subulata. Pedunculi axillares solitarii, petiolo longis-
sime. Calyx exteri 10 phyllis foliolis linearibus interior
longior. Corolla calycis duplo longior Cavan.

non id.

moscheutos: fl. foliis ovatis acuminatis serratis, caule simplicissimo
petioli floriferi &c

Altera rosea peregrina, forte rosea moscheutos Plinii Corn.
canad. 144. & 145. Monf. herb. 2. p. 532. f. 5. v. 19. fig. 6.

Habitat in Africa &

folia sub tub. albicantia

Folia s. pithamou, ovata-oblonga, attenuata sementosa, mollis-
sima, remote obtuse serrata, basi integerrima, utrinque incana

Calycis exterioris foliola linearis-lanceolata, interiori breviora
lacina interioris oblonga, acuminata. Calyx pollicaris

Corolla pollicaris herb. 4. 5.

Aliam ^{ubi gaudet} ~~mutam~~ forte diversam in eodem herb

Rami crassitie penna cygneae pulverulenta subulosa. Folia tri-
pollicaria, attenuata, superiora 3que nervis subtiliora, obtusa
et inaequaliter serrata, subtus incana, pubescentia, basi integer-
rima. Pedunculus, petiolo ramum adnatus, tri-pollicaris, uni-
florus. Calyx exterior ulloque

~~novandi~~

calyx 4 foliis cordatis subrotundis integris; pedunculis brevissimis uni-
floris, calyce decemdentato Sw. prodr. p. 102.
Malva arborea Sloan herb. 1. 95. t. 134. fig. 2. 3.

Habitat in Jamaica

Solia diametro longitudinali pithamso, transversali majori
supra glabra subgreminearum dentato subrepanda.
Calyx 4 interior utraque hirsutus. Petala 4 pollinaria extus
tomentosa basi pilis longis confecti ciliata supra ad peris-
pilis rarioribus.

Depressa M. floribus solidariis, capsulis depressis pentagonis: angulis obtu-
se ciliatis Lin. S. V.
Abutilon americanum, nivesi foliis, flore carneo, fructu pen-
tagono apert. Mill. Diet. 8. 3. fig. 2.
Habitat Havano

Hibisci species est

tubulosus

H. Lupinus; foliis cordatis angulatis ~~crassis~~ ^{recurvis} tomentosis; caly-
cibus extentionibus spatulatis, stipulis utraque Verni

~~Habitus parviformis, foliis~~

Habitus tubulosus, caule frutescente hispido, foliis cordatis
angulatis crassis tomentosis, floribus solitariis, calycis ex-
tensionibus spatulatis recurvis Cavan. Diss. p. 161.
Tab. 60 fig. 2.

Habitat in India orientali et Senegal. 5

Caulis teris hirsuto tomentosus ut tota planta, erectus
4-5 pedalis. Folio petiolata inaequaliter dentata supero
in pubescente. Stipula subulata. Pedunculi axillares
solitarii ut pollicares Calyx exterior foliolis sub 9.
Conclapane basi connatis. interior longior tubulosus Capsula ovata
hispida. Semina tomentosa nivescentia Cavan.

non vidi

^{ullopis}
ullopis H. ~~puberula~~ foliis angulatis serratis caule herbaceo.

Habitat in Anthe Torphäl

Tota planta vili griseo adspersa. Folia adulescentia supra glaberrima ^{molliora} ~~ultra~~
tor- angulata lobis ovatis subsqualiter grosse serratis. Stipulae
^{upulatae} ~~petiolae~~ Pedunculi axillares solitarii sesquipedales.
Calyx exterior foliis subulatis longitudine interiori

micans H. foliis cordatis serrulatis tomento lucido calycis exteriore semper
tubo involuto tomentosi nervosi ^{semitibus papillaribus} Cavan. Dis. pag. 167. Tab. 70. fig. 2.

Habitat in Java

^{Agnes} Capsula albedo tomentosa ram. Sola petioli breviora latiora quam
longe serrata lobis attenuatis stipula crata-lanceolata
Flores axillares solitarii pedunculis petiolo longior - Calycis
tomentosi laciniis exteriore crata-lanceolata intercor globo
so pentagonis angulis compressis Corolla magna sulphureo rubra
Capsula subovata villosa loculis polyspermis Cavan.

vitifolius 4 foliis quadrangularibus acutis serratis, caule ineromni,
floribus cernuis Hen. Mart. Flor. zeyl. n. 2657

Natou - Beloesen Rheid-mal. 6. p. 74. T. 46.

Althoa indica, vitifolia, flore amplo flavo pendente Heron
Lugd. 26. T. 20.

Habitat in India O

Caule tereti, tripedali, crassitie digiti molliter pubescenti. tomentosi
superioris. Folia cordata latitudine et longitudine
aequalia, 5 angulata, sive nervia serrata utraque
molli. Stipulae petiolo, petioli longitudine foliorum. Pedun-
culi axillares solitarii geniculati, iniani, petiolo pan-
longior, deflexo mutantibus. Cal. 5 tenor 12 phyllis
folioli linearibus angustissimis interioribus brevioribus. exterior
caeteris crassitie tomentosi tenuioribus Corolla flava fundo
purpureo. Capsula hispida calyce breviori globosa membra-
niis sive cincta. loculis tetra-permi

Herbifer vitifolius caule herbaceo, foliis 5 angulatis crenatis
vellopi floribus solitariis cernuis, capsula pentaptera
Cavan. Dist. Naz. 145 tab. 50. fig. 2

Clypeatus 4 foliis cordatis angulatis, capsulis turbinatis truncatis hirsutis
D. S. V.

Hedysma amplissimo folio angulato, capsulis truncatis hirsutis
Plum. Jacq. 3. T. 160 fig. 2.

Sloan bot. 1. p. 216. T. 135. fig. 1.

Habitat in America ~~et~~ ^(Caran) (Caulis arborum)

Stem: Caulis ramosus 15-30 pedales (Stem) teretes in aeni
Solea petiolata spithamba. 7 nervosa inaequaliter
dentata: Colo intermedio attenuata utraque

mollissima subtus inaequaliter poro nulla obferre
venosa. Stipulae lineari angustissimae ^{uniguiculae} ^{in ambis} ^{exteriori} ^{stipula}

Petiolis 3-5 pedali axillari longitudine petioli calyx 5 partibus

Corolla parum inaequaliter lobata lacini lineari lanceolatis
tarsi, tubus stam. profunde ¹⁰ ^{aque} ^{partibus} lacini lineari lanceolatis
num apice recurvi ^{interiore} ^{brevioribus} ^{exterioribus} ^{ovatis} ^{aeque}

Petalum cum a nervis. Corolla calycis duplo longior extus

Cocteni parum
residua quasi pubescent

at tubos staminum
determinato prope ^{Michxand} angulato sublobati inaequaliter den-
tatis utraque mollissimi

mutabili fl. foliis cordato-quinqueangulatis obsolete serratis, caule
arboreo

Rosa sinensis Bern: flor. cult. 493. 497.

Hina parti Rheed. mal. 6. p. 66. t. 38. 39. 40. 41.

Althoea arborea rosa sinensis Monj. hist. 2. p. 530. f. 5. 7. 10

fig. 2.

Ros. horarius Rumph. amb. 4. p. 22. 8. 9.

Habitat in India 3

Rami teretes superne molliter ~~vel~~ pubescenti ferrugineis.

Folia petiolata alterna 5loba lobis ovatis attenuatis
propositum intermedium denta basi subcordata

supra scaberrima hinc nervi incanis subter ma. & pubescenti
fimo canescentia & que nervia abs nervi eglandulosis

petioli longitudine fere foliorum incanis. Pediculi
lineares angustissimi vix unguiculares. Pedunculi

petiolo breviori uniflori glase ferdide flavescentes

Calyx exterior foliolis 5 linearibus lanceolatis interior dimi
dio brevior interior ^{coarctatus} ovatis lanceolatis uti exterior ferdide
utroque incanis subtrinervis. Corolla diametro

4 pollicari maxime nivea, mendie dilute incarnata ~~rosee~~

rosee folia cum sole occidua

fructus subrotatus globosus ~~infructus~~ villosus calycis minor

Herb. mutabile caule arboreo foliis cordatis quinque angulatis, acuminibus
protrusis acutis fructu oblongo obovato nigro Cavan. Desf.
raz. 165. t. 62. fig. 1.

mutabile ^{dentatis} H. foliis subcordatis squangulatis sublobatis lobis ~~attenuatis~~
subtus scabris molleffimis lobis ang. attenuatis

calyphyllus. fl. foliis cordatis crenatis subtus lobis calycibus exterioribus interioribus
longioribus lanceolatis attenuatis

Habitat calyphyllus foliis cordatis crenatis lobis subtus lobis: ca
lycum exterioribus foliis maximo. Cavan. Desf. pag 203 - tab 140.

Habitat in Triplici Boston

Rami sulcati. Folia longitudine per columnam pollicis 3 lata, squa
renna. Stipula subulata pollicares pedunculata axilla res
brensium. Calycis monophylli. exterioris lacinae pollicares
nervosa, interior coloratis lacinae unanervi. Cavan

non ord.

Saginoides L. foliis oppositis linearibus corvibus, pedunculis solitariis longissimis
floribus pentandris caule repente N. Act. Holm. 1789. p. 44.
Tab. 1. fig. 2.

Habitat in Alpibus Norveg. et Suec.

phoeniceus ~~4~~ foliis ovatis acuminatis serratis, pedunculis articula-
tis supra articulos incrassatis, ~~calycibus~~ ^{calycibus} longioribus; calycibus nudis
Semine lanato den. Suppl. pag. 624.

Hibiscus phoeniceus Gaertn. bot. 3. t. 14

Habitat in Ceylona $\frac{1}{2}$

Ramiter ter glaberrima subpubescente alternis. Cilia
reticulata pollicaria remota ^{interdum variis} obscure sinuata glabra
vel pilis rarissimis adspersa. stipulae setosae rigidiuscula.
petioli unguiculati. Pedunculi filiformes solitarii rari
ut gemini superne gemiculati. Calyx exterior 6-9 phyllis
eandem partem longioribus subulatis interior lacini lanceo-
latis oculo armato pilis raris: Corolla calycis duplo longior
semine nuda.

Hibiscus hirtus caule herbaceo, foliis ovatis lanceolatis acumina-
tis serratis, calycem extenso longior polyphylo, flentibus
solitariis rubris Caran. des. 146. tab. 57. fig. 3

phoeniceus foliis ovatis attenuatis serratis, pedunculis foliis longioribus
supra articulos ~~gemulatis~~ ^{gemulatis} incrassatis seminibus

Hib. hirtus ed. 13. Hib. phoeniceus Gaertn. diversa a Phoenice. in Suppl.

palustris 4 caule herbaceo simplicissimo, foliis ovatis subtrilobis subtus

Tomentosis, floribus axillaribus Lin. Spec. pl. pag. 9764 ^{Bartram}
^{def. no. 182. tab. 85. fig. 2.}
Althaea hor tensis perennans Dod. pemptid. 655.

Althaea palustris Bauh. pin. 316.

Habitat in Virginia, Canada &

Plata. tab. 6. fig. 2.

Caulis simpliciter fistulosus 4 pedales. ^{max} Folia petiolo

tertiato ovato oblonga integra vel extrorsum subtriloba
supra glabra subtus mollissima mucosa, obtuse serrata
sub attenuata obscure renosa palmata et ultra
acuta. Stipula subulata petioli bi ad 4 pollicares.

Stemunculi axillares solitarii uniflori petiolo paulo
longiores superne geniculati supra geniculum cernosi

calyx interior folioli 10 lanceolatis subulatis
si ovatis interior parum longior laciniis ovatis

Corolla magna luteo albicans genitalia corolla brevior
triplo brevior

foliis ovato-oblongis integris subtrilobis obtuse serratis
subtus mollissimis

^{Hibiscus}
C. Candefrenus caule vixato hirsuto fructu obo: foliis ovato-acuti sublobis
floribus minutis clausis Cav. ii: 1. p. 1. Tab. 2.
Habitat in Senegal 5

non vid.

mem membranaceo. H. foliis cordato-oblongis attenuatis obscure dentatis subtomen-
tosi, membrana compressa interdum fere calycis interioris
Hibiscus membranaceus, foliis cordatis, oblongo-acuminatis obsolete
dentatis: calycem interno tubuloso magno: membranisque
infructu Cavan. Desf. pag. 159. tab. 57. fig. 2.

Habitat

Caulis arboris, ramis subtomentosi. Folia 4-5 pollicaria
obscure ^{base vix} lobata. Stipula parva linearis. Pediculi
axillares petiolo longioribus gemulato. Calyx exterior
foliolo 10 linearibus basi connatis interiore quadruplo breviori-
bus. interior magnus, fere tubuloso-campanulatus squa-
partibus lacini lanceolato-ovatis acuminatis 5nerviis
Corolla calycis major subionicea extra villosa flavescens
Capsula ovata villosa loculis polyspermi Cav. n

non vidi