

Hebicus

~~Hebicus~~

mundatus Hibiscus foliis cordatis 3-5 sublobatis crenatis villosis subtis hirsutis
caule aspero, calycibus capsulisque hirsutis

Habitat in Guinea Thonning.

Caulis suffruticosus, villosus, ex. atornis trispinosus asper. Folia obsolete
3-5 lobata, eglandulosa. Stipula subulata. Pediculi axillares, solitarii
geniculi articulati, longitudine petioli. Calyx extenor 9-10 phyllis: foliis
la subulata; intenor campanulata. Corolla flava, fundo atropur-
purea. Capsula subrotunda, obtusa, quinqueangularis, angulis promi-
nentibus, quinque locularis Thonning. Semina nuda Thonning

nope Domingens. colloicata

Spathulatus Hibiscus recurvato-aculeatus, foliis indivisis trifidisque serratis, calycibus appendiculatis, stipulis oblongis ciliatis.

Habitat in Guinea Geert

Caulis herbaceus, erectus, ramosus, sex crassitie pennae columbinae, pilosus; internodi et pedunculi adpersus aculeis minutis. Sola petiolata, alia subior data vix pollicaria, alia trifida; lobis ovatis acutis, venae rare pilosae.

Petiolus capillaris, longitudine folii. Stipula parva, pilis longis raris ciliata.

Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, longitudine folii. Calyx exterior 10 phyllis: foliola spathulata, patentia, acuta; lamina oblonga; foliolum filiforme ad basin laminae, erectum. Calyx interior hispidus, dimidiatus. Corolla vix magnitudine H. Trioni

arenarius Hibiscus foliis ovatis serratis, pedunculis axillaribus folio brevioribus,
ramis scabris

Habitat in Guinea 4 ped 5

Caulis finitimosus, ramosus, staberimus; adspersus villis minutis stellatis:
rami vix crassitate pennae columbinae. Folia petiolata, pollicaria, ovata,
acuta, inequaliter serrata, scabiuscula, villosula, cinereo-virescentia.

Stipulae setacea. Pedunculi axillares, solitarii vel gemini folio
breviores, uniflori, geniculati. Calycis foliola exteriora 6? setacea, longi-
tudine interiori. Papula globosa, magnitudine pisi, glabra, lucida.

Semina lanata.

affinis H. clandestinis

gemellus — Hibiscus foliis ovatis trilobisque glabris, pedunculis axillaribus ter
minalibusque, calycibus interioribus truncatis

Habitat Suratte &

Rami teretes, glabri, purpurascetes, laeves. Folia petiolata, remota, 3-4
pollicaria, inferiora saepe subbiloba vel biloba, lobis brevibus sinu obtuso,
superiora triloba; lobis ovatis, attenuatis intermedio longioribus, superiora lance-
olata, subtus venosa, trinerviis. Stipula subtriloba, caduca, tomentosa.
Pedunculi superiores, solitarii, longitudine folii, biflori, juniores tomen-
tosi, adulescentes glabri. Calyx fl. populneus; interior dentibus saepe setaceis
brevibus, exterior deciduus. Corolla tomentosa.

herb. Hort. Haron

patent

Hibiscus foliis serratis inferioribus sive peltatis, superioribus oblongis,
calycibus exterioribus patentibus ibidem tubulatis elongatis.

Habitat Suratta

Caulis herbaceus, teres, lavis, superne setis aliquot adspersus, pallide viridis
Foliorum laciniis, ceteri folia superiora oblonga, basi versus integerrima,
supra glabra, subtus simpliciter venosa, setis raris triadatis flavis
adspersa. Stipula petalis. Pedunculi axillares, elongati, uniflori,
superne raris mucronatis hispidi. Calyx exterior radius 11,
resque pollicares, basi tuberculati, tuberculi setigeni: interior profunde
desquens; laciniis ovato lanceolatis, ceteris brevioribus, tri
vel sive nervis, pallide viridibus.

Herb. Hort. Haron

elatus Hibiscus foliis cordatis subrotundis integris; pedunculis brevis flos unius floris,
calyce decemdentato. Sw. prodr. pag. 102.

Malva arborea, folio rotundo, cortice inferius ductile, flore mucato maxi-
mo liliiaceo Sloan Hist. 1. pag. 215. Tab. 134. fig. 1. 2-3.

7 n montferat legit in Kyon;

Folia petiolata, spithamea, latiora quam longa, subrotunda, lobis basi
parallèles, obtuse angulata, subdentato repanda, supra viridia
punctis albis frequentibus & pilis minutis stellatis, novem nervia, sub-
tus pallida, pilis frequentioribus, profertim in venis

Pedunculus crassitie ^{tra} penna anserina tres

Calyx exterior 8 phyllis foliolorum oblongis, unguiculantibus obtusis reflexis
^{reptis} interior quinquifidus: laciniis ovatis, sesqui polliciantibus; acutiusculis,
quinque nervis

Petala octo cuneata, tri polliciana et parum ultra, nervosa, extus villosa
interiore basi valde crassa.

Staminum columna longitudine corollae

acutifolius Gibberus foliis indivisi trilobisque rapando dentatis basi subtransversis.
subtus villosis

Habitat in India orientali 5

Rami veretes, glabri, superne sordide canescentes. Folia petiolata, bi 3. tri-poll.
cana, 3-5 nerva, attenuata, acuta, inversa basi ovata vel subor-
ovata, majora subtriloba basi transversim obtuse dentata; lobus inter-
medius longior, ^{lobatus} supra rure stellato-punctata, subtus subca-
nescentia, ^{scabrisse, pilis} stipulato & tomento. Pedunculi stellares, petiolo parum
longiores, incurvi, uti Calycis. Calyx exterior 10 phyllis, 7 folio tin-
canicolatis, interior, laciniis lanceolatis, intus tomentosus.

racemosus Hibiscus foliis ovatis acuminatis, floribus racemosis

Habitat Jamaica

Caulis aborescens, teres. Rami teretes, glabri.

Folia petiolata, ^{bipollicaria} patentissima, ~~—~~ glabra, supra atomis albis adpersa
integerrima, subtus pallidiora.

Petiol. vix pubescentes, sequipollicares.

Stipula subulata.

Racemus terminalis, erectus; Pedicelli pollicares, superne parum
crassiores, rigidi, basi bractea subulata.

Calix exterior ophyllus: foliolis lanceolatis, longior exterior foliolis
ovatis, acutis, exteriori parum longior, pubis minutis fere stellatis
uti exterior et peduncululi adpersis

Althoa racemosa Schw.

Parsonia Cavanillesi Jacq.

Abelmoschus ⁴ foliis subpeltato- cordatis septemangulatis serratis
caule hispido. Lin. fl. regl. 2617. Caran. bot. p. 167. tab 62.

² Alcea aegyptia villosa Bauh. pin. 317.

Alcea hispida, flore flavo, semine moschato Martyn. bot. 45
V. 45.

Cathu-gaffari Rhæd. mal. 2. p. 71. t. 30.

Granum moschatum Rumph. amb. 4. p. 30. t. 15.

Caulis pubes ^{hirsutus} Habitat in Indis ⁵
Foliis ^{hirsutis} profertim ^{lobis cordatis} caulibus hirsutis. folia longe petiolata, 5-7 lobata lobis
superne. Folia ^{vel} lato lanceolata dentata serrata intermedium longe reliquis
angulata ^{vel} quibus longior petiolo proximo cespitem resp. simpliciter venosi
ben: lobi ovati longior petiolo proximo cespitem resp. simpliciter venosi
attenuati, undi attenuati, utroque petioli. Petioli profertim apice
que dentati, hirsuti stipula linearis. foliola calycis exteri linearis
tri, fere pithamoi interior longior, longitudinaliter rumpenti. ^{fructu} Capsula
3 nervi. Pediculi ^{pyramidalis} 5 quadranguli hirsuti
petiolo parum ^{pyramidalis} 5 quadranguli hirsuti
adnati, petiolo ^{serratis}
brevior, resp. foliis 5-7 lobatis lobis ^{serratis} extremis retroversis, calyce exteri
flore ^{incisive} ^{ve} longitudinaliter rumpenti, caule hispido
Calycis uti petioli hirsuti herb. frus.

^{liberatus}
Campas H. folus subcordatis attenuati lobis supra punctatis subtus
fermyneo tomentosi

Campas H. folus subcordatis lati acuminatis lobis
super punctatis, calycem extenore minimo fetaceo; in
tenore laciniis angustissimis longissimis et emarginato Cavan-
D. f. pag. 154. tab. 56. fig. 2.

Habitat in Philippinis.

Paulis arboreus rami glabri. folia petiolata flores-
ax. illares solitarii. Petioli et pedunculi breves. Calyx folioli
5que vel plures fetacei. interior coraceus hemisphaericus lacini-
5que subulati. Corolla magna. capsula ovata pentagonus-
Cavan.

Trilobus *H. foliis trilobis serratis, pedunculis inermibus*. Cavan. Desf.
pars. 147. fig. 2.

Habitat in Inf. P. Domenici 7

* *Hibiscus foliis trilobis serratis, caule aculeato* Plum. u. p. 152. t. 159
Caulis arboreus, terribilis, aculeis rubris et validioribus munitus.
Folia petiolo carnoso lobis ovatis intermedio productione
petioli aculeati. Pedunculi axillares solitarii inermes
Calyx exterior foliolis 12. angustis. interior duplo longior laciniis
subrotundis acuminatis. Corolla magna coriacea. Cap: ovata
membranacea ovo columbus magnitudine hispida. Locula
polyperma Cavan

non vidi

bifurcatus // folia serratis inferiorem trilobis, medio hastatis supremis lacinate
4, folioli calyptris exterioribus bifurcatis, caule aculeato Cavan
Desf. pag. 146. tab 51. fig. 1.

Habitat in Brasilia 5

lobositate ^{lobis} ^{interstitio} ^{adpressi} ^{aculeis} ^{parvis} ^{reflexis} - folia petiolata. Injo Uliam
caudae fruticosa, aculeis Ram. tenet glabris, superne pubescenti
attenuato acuto lateratibus obtusi basi subcordatis, sin
trifida utrinque pili rari decumbentibus. Stipulae lan
ceolata. Petioli teretes pubescentes pollicares. pedunculi axilla
res solitarii petiolo longioris et caespit. aculeoli minuti
adpressi subpubescentis. Cal. edentis // phyllis folioli linearibus
longitudine exteriori hinc apice parum latioribus laciniis inte
riori laciolato. Corolla magna. Capsula ovata villosa longitu
dine calyptris

~~tricuspid~~
~~tristatus~~ *H. inianus*, foliis oblongis simplicibus basi trilobis ^{hastatis} integer
rimis, racemo terminali *Lin. Suppl. p. 310. t. V. pag. 631.*

Habitat in Tahiti

Tricuspid *Habitans* *tricuspid* caule a thoro foliis trilobis lobis acutis
productis, floribus racemosis, stipulis magnis acutis
Caran. Desf. pag. 152. tab. 55. fig. 2.

Habitat in Tahiti

caulis arboreus rami tomentosi folia longe petiolata
superiora inversa stipula orata tomentosa *Caranell.*

obtuserecrenatis

superioribus orato lanceolatis inferentibus

trilobis

non vidi

Diversifolius H

Galeopsis diversifolia Gaeyh coll. 2. p. 307

Habitat in India orient.

Caulis aëreus erectus, sex pedalis vix ramosus, villosulus aculeis brevibus pinnatis, subsessilibus rectis thami erecti. Folia longe petiolata inferna ovata, superiora triloba per se non indivisa oblonga acutiuscula serrata utraque hispida venosa subtus ad nervos hispida. Petioli villosi subius aculeis raris adpressi. Pedunculi axillares solitarii breves. Calyx exterior polyphyllus foliis c. 11. lanceolatis acutis, rigidulis hispidis. interiori hispido pilis albis longitudine exteriori lacinis ovatis. Corolla ampla sulphurea basi atro sanguinea. Germen hispidum. Capsula ovata, 5 angulata Gaeyh.

non vidi

Domingensis Habitus

Hedraea aculeata, flore amplissimo Cárdenas Plum. R. tab
159. fig. 1.

Habitus Domingensis Jacq. coll. 3. pag. 219.

Habitat in Domingo

Caulis arboris, 10 pedali ramis teris cinereis, inermis, junior
ut: rami aculeis propriis numerosi et latissimis basi subulatis, retropu
lis florentibus ad lentem villosus. Folia longe petiolata, gla
briuscula pennata, actus lobis: lobis 3bus mediis ovatis
Petioli minutissime aculeati. Squala setacea minute hirta
recedens. Pedunculi axillares solitarii, 1 flori, venter, crispi, villosi
natisi sicuncrati. Cal. externus 13 phyllis foliolis lanceatis
acutis hirtis: internus non pennulatus extensus duplo con
que hirtum latius 5 semi ovatis. Corolla rotat copiosu
ra fundo atropuro puro. Capsula ovata hirta Jacq.

nonardi

Funaria # recurvato-aculeatus, foliis quinquelobis, calycibus
exterioribus appendiculatis, stipulis semiornatis, floribus
pedunculatis Lin. Spei. pl. p. 979 & Mant. 436

Herba erinaceum Rumph. amb. 4. p. 46. & 16.

β. Hibiscus foliis palmato-digitatis quinquepartitis: laciniis
lanceolatis, caule aculeato fl. Reyl. 264 &

Naninam-poulli Rheed. mal. 6. p. 75. & 44.

Altera spinosa maderaspatana Japonis acida, foliis profunde
laciniatis, cannabis in modum pentaphylla Plukh. alm
15. t. 5. fig. 4.

Habitat in India

Caulis squedatus, teres, furculis parvis reflexis, pilisque
raris adpressis. Dolia petiolata serrata ^{basif. cordata} bipollicaria
adnataque raris pilosa inferna et nonnulla paucis orata
acuta subtriangulari superiora palmata 3-5-fida
laciniis lanceolatis costa subtus aculeo uno alterove
stipula ovato acuta. Petioli longitudine folio
saepe longiores aculeati uti reliqui aculei basi globosi supra
antheris pellid. albi pedunculi axillares solitarii extendum
longitudine petioli tertius aculeati. Calyx extensus sub
phyllis foliolis aculeatis rarisque pilosis linearibus et trifloris

Simplex 4. ~~Folius cordatis trilobis repandis integerrimis, caule ar-~~
~~boreo simplicissimo.~~

~~Canicollati~~ ~~patentibus~~ ~~pateris~~, medio foliolo linearis erecto. Corolla
interior lacini
Canicollati ~~flavescentis fundo purpureo. Capsula globosa acuminata-~~
semina glabra

Habitat in ~~saratenis~~ ~~aculeis~~ ~~recurvis~~ ~~foliis~~ ~~digitatis~~ ~~calycibus~~
appendiculatis ~~Baran-des~~ / p. 149. fig. 1. tab. 53. fig. 1.

— 3-5 pedis —

sinuatus. Filii foliis cordatis squulobis serratis, calycibus exterioribus deciduis
interioribus latere rumpentibus, caule aculeato Cavan. Desf. pag. 197.

Tab 92 fig 2.

Heteromele reylanica filicifolia, perianthis oblongo integro Gill.

Essen. 190. t. 157. fig. 190

habitat in India orientali 5

aculei minimi albi. folia fere usque sinuato lobis ex tropho
medio latioribus longe petiolata. Stipulae lineares bilobae.
pedunculi solitarii petiolo breviori. Cal. ex fenois foliolis 5-6
lanceolatis, interior longior tubulosus sive anastatus utriusque
tomentosus deciduus. Capsula ovata tomentosa Cavan

pedunculatus 4 hirsutus foliis quaque lobis dentatis, pedunculis
axillaribus unifloris elongatis Lin. Suppl. p. 309. S. V. p. 630
Habitat in Cap. b. p. 4

Arb. frus pedunculatus caule frutescente, foliis 5 que lobis tribus
que hirsuti, pedunculis axillaribus unifloris elongatis
Cavan. Disp. pag. 163. tab. 66. fig. 2.

Tolera superora tubera utraque pili flavo apertibus hirsuti. foliola
calycis exteriora lineari lanceolata interiora breviora

Pruriatius H. *caulis cordatus 5-7 lobis tomentosus, flombus pruriatibus, caule*
hirsuto, stipulis utraque fenis Cavan. Desf. pag. 164. Tab. 59. fig.

Habitat:

Caulis pelis longis retroversi. Petali inferiores longissimi hirti
folia rugosa crenata vix tomentosa. Stipula subulata
specie Congioma Vermenali. Cal. exterior 1 phyllis: 0-9
postitis laciniis linearibus extus lanato-nerviis: interior
conicis extus lanatus intus glaber Cavan.

non vidi

^{ca}
Stenatus ff Stenatus foliis hastatis glabris serratis, calycis exterioris fructo
inflato inermi. caule sulcato aculeato Cavan. Desf. p. 146. tab. 54
fig. 1.

Habitat.
adulescens rigidi parvi. folia subcordata. Petioli aculeati foliis
triplo breviores. Stipulae lanceolatae pedunculatae petiolo breviores
aculeolati solitarii axillares. Calyx exterioris folioli 8. angustis
linearibus. interior majoribus pellucidis laciniatis. Corolla
cudca bipollicari Cavan.

non vidi

Syncaea H. foliis canaliculatis ovatis superne incisive serratis caule arborescente
Linn. R. V

Alcea arborescens Cam. hort. t. 3. 4.

Alcea arborescens syncaea Bauh. pin. 316.

Habitat in Syria

Rami teretes glabri. Folia petiolata ^{gemmo sparsa} ex eadem gemma 2-4

per se tri-pollicaria à utroque glabra obtusiuscula tri-ner

via. Petiolus vix pollicem ^{inella pilis nris in nervis} superat stipula subulata. Pedunculus

axillaris solitarius petiolo parum longior et crassior ora

latis pubescentes. Cal. exterior 8 phyllis ^{linea} ^{canaliculatis}

obtusis acutis glabris, laciniis inter cori ovato acutis canaliculatis

fructibus calyce ^{ti videntur} ^{ovato} ^{acuminata.}

Syncaea H. caule fructuoso, foliis canaliculatis ovatis trilobatis, inaequaliter
dentatis glabris subcoriaceis, seminibus denis hispida
Gouan. Desf. pag. 170. tab. 69. fig. 1.

glabris

subtrifidis canaliculatis.

~~Heligolensis~~
Lignis

^{integerrimo}
A. foliis lanceolatis subtriangatis attenuatis glabris integerrimis
in lignis trifidis que.

albus liliiflorus, caule arboreo, foliis lanceolato-ovatis oblongis
trinerviis; nonnullis bipartitis, corolla liliacea magna parte
ca, tubo longissimo Cavand. Desf. pag. 154. tab. 97. fig. 1.

Habitat in insula Bourbon

Arbor mediocre trunco crassitie femori humani cortice ramoso
rami teretes glabri. Colica petiolata sparsa frequentia, 4-5 polli-
cariis utraque attenuata glaberrima basi obtusa apice acuta
trinerviis obsolete venosa. stipula nulla. petioli folio
duplo breviores 1-2 pollicares pedunculi axillares plerumque
petiolo longiores et parum crispiores superne geniculati supra
geniculum parum crispiores. Calyx extensus 5phyllus. folioli
subulatis basi carnosos subcylindricos cortice glabris siculis interior
longioribus coriaceis hemisphaericis 5dentatis tomentosus
Corolla fere tripollicaris 5phonica petalis inferne castaneis
coraiventibus superne patens fundo fovea sive malleola
genitalia corollo longior stylus apice tomentosus stigmatibus
nuda Capsula cortice duro carnosos pubescenti fecta 5lo-
cularis sive valori laculis sperma feminebris villosis

Silene dichotoma
— *Coranthe*
longiflora

Digitatus # foliis palmatis 5-7lobis laciniis lanceolatis serratis glabris,
calycibus monophyllis inermibus, floribus subsessilibus. Cavan
Desf. pag. 151. Tab. 70. fig. 2.

Habitat in Brasilia.

Solus longe petiolatus, glandula subtus in vena intermedia
stipula setacea. Petioli ex aculeis obsoletis oppositi. Flores axilla
resolitani. Calyx exterior 3-partitus laciniis lanceolatis
interior longior laciniis ovato-lanceolatis. Capsula
globosa villosa loculis polyspermis siccis glabris Cavan

non vid.

manihot $\#$ foliis palmato-digitatis septempartitis, caule petiolisque
inermibus Lin. S. V. Caran. des. pag. 171. tab. 63. fig. 2.

Alicea jinic'a, manihot stellato folio, capsula longa pilosa py-
ramidata quinque fariam Divisa Plukn. amalth. 7. L. 353

fig. 2.

Victoria folio manihot serrato, flore amplo sulphureo Dill. Cbr
109. 4. 156. fig. 109.

Habitat in India

Caules herbacei perennantes infera juniores hispidi. Folio petiolato
pinnodiale angulato in planta adultiora 5. vel 6. partita
nalmans et ultra lobis lanceo lanceolatis attenuatis est
sum serratis lateralibus profin minoribus brevioribus. Peduncul.
axillari solitarii ^{foliis} calycis extenoris lanceolato
piloso. Corolla magna flava fundo purpureo. Capsula
ovato-oblonga acuminata hispida.

floentes folio
longiores

flavescenti. ff foliis palmatis 5 lobis cauleque hirsutis serratis, floribus ter-
minalibus pedunculatis terminalibus aggregatis. Cav.
Arabici flavescenti caule hirsuto pilis aureis, foliis pal-
mato, sive lobatis hirsutis, floribus numerosis terminali-
bus. Cavan. Diss. pag. 164. Tab. 70. fig. 3.

Habitat in Pondicheri.
caulis fectus pilis nigris aureis uti flores. lobi lanceola-
to elliptici. stipulae subulatae. Cavan.
Folia sesqui pollicina: lobi oblongi herb. Kusp.

aculeatus H. pilosus foliis infimis cordatis angulatis serratis supremis palmatis
lobatis calycibus aculeatis Walt. fl. Carol. p. 177

Habitat in Carolina

non vidi

Columnari 44. foliis cordatis angulatis subtomentosis ^{floribus terminalibus pluribus} calycibus ²⁻³ monophyllis
genitalibus longissimis,

Habitus columnari foliis cordatis rotundato-angulatis subtomen-
tosis, calycibus monophyllis, tubo columnari longissimo.

Cavan. Desf. pag. 166 tab. 69. fig. 2.

fl. foliis glabris. Cavan. t. 69. fig. 3

Habitat in Insula Bourbonis &

Folia frequentia. ^{triole} Petioli subtomentosi. Pedunculi breves. Calyx
exterior laciniis 6-7. interior longior laciniis lanceolatis
Corolla exterior villosa lutea.

fl. Rami teretes, inferna glabra superne pilis minutis fere latis canescentibus. Petioli
tripollicares adulescentes glabri, junioris villosi tomentosi prope basin
et dimidium folii folia pollicis 2-3, latiora quam longa tri-
vel subtriangularia subtrilobata venella utroque flavescenti tomentosa
adultiora utroque glabra excepto subtus ad basin coram venosa
obsoleta venosa, squae nervi sub obtuse subdentata. Stipulae
ovatae Pedunculi in apice folioli calycis exteriori linearia
o.

varietas Hab
mutabilis Lec.
La Martre

palmatus // foliis cordatis palmatis lobatis serratis, pedunculis nudatis
Cavan. D. of. pag. 160 tab. 63 fig. 4.

Alcea barmia americana parva flore, petalis rotundioribus
Cajus Plicth. tab 6. fig. 4.

Habitat in America calidior. 5.

Caulis bipedalis teres sub herbaceus perennans. Folium magna
superiora triloba lobis ^{inferioribus} ~~oblongis~~ oblongis superiora lanceolatis
subaequalibus. Stylula brevis subulata. Flores axillares
magni solitarii. Calyx exterior folioli lanceolatis interior
longior tubulosus apice squedentata. Corolla flava unguibus
purpureis Cavan.

varietas hibisci mammosi herb. la Mont.

radiatus *H* ^{superioribus} foliis palmato 5-quefidis laciniis caniccolatis serratis pedun-
culus brevissimis caule aculeato Cavan. Desf. pag. 150 tab. 54. fig. 2.
Habitat 3

Caules frutescens ramosus, aculeis parvis. Folia longius sive petiolo
in infima ovata attenuata glabra. Stipulae caniccolatae
erecta. Flores solitarii axillares. Calyx exterus foliolis 10
lineamentis patentissimis ap. interior longior 10 sulcatis laciniis
caniccolatis uti exterior aculeatus petioli et pedunculi
aculeati. Capsula ovata loculis polypermis Cavan

esulentus H. foliis quinque partito-pedatis, calycibus interioribus late
reunpentibus Lin. S. V. p. 630 + Jacq. obs. 2. t. 35.

Quingambo Martyn. Bras. 31.

Alcea americana annua, flore albo (flavo potius) maximo
fructu pyramidali sulcato Comm. hort. 1. p. 37. Tab. 19.

Alcea maxima, malvo rosea folio, fructu delazono recto cras
sae brevis esulento Sloan. hort. 1. p. 223. t. 133. fig. 3.

~~Habitat in India~~ O

Halimolobos esulentus - caule herbarico crasso, foliis 5 que
lobatis creatis subpedatis, calycibus utrisque deciduis
fructu corniculato Stigmatibus 5-10 Pavan. 8. s. 1. tab

foliis 5 fidi lobis
oratis inaequaliter
ferratis, calycibus
deciduis interior
longitudinaliter
reunpentibus

fructu
mag. 60. tab. 61. fig. 2.

~~Caulis~~ Habitat in India O

Caulis herbaricus sesquipedalis erectus. Folia petiolis
parum longiora folia lobis obtatis inaequaliter serr
tis supra glabris subtus nervis raris pelosis pinnatis utrin
que, venosis subtus pallidioribus. Stipulae subulatae
pedunculatae adillares breves solitariae. Calyx exterior
lobis 10-12. lineamentis ciliatis. Capsula oblonga
triloculari tamen sola acuminata. Stigmatibus 10

Hesperidulæ Hb. caule hispido, foliis palmatis dentatis glabris, calycis extenone
laciniis linearibus Dorsk. Desf. pag 126

Speciosus H. foliis palmatis glabris: laciniis lanceolatis serratis,
caule pedunculis calycibusque lobatis H. & A. Venc. 2 p. 456
Habitat in Carolina australi &
valde officinis H. Lami Scop. in pub. 3. p. 351 t. 17. sed folia
Anloba in Scopoli

non vidi

ficulneus 4 foliis quinquefido palmatis, caule aculeato, floribus pedun-
culatis Lin. S. V. pag. 630 & fl. reyl 2634

~~Nectandra zeylanica, f. 5 folio, perianthio oblongo integro Bell.~~
~~Ess. 190. 8. 157. fig. 190.~~

Habitat in Zeylona. 5

Hibiscus ficulneus caule fruticoso verrucoso ramosis, foliis
5fido palmatis, superioribus oblongis ovatis lanceolatis
floribus subsessilibus terminalibus. Caran. Desf. p. 140
Tab. 51. fig. 2.

non vidi

Cannabimus H. foliis serratis: superioribus palmatis quinque partitis
subtus uniglandulosis, caule aculeato, floribus fespibus L. t. v
pag. 620 & Spec. pl. pag. 979 &

Alcea benghalensis spinosissima, acetofo sapore, flore lutes palli
do: umbone per parascente Comm. bot. 1. p. 35. t. 18.

Ketonia indica, foliis digitatis, flore magno sulphureo: umbone
atro-purpureo, petiolo juniori Eht. t. 6. fig. 1.

Habitat in India & O.

Caules 6-7 pedati glaber teres, ramosis, culis parvis rectis pinnon
tus. Folia longe petiolata ^{minor} inferiora ovata, superiora 3-5 da

Caecini lanceolati acutis intermedia longiora serratis
glabri glandula subtus basi in nervo medio petioli folio

capulo longiori covei vel aculeati. florei magni flori fesples

axillari solitarii. Cal. extenor 9 phyllis foliolis subulatis
subaculeatis: interior longior laciniis uniglandulosis
lanceolatis aculeatis. Capulo hirta ovata acuminata

H. Cannabimus caule herbaeo glabro, foliis superioribus palmatis
5 partiti serratis uniglandulosis, floribus fespibus, calycibus
glandulosis Cavand. f. pag. 140. Tab. 52. fig. 1

novidi

restr

Sabdariffa # foliis serratis: inferioribus ovatis indivisi superioribus
septem partiti, caule inermi, floribus sessilibus L. V. pag
630 + Jacq. off. 2. t. 35.

Alicia acedosa indica mitis, foliis superioribus gossypii in mo
dum tripartito divisi Pluk. alm. 15. Tab. 6. fig. 2.

13. Alicia americana Clus. hist. 2. p. 26.
Alicia indica magno flore Bauh. pin. 317.

14. Sabdariffa caule herbaceo glaberrimo rubescens
foliis serratis: inferioribus ovatis superioribus tripartitis; flori-
bus solitariis axillaribus sessilibus Cavan. des. pag. 170

Habitat in India occidentali O.

Cauli erecti teres glaber laxis folia petiolo ovato
oblonga inferiora et superiora saepe indurata et com-
bi. f. triloba basi cuneata utraque glaberrima tri-
serrata basi versus integer vna tenuissime venis
3-4 pollicaria vel minorum stipula lanceolata
retroli interdum longitudine folii. pedunculi
axillares brevissimi solitarii. Calyx

15. Ternus hujus varietas est exterior foliis 10-12. coraspi interior
nam brevioribus saepe coloratis glabris

interior extus glaber intus pubescens. Corolla ~~vs~~ calyce triplo
longior

caule teri, foliis ovato-oblongis glabris serratis integris trifi-
doque, floribus axillaribus subsessilibus

fraternalis foliis trilobis calycibus exterioribus radio teretibus. apice
mucronato concavo Lin. Suppl. p. 311. t. V. p. 631.

Habitat in Surinamo.

a Sabdanffa forte non diversa

*Tripartitus Haculeato-hupidus, folio tripartito lobis lanceolatis serratis, pedun-
culo axillaribus, capitulo pilosis Forsk. Descript. pag. 126*

Arenarius *A. glutinosus*, foliis profunde trilobis: lobis lateralibus inaequa-
libus lobis, calycis exterioris folioli petalaei gland uloso pilosi Scop.
Del. fl. inf. 3. v. 2.

eadem fecta ac *Parmia Seylanica*

sepi-anus H. caule hirsuto. foliis emi subrotundis crenatis clypeo superioribus
lobis obtusis serratis, calycibus inflatis, caule hirsuto urcato
Cavan. Diss. pag 171. Tab. 64. fig. 2
Habitat in Africa O

1
Inoum H. foliis tripartiti serrati lobis lanceolatis intermedio lon-
gissimo, calycibus inflatis caule frabro.

Habitat Inoum foliis tripartiti incispi, calycibus inflatis
Len. Syn.

Habitat in Africa Carolina C

Caulis superne pilis rigidis adpressis. Folium petiolata remote
lobi laterales bifidi extropia remote profunde serrata
intermedius longior utroque serratus glabra vix venosa. Stipiti
lo sitaces margine pilis longis raris pinnis ciliatis pedunculati
bispidi uti calycis. Calyx interior nervosus venosus

Habitat in Africa Petrus herb. Inias

^{ternatus}
~~Tronum~~ ^{ternatus} H. folio ~~ternatus~~ ^{ternatus} calycibus inflatis, caule subterreosis

Alicea peregrina Solisegua Lob. ii. 656.

Alicea vesicaria Bauh. pin. 317.

~~Alicea vesicaria capitata f. frei Monf. prol. 227. hist. 2. p. 533.~~

~~Helmia vesicaria africana Tournes. 4. R. H. p. 101.~~

Habitat in ~~Italia~~ Africa O

lindus A caule fruticoso hirsuto, foliis serratis acuminatis ^{integris} subtrilobis
seminibus lanatis
Herbicus phoeniceus
in Suppl.

plate 4

Fork