

Hieracium

paniculatum Hieracium foliis lato lanceolatis petiolatis subintegerrimis dorso
hirsutis, caule inferne hirsutissimo

Habitat in America boreali. Ex herbario Richardi.

Caulis erectus. Folia bipollicaria, per petiolum decurrentia, in-
ternodia, vel dente uno alterove notata. Pedunculi ex alis su-
perioribus et apice, ramosi. Flores parvi. Pedicelli capillares.
Calyx glaber.

aspera Prenanthes

Habitat in America Septentrionali herb. Richard

Caulis herbaceus, simplex, sulcatus, erectus, crassitie penno an feno, si abriusculus
Folia sessilis, pollicaria, lanceolata, remote inaequaliter dentata, si abriusflo
raria integerrima. Racemi terminalis, fructus, semi-pedalis. Pedunculis bra
ves, triflori, villosi. Calyx calyculatus, villosus. Pappus sessilis, pilosus, semi
na cylindrica, striata

9 Cabrum *Hieracium* foliis pilosis inferioribus lanceatis, superioribus
oblongis sessilibus integerrimis pilosis, caecule mucronato hirsuto.

Habitat in America boreali. Ex herbario Richardi

Caulis herbaceus, erectus, sesquipedalis, simplex, scaber. Folia inferiora
tri-pollicaria, remota, basi valde attenuata: superiora margine
procedunt pilosa. Pedunculi hirti, glanduloso pilosi, uti basis caly-
cis.

Crepidinaea Preanther

Habitat in America Septentr. herb. Nutt.

Caulis herbaceus, erectus, teres, glaber, sulcatus, penna asperina crispus, superne
in ramos divisis, paucifloros. Folia remota, inferiora petiolata, superiora
sessilia, 5 pollicaria, elliptico lanceolata, glabra, subrepida, dentibus nonnul
tis rarisimis, remotissimis. Pedunculi subrepidantes. Flores racemosi, tres vel 4,
natiscentes. Calyx simplex, velis rari adpressus. Pappus denticulatus, sessili
affinis *Pr. albo*

marginatum Hieracium foliis lanceolatis subdentatis pilosis, scapis subramosis
hirsutis; calycis foliolis calycinis margine tomentoso

Habitat in Monte Video Brasiliae Comerson. Ex herbario Gussone et
Thouini.

Stem radicalia sessilia, bipollicaria, inferne versus attenuata, extor
denta ^{culo} uno alterove remoto rotata, acuta, aevonia aevonia, pilis
raris bordis adspersa, copiosiora in margine et subtus in costa.

Scapi plures, erecti, pedales, teretes, striati, inferne inferne proser
tim hirti, e pilis bordis flavescantibus, ~~rari~~ simplicissimi vel
ramosi: rami pauci, alterni, elongati, ut scapi adspersi foliolis

quatuor ad
sex, inferioribus ^{linea}
ni-lanceolatis, superioribus subulatis. Flores solitarii. Calycis
foliolo lineari lanceolata, obtusiuscula, glabra, excepto margine

semiglabra Hieracium foliis lanceolatis integerrimis, radicalibus cauleque inferne
tum
hispidis, calycibus pilosis

Habitat in monte video Brasilia Commerson, Thonin

Caulis erectus, ^{simplex} pedalis, teres, inferne, uti folia radicalia utrinque satis
resescentibus hispidus, superne glaber, in ^{pedunculis} ramis duos sal tres florigeros

Dissepis. Folia persepilia pollicaria, tria vel quatuor in caule, minime
in ^{pedunculis} ~~caulis~~ pedicelli, acuta, avenia, e nervia; caulina glabra.

Flower duo sal tres in singula ramo, magnitudine H. cymosi. Pedi-
celli breves; pilosi Calyx pilis nigricantibus, apice glanduloso
ad prespur

variegatum ~~*theriacum*~~

Habitat in monte video Comma. herb. Jusf.
Folia radicalia, lanceolata, sessilia & pollicaria, inferne versus semper angustata, dent.
Culata costa villosa, margine serrulata. Scapi erecti, pedales, teretes, striati, hirsuti.
ramosi: rami alterni, pauci, elongati, folium lanceolatum dentata serrulata - fidum
& aliud remotum linear lanceolatum in ramis. Flor solitarii. Calyx umbriatus: folia
ter lanceolata, obtusa, margine tornentoso-niveis

piloselloides
decumbens

Hieracium foliis lanceolatis integerrimis sessilibus caule
decumbente hirsuto

Patria ignota mecum communicatum a Ventenatis.

Caulis sesquipedalis, teretes, superne in pedunculos paucos divisus
inferne adspersi cili folia, prosetim inferne pilis longis tuberculis
minutis insidentibus. Folia remota, bipollicaria, sursum sensim
minora, acuta, basin versus attenuata. Pedunci et axillis superion
bus, uni ad triflori, vellosi, superne canescentes. Flores ~~mod~~ fl.
piloselli minores. Calyx, cili pedicelli apice, adspersi pilis nigris
apice glandulosi

piloselloides Villan

~~Geranium~~

~~Geranium piloselloides longis anguste leviter dentato foliis, flore magno Borion. sic.~~

~~Habitat in Sicilia. herb. Mus.~~

~~Caulis erectus, semipedalis, simplex, pilosus. Folia margine hispida, lanceolata, radicalia basi attenuata, remote subdentata, 3-4 pollicaria: caulina parva, 2-3, integra. Flores solitarii vel gemini. Calyx hispida sinu.~~

americana

~~Traxinus foliolis petiolatis elliptico-ovatis attenuatis integerrimis subtus glaucis~~

~~Traxinus acuminatus foliolis integerrimis, petiolis longe acuminatis, petiolatis subtus glaucis. La Mart. Dict bot. 2. p. 547~~

~~Traxinus americana; foliolis petiolatis oblongis acuminatis integerrimis, subtus glaucis. Wied. arb. ber. 116.~~

angustifolia β . Traxinus carolinensis foliis angustioribus utrinque acuminatis pendulis

• piloselloides. Hieracium foliis lanceolatis vae margine hirsutis, radicalibus
subdentatis, caulinis integerrimis, caule erecto piloso paucifloro.

Hieracium piloselloides longo angusto leviter dentato folio, flore
magno Boissoni Vaill. herb.

Habitat in Sicilia. Ex herbario Vaillantii

Caulis semipedalis, simplex. Folia radicalia ^{tri vel quadripollidaria.} basi attenuata, remote
subdentata; caulina duo vel tria. Flores solitarii uniceci vel
geminii. Calyx hirsutissimus.

Hieracium Boissoni fl. Lamark Saxatile Gaeze

Lappana

Chordolla orientalis, maxima *Cuthoni sylvestris* folio Tournef. Cor. pag.

Habitat in Oriente, herb. Mus.

Caulis herbaceus, erectus, ramosus, glaber, crassitie penna asperius, striatus.
Folia petiolata, remota, runcinata, villosa; lacinae alternae, lanceolatae
obscure dentatae, terminalis dentata sinuata, subhombroidea, subpedunculata
linearia. Flores flavi, parvi majores quam in *L. communi*. Semina
linearia, nuda.

29 confer cum

Decumbens Hieracium caule decumbente foliisque oblongo dentatis scabrae Lana
to-hirsutissimo.

Regi in montibus Rayonne.

Caulis plures decumbentes, ramosi, sulcati, & punctis numerosis firmis
et erectis scabri, fusco-purpureo scentes. Ramis et pilis longis confectis
hirsutis, etate glabri.

Dolia semiamplexicaulia, frequentia, firma, pollicaria, interdum
lanceolata, oblonga, utrinque dentibus 4-5 serrata, pedunculo
nunc integerrima inferora obtusa, superiora acuta, utraque
pilis albis longis copiosis prostratis subtus lanata, etate glabra,
pedunculo nunc integerrima.

Pedunculi versus apicem, alterni, subramosi, sub flore crassiores,
squama una alterave adpressi, uti calyces, in aliis hirsutis
fimis in aliis glabri.

obtusiflorus

Cyperus spiculis aggregatis sessilibus oratis obtusis involucri di-
phylo brevioribus, foliis carinatis culmoque rigido.

Abiata in Madagascar. Ex herbario Lamanthii

Culmus gemipeditis, basi a foliis congestis bulbosus; nudus, angulis acui-
tis. Folia radicalia, plurima, bi-Tripolliciana, ^{attenuata} margine laevia,
in involucri foliola rigida, subreflexa, unicum capitulis duplo
spiculae circiter usque, semi unguicularibus, perim angustiore

in capitulis dubio
bosso aggregatae

garden octodecimflorae, sordide niveis: valvulae linearis canaliculatae

~~in involucri~~

Grandiflorum Theracium

Habitat in Hungaria 7

Caules plures, sequipedales, adscissis pennae clypeae adscen-
dente, in ramos flexi sulcato-angulatis, pilorum subrisosis
pilis minori apice glandulosi. Petala radialis petiolata
petiolata basin fere semipedalia, lanceolata, bas in versus atte-
nuata, inferne dent in aequaliter dentato-venate extorsum
remota denticulata; caulina semiamplexicaulis, la & densi-
minora, sagittata lanceolata, ^{erora} ~~integro~~ integri-
ma acutiora omnia supra subvellosa, subtus prosertim
in costa villosior. Pedunculi axillares et terminalis folio
longior, plerumque triflori. Salytis foliola linearis, nigro-
veloso - vs costa Corolla magna

conter cum Pappo leuco Villers

Quisquam enim sibi catalogum
universalem plantarum conficiere, ge-
nera prima condere, species a propria
genera referre, Difficilius specificius
convenire, solent conspiciereque forma-
ra, species a variis istis Disjunctura,
Synonymiam solentam et longam evadere,
Alimentalium et aliorum distinctio-
nem unius ad altera inordinari elate-
rara, ut argumentum legit.

Incipitum tale ante Pragmatis vel qua-
draginta annos non vixit in his eras,
posteaque in vero numeris et in de his
historia attendit Europam per lucra
nunt, praesertim vero reliquos pedes
mundi quem plurimi Scientiae naturali
periti magis quam in omnibus antea
tibus seculi reliquos praesertim in
vestigant, numerus plantarum infra
paucos est per plus quam duplo auditus.
quod. Atque Difficiliter in Germani-
a et Hispania enumerantur methodi
tam quidem in his adire videntur per
si plantarum plures et tota praesertim.

Scorzon eroides Hieracium Capsa subsimplici uniflora hirsuta squamata, calycibus
tomentosis, foliis lanceolatis subdentatis.

Habitat in Bonaria

Folia radicalia, inferne attenuata, rare pilosa prostrata ad
marginem et subtus in costa.

Capsa plures erecti, spithamei, simplicissimi, interdum ramis
unifloris, basi hirsutissimi, superne pilis longis raris
nervi, folia nonnulla parva, remota, subulata, a medio
scapi ad apicem.

Pedunculus sub flore crassior, tomentoso-incanus.

Calycis foliola lanceolata, obtusa, imbricata, junctura tomen-
tosa, incana, ad altera tantum margine.

Spicaea Hieracium

Hungariae Kitzbichel

Caulis bipedalis et ultra, caespite pennae anserinae, inferne
pilosis superne glabris, teres & callosus, inferne purpureo-ens super
ne in ramos floriferos. folia Basili 4 parva tri-quadri pollicaria
lanceolata u. ovata, interdum semiseriata demote Dentata
St, extusum integerrima, rigidiuscula supra glabra nitida
subtus villosula costa pilosa praesertim infima, subclivata & u
prema ovato lanceolata. Pedunculi caescentes pedicelli alterni
approximati breves basi foliolo ovato integerrimo. Calyx ^{sub} villosus.
Pappus pilosus

~~Cat. ^{inflor} ~~erato~~ S. Culmi triquetris nudis, spicis subternis lateralibus involucri
monophyllo brevi Retz. obs. 4. p. 12. A. Eusd. pl. 5. p. 16
Habitat in Zeylona~~

~~Locus Sempiterni supini Culmi plures, ^{inferne} vel pul. spithamoi vel pedu-
les Cat. Strati. ~~Tolca radicata~~, basi vaginati vagina striata
apice acumino folio brevi acuminato. Spicis vespis medium
apice prop. equino 2-3 ~~in~~ saepe interdum probera pedunculi
tres basi spicis tribus sessilibus spicula oblongo semunqui
cularis squam. ovato acuti convexi margine femineo dorso
vires. foliis involucrium 1 phyllon longitudine sp. co umbello
Semen 3 quet non nigrum oculo armato regulosum~~

~~Junci maderaspatense minor. Act. philos. 282. pag. 1253. secund. her-
bar. Vaillant~~

Sprengianum 9.

Caules fruticosi. Rami saepe aequalitudo cauli. Folia remoti, 4-5 pollicaria, lanceola-
ta, superiora minoribus, dentato-serrata vel subrepanda, attenuata, pauci dentata
fere omnia sublongosa, nervis ciliata. Paniculi terminalis, pauci, pili rari sub
lobis uti calycis pilis frequentibus pubescentes. pili pili: herb. Royenii pili pili
quadralium hinc descriptione

proformosus. Deschampsii

~~Dentata A. comybo composito, foliis lanceolatis dentatis serratis Lin. Suppl. p.
361. p. V. pag. 742.~~

~~Habitat in Cap. b. part.~~

~~Rami virentis glabris foliis sessilibus, semunquicircularia, basi utraque dentibus
tribus serratis, rigida, avenia acuta. flores tres in singulis pedunculis~~

floranthum Hieracium foliis lanceolatis integerrimis dentatisque ciliatis glabris
floribus paniculato corymbofis

Hieracium montanum angustifolium parvo flore Bauh. C. hist. p. 11.

Hieracium floranthum All. fl. Ped. 775

Hieracium caule bracteato paucifloro, foliis lanceolatis, longe
pilosis, calycibus glabris Hall. hist. p. no 54

Habitat in Helvetia et Italia

Radix pro-morsa, scapus ramosus vel simplex foliis interdum
geminis linearis lanceolatis inferne, remoti ceterum nudis apiculatis
foliis acuta, pilis longis remotis in margine ceterum glaberrima. Flores parvi glabriusculi

51.52 Hall. part. non
a ~~parvifloro~~ an satis diversa

pyrenaeicum fl. foliis amplexicaulis obovato-lanceolatis retrosum dentatis,
caule simplici, calycibus latis Lin. h. V. pag. 710

blattanoides *Hieracium pyrenaeicum*, blattano folio, minus hirsutum Tournef. 7. R. H.
472. Mon. hist. 3. 7. 4. fig. 11.

Hieracium blattanoides foliis lanceolatis amplexicaulis dentatis,
floribus solitariis, calycibus latis Lin. Spec. pl. p. 1129. Herb. Cliff. 387.

pilosum *Hieracium pyrenaeicum*, blattano folio, minus pilosum Herm. parad.
184. t. 104

Picini pyrenaeica: perianthis latis, caule piloso, foliis dentato sinuatis
Lin. Spec. pl. p. 1115

Habitat in Pyrenaeis 7

aurantiacum ⁴ foliis integris, caule subnudo simplicissimo pilos conyrbifero
Linn. S. V. p. 716 Gaerq. fl. austr. v. 5. t. 410.

Heracleum Germanicum 1. Col. Ephr. 2. p. 20. t. 30

Heracleum hortenae, flonibus atro-purpureis herbis Bauh. pin. 120.
prodr. 65

Heracleum alpinum non laciniatum, flore albo Bauh. prodr. 65. pin.

¹²⁰
Pilosella polyclona repens major synaica, flore amplo aurantialo Monf.
hist. 3. p. 70. f. 7. t. 0. p. 7.

Habitat in Suedia, Helvetia, Austria, sylvis in Norvegia legit Severinus
Dr. Prof. Krom 4

Folia radicalia lato-lanceolata petiolata integerrima
pili longi proferuntur ad marginem subhispida. Stolones
repentes foliosi pilosusculi foliis obovatis. Scapus
erectus pedalis medio folio unico lanceolato, scabere
nervis nigricantibus cui insident pili longi, comati
pedunculati ad apicem simplicissimi sub flore parum
crasiores pilosusculi calyces

promotum H. foliis ovatis subdentatis, scapo nudo ramoso, floribus superioribus
primoribus Lin. Fl. Su. 7004 T. V. 416 Cl. Dan

2 Hieracium pratense latifolium non sinuatum majus Bauh. pin. 129.

3 Pilosella major erecta Bauh. pin. 262.

1 Fritybus aphylloraculis major Thal. her. 66.

Hieracium foliis ovatis tomentosis, caule nudo floribus spicatis tubeculis
terminato Gmel. fl. 2. p. 32. t. 13. fig. 2.

Habitat in Europa septentrionali, Helvetia, Germania &

Folia radicalia, denticulata vel integerrima, villosa basi sub

molia tri vel quadrilobata obtusa basi versus angusta

subpetiolata scapi pedalis vel sesquipedalis vel longior natus

aphylloraculis ad apicem subterminis pedicelli erecto patentes uti

pedicellum pedunculo communi villosa inanescenter foliolum subulatum

tenax sive ad basin calycis squama glabra canaliculata flos superior

uniflori
uniflori
uniflori
primum florens

alpinum H. foliis oblongis integris dentatis, capro subvulso unifloro, calycis piloso
L. Sp. 716 Fl. Dan. T. 27 All. fl. ped. n. 771. Tab. 14. fig. 2

Geranium alpinum pumulum, folio lanuginoso Bauh. pin. 129.

Pedofella monocloros non repens alpina minor lanuginosa, amplo flore Monf.
bot. 3. p. 70. f. 7. 7. 7. fig. 5.

Geranium villosum alpinum, flore magno singulari Ray angl. 3. p. 169. Tab.
6. fig. 2 *

Habitat in alpebus Norvegiis, Britanniciis, Austriis &

Folia radicalia cuneata integerrima interdum dentata hirsuti-
tate tota planta, pollicaria. Sicuti palmaris simplicis specimen
uniflori versus medium folio lineari unguiculari. Flos
magnus.

Saxatile H

Hemicium saxatile Jacq. obj. 2. p. 30 tab. 50. Coll. 1. p. 159

Habitat in Austria

Cum H. glaucis all. rami convenit differt squamis calycinis simplicibus ordine
basi squamulis minutis calyculatis, seminibus rectis nec incurvis. Jacq.

Saxatile Villan

Dolia radicialia subtripolliciana, subpetiolata, oblonga, basi raris attenuata, inter
gemina, obtusa, villosa, basi hispidissima. Caulina cordata. Caulis plures, erecti
ramosi, teretes, glabri: rami uniflori. Calix pilosus herb. Turf.

~~Canadensis. foliis oblongo-ovatis subdentatis lanatis, pedunculis ramosis linn.
am. acad. 4. p. 200. f. v. 720.~~

~~Thermidium montanum Tomentosum Dill. Elth. 181. t. 150. fig. 100. Mill.
f. 97. t. 146. fig. 1.~~

~~Habitat in Europa australi &~~

~~Caules erectus ramosus uti tota planta lanato tomentosa in
caulina ^{caulis} ~~caulis~~ folia radicalia petiolata elliptica basi in petio
lun depresso, pinnis remote paucis dentata. foliola linear
lanceolata sub pedunculis. foliola calycis linearia~~

~~Thermidium
compositum~~

~~Habitat in alpebus semipedalis~~

~~Caules erectus simplex sulcato-angulatus glaber. folia
frequentia tripollicaria stultia glabra inaequaliter
remotiuscule dentata auriculis attenuatis postice pape
denticulo uno alterove. flos Pedunculis axillaribus ex om
nibus axillis superioribus simplicibus unis floris sub
florae papae incisatis inferioribus foliolis geminis
remotis ^{superioribus} versis calycem, glabri. Calyx luteo
imbriatus foliolis lanceolatis. Pappus pilosissima.
Sic se habet planta culta ex horto Parisiensis aliam~~

communiant de la Chenal cum nomine Hall. hist. p. n. 39 et dubiose hel
veticum, spontaneo quo omnino quoad figura foliorum egregie convenit
Cum descripta differit quod minor, ^{et umbelliferis} caule foliis pedunculisque pelopis
pedunculis ad apicem geminis alter folio in medio alter versus
calycem ceterum omnino eadem et sic diversa tantum in minutis
essentialibus

Conyza folium ^{Gouan.} var. in Act. Helv. Dora la Chenal eandem facit cum
Hall. n. 40 et adjungit grandiflorum All. quo diversa mihi
omnino videtur. Descriptio satis convenit figura vero plane
diversa ~~si etiam Gouan. All. aliud fuit: q. ex Bauh. hist.~~
~~citata quam Gouan.~~ Pappoleucium *bellarpi* hinc etiam
a Chenal. revocatur. *Ruber* Fey. 116 Fey. 1 a la Chen: ad 39
Hall. citata cum nostra convenit uti et Bauh. hist.
ex descriptione Hall. 39 et 40 tantummodo hirsutia differre videat
an modo varietates 1026 1032 Bauh. hist. ad 39 quo glabra
esse debet sic: Hall. in Bauh. vers. habet: folia lanugine rigida
obducta: in 1026. id caulis in 1026 vix ramosus: 1032 ^{sub}ramo
pelopis etiam

*Corydalis folium Hieracium foliis lanceolatis ^{laciniatis} amplexicaulis dentatis
pedunculis unifloris*

*Hieracium foliis oblongis lanceolatis hirsutis serratis, calycibus
ultrifloris Hall. bot. Europ. 2. 46*

Preps. hibernica V.

*β-Hieracium alpinum apenn. Corydalis folii Bauh. pin.
128.*

Hieracium pyrenaicum L. Lin

Hieracium britannicum ^{forte et β Egerd.} gradum Clus. hist. 2. p. 140

*Hieracium montanum ^{generis} latifolium, foliis corydalis majoris Monf.
Bauh. hist. 1026.*

Stagouanum

petiolatum 4. foliis ovatis petiolatis integerrimis subtus tomentosis, caule fruti-
coso tetragono compresso

dentatis
austriaca ^{um} ~~et~~ foliis lanceolato oblongis amplexicaulis glabris, calycibus
hispidis

Crepis austriaca foliis oblongis dentatis amplexicaulis; involucrio
laxissimo et calycibus hispidis Gaig. Ind. pag. 270 Tab. 5: All. fl.

Hieracium austriacum Lin. S. V. pag. 718

Ped. Tab. 30. fig. 1.

Hieracium montanum latifolium glabrum majus Bask. p. 129

Hieracium pyrenaeum, ^{et} blattanoides foliis lanceolatis amplexicaulis
dentatis, floribus solitariis calycibus laxis Lin. Spec. p. 1130

Caulis simplicis spinosus glaber striatus. Folia radicalia cuneata petio-
lata denticulata. Caulinae frequentia inferiora basi vespi-
cularum angustiora lanceolata, superiora acute sagittata ovata
breviora. Pedunculi tres vel 4. axillares solitarii a lateralibus
alioribus; hispidi aphylli vel bractea una alterare. Calyx peti-
~~o~~
longis hispider compositus

amplexicaule H. foliis amplexicaulis cordatis subdentatis, pedunculis uni
all. fl. ped. floris hirsutis, caule ramoso Lin. - l. v. p. 717. * Hort. Cliff. 307*
L. n. 792.
Gob. 15. fig. 1. Hieracium pyrenaicum longifolium amplexicaule Tournef. inf. p. 4
et 308 fig. 2.
p. 472
13. Hieracium rhombifolium pyrenaicum amplexicaule Tournef. F. R. H.

p. 472
Habitat in Pyrenaeis

Caulis erectus perithamni vel pedalis superne ramosus basi
ad radicem lanatus, pilis copiosis apice glandulosis, uti tota
planta ad presens si abrupit. Oculi radicales petiolata
oblongo lanceolata obtusa mucronata remote dentata
utrinque pilosa, caulina amplexicaulia oblonga denta
ta superiora cordata int. egressa ma acuta in culta
saepe dente uno alterove. Pedunculi et alii supremi
ramosi pedicelli uniflori hirti e pilis confertissimis
glandulosis viscosi vespis florem folio uno vel altero
lanceolata. Semina feminea
pilis brevioribus caule apice glutinosi glandulosis, caule magis
ramoso a villosa distincta

verte

amplexicaule pedunculo ramoso, foliis caulinis amplexicaulibus cordatis
dentatis, pilis glandulosis

Hieracium amplexicaule foliis radicalibus ovato-lanceolatis acutis
basifidatis, caulinis hastatis cordatis amplexicaulibus *Journ*
illustr. p. 50

Hieracium pulmonarioides foliis ovatis subdentatis hirsutis
pedunculis proleferis calycibus glutinosi *Vill. prodr.* p. 36
tab. 12. fig. 2.

Pluch. An. 194. fig. 1.

Ceranthoides G. Folis radicalibus obovatis denticulatis; caulinis oblongis ^{longicolatis} ~~pubes~~
semimplexicaulis ^{caule ramoso} Lin. V. p. 717 Joan. Ell. tab. 22. fig. 4

Hieracium pyrenaicum, folis ceranthi, latifolium Tournef. F. R. 4. 472.

Habitat. in Pyrenis costulis superne ramosis

Caulis ferratus, pilis longis adpressis profertim inferne superne
glaber. Folia radicalia elliptica lanceolata basi ^{in tercia}
petiolum attenuata integerrima vel subdentata dorso p. marg.

folia glauca
viridia

ne pilis longis hispida petiolo hispido spinoso. Caulis caulis a
lanceolata supra pubesca caulibus superne in ramis
flor. pedunculis ramosis duris; pedicelli apice villosi adpres-
si squamis subulatis remotis parvis Calycibus pelosis
varietatem habet solum. tota glabra. Pedunculi altitudine
fere aequales. semina nigra

Ceranth. caule ramoso basi ^{radicalibus} hispido spinoso, folis ellipticis denticulatis, caulibus
lanceolatis

varietatem ex herbo Parisino ded. In Schumacher caule folisque
glabris calycibus subulatis

Stipitatum A. caule subunifolio ramofo, foliis ^{ligurico hepatico} ~~dentatis~~ ^{capiteo latius} pappo ~~stipitato~~ L.V. p. 710

Fl. austr. 3. 8. 293

Habitat in Austria Sicumacher

Caulis vel pedis scapi cum folia nulla nisi unicum versus
medium lineare lanceolatum utrinque acutum pilis raris
negricantibus hirsutum. Peristomatibus a medio ad apicem
pilis longis negris prostratis versus apicem adpressis. Folia
radicalia petiolata acuta subintegerrima vel ut interdum
dentibus 3-4 utrinque remotis nonnulla subtrorsum latiora
alia utrinque acuminata. Flores terminalis solitarii Calyx
pilis negris hirsutus. Pappus pelosus stipitatus

Lentodon scapo monophyllo subramoso, foliis lanceolatis denticulatis
glabris

~~font~~ Hispania potius *Lentodon*

Staticeifolium Hieracium foliis linearibus subdentatis obtusis ^{glabris} caule multifloro
paucifloro

Hieracium montanum angustifolium non nihil inaequum Bauh. Pin 129.

Chondrilla foliis non desecto, caule nudo Bauh. h. 2. p. 1041.

Hieracium alpinum, foliis angustis, raro dentatis magno flore Segu: pl. Ver.
Suppl. p. 270.

Hieracium Hall. h. 482

Hieracium staticeifolium All. flor. Ped. 702. tab. 81. f. 2. Vill. fl. Delph. 85.

Habitat in alpebus 7

Caulis pedalis nudus foliolo in medio glaber teres bi. 3 florus
sanius quodam florus. Folia lineana raris dentata subtri-
cuna glabra. Calyx forinosus. Corolla sex-punctata raris

steris
Chondrilla foliis staticeis, caule nudo Tournef

Herb. Guss

similis inter stat. glauci. et pomfol. non satis sericeo

Scorzonera folia Villars. *A. glaucum* Allioni secund. Specimen habet. f. v. s. d. e. c. m. t. h. i.
tam asperant. Folia 3-4 pollicaria, lanceolata, caulina sessilia, minus, cava,
obscure remotissima dentata, avenia, enervia, costa pubes- marginata, caule calycibus
que pilosis. Caulis plures simpliciter, vel superne in pedunculo uno alterove
divisus, uniflori. Flores magni.

apula m

glaucum # foliis lanceolatis dentatis lanceola linearibus dentatis
integerrimisque caule multifloro ^{glaucis}

Theriacum *tragopogonis* folio Bauh. pin. 129.

Chondrilla folio non dissecto caule foliato Bauh. hist. 2. p. 1041.

Theriacum foliis lanceolatis glaucis caule bracteato mult.
flori Hall. hist. n. 40. p. 3.

Theriacum glaucum All. fl. Ped. 701. t. 28. fig. 3. et. 81. fig. 1.

Habitat

Caulis bicubitalis teres glaberissimus ³ subfoliosus sub ramis ²
sua medio, ramifus. folia radicalia elongata verno
te dentata, glauca, glabra basi ad radicem pilosa
pedunculi apicis crassiores parum squamis nonnullis setu
ceis sub flore villosi. calyx pilosus. flores exsiccatione
colorem non mutant

Cum porifolio conjungit La Chenal.

caulis interdum uniflorus. Scopoli porifolium huius prestat
fide specimen ab ipso accepto

ponifolium Hieracium caule ramofo foliofo, foliis lanceolato-linearibus subintegerrimis
Lin. *Spec. pl.* 112 p. *Boya* *fl. Lugd.* 1254 l. V. p. 717
Faique *fl. C. de Str.* 206. *fl. Ind.* p. 273. t. 6. *All. flor. ped.* 700. *Vol. fl. Delect.* p. 85.

B. Hieracium tragopoginis folio Bauh. Pin. 129.

Chondrilla folios non defecto caule foliato Bauh. h. 2. p. 1041.

Hieracium glandum All. *fl. ped.* 701. t. 20. fig. 3. et t. 81. fig. 1.

ae.

Hieracium alpinum angustifolium oblongoque folio Bauh. *prodr.* p. 64. n. 8.

Hieracium montanum appodali folio Boerh. *mus.* p. 147. t. 106.

Habitat in alpebus austriacis, Italiae, Valleis &

caulis subaphyllus nisi foliolum ^{tubu linear} in medio cauli et sub ramulo

Lin. *supra*
Boerh. *planta*
a *propoli* *donata*
huc *pertrans*
huc *ad glaucum*

glaber, teres, striatus, glaber superne in pedunculo dicos durfus
interdum simplicissimus uniflorus. folia radicalia angusta
in petiolam attenuata glabra, integerrima vel dente uno
altissime culta dentibus pleribus remotis. Flores terminaliter
solitarii Pedunculus sub flore inraspatus adpressus squamis
nonnullis subulatis. Calyx basi pilis cinerascens. Corolla
et sicata vixi negrians

West.

alpinum

Taraxaci foliis lanceolatis dentatis glabris, scapo fibrato unifloro, calycis
hispido Lin. Spei: pl. p. 1125* S-V. p. 716. herb. obs. Bot. 4. p. 30. 107. t. 2.

Pinnis scapo unifloro hispido, foliis glabris pennatis, calycibus hispidis
Sprengel Hall. herb. n. 27

Habitatio Alpibus Lapponiis, Helvetiis

Radix prostrata. Folia plerumque glabra rarius subhispida interdum
nuncinata vel profunde dentata, rarius uno alterove integerrimo
nono dentibus retrosum spectantibus. Scapus digitalis vel dodran-
talis inferne glaber, nudus superne aequo⁴ ligulis adpressus.
valde apice valde hispidus incrassatus. Calyx hispidissimus mini-
me imbricatus Pappus plumosus La Chen: in Act. Helvet

Pilosella H. foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo
unifloro Lin. I. V. p. 716

Pilosella major Cam. epit. 709. Duchf. hist. bot.

Pilosella major repens hirsuta Bauh. pin. bot. 262.

Habitat in Europa passim aridis &

folia lanceolata vel obovata integerrima supra pilis longis raris
adspersis subtus incanis scapus digitalis vel fistulosus superne
canescens corolla sulphurea radii subtus purpurei

aunícula 4. foliis integerrimis canicollatis, stolonibus repentibus, scapo nudo multi
floro Lin. fl. Suec. 699 & V. p. 716.

Hasacium foliis integerrimis, caule repente, scapo nudo multifloro Hort. Cliff. 388.

Pilosella major erecta altera Bauh. pin. 262.

Hab. Italia Europa praevalens in agris &

sola in haren versus angustata, pallide viridia denticulis nonnullis vix
distinguentibus, glabra basi ad marginem pilis longis ciliolata. Folia

stolonum familia. Scapus fruticulosus erectus satis nigris ad pres
sum, uti calyx profertur apertus sub calyce tomentosi. Flo. saepe uni
fidi
chis interdum tres in umbella

quomodo haec aunícula, dubium et cymosum inter se differunt mihi
adhuc latet

1
Crocium 4 foliis linearibus - canaliculatis subdentatis pappo unifloro superne villosa
incrassato subscamoso
Habitat in Austria

Planta perithama. foliorum dentes parvi remoti. folia obtusiuscula
micronata subtus in costa adpressa pilis aequot rarioribus.

Receptaculum basi attenuata, pappus inferne glaber superne squamis
paucis setaceis remotissimis opus a uti calyx pilis brevibus subane
sentibus. Pappus plumosus sespili

in collect. Gaiqu-desimb.

Stachys folium H

rumicula Heracium foliis lyratis ^{integris} *Calyculis tomentosis caule procurrente*

Heracium alpinum *incanum* *scabre*, *petioli alato dentatis*
caule prostrato Boiss. *musc.* 2. p. 33. t. 24

Heracium tomentosum *integro folio* Boiss. *musc.* 2. p. 33. tab. 24.

Heracium foliis ovatis integris canaliculatis integris dentatis
petiolatis petiolis dentatis Hall. *hist.* 42.

Crepis pygmaea *foliis ovatis integris villosis petiolatis*, *caule pro*
cumbente Lin. *Spei.* 1131.

Leontodon dentatum *foliis ovatis*, *petiolis dentatis*, *capo uni*
floro Lin. *mant.* 107.

Heracium rumicula *scapulis unifloris*, *foliis ovatis petiolis*
delatis denticulatis Lin. *mant.* p. 279

Heracium pumillofolium *caule ramoso multifloro foliis*
lyratis tomentosis, *pedunculis unifloris* *Jouan. illustr.*
tab. 22. fig. 3. All. fl. ped. n. 784. tab. 15 fig. 2.

Habitat

caulis purpurascens glaber angulatus ramosus, *rami decum*
bentibus demum erectis. *folia pro longe petiolata folia in*
alio ovata denticulata crassa tomentosa. stipe nuda. in alio
fascia Barbarea, pedunculis oblongis alternis 5. 6 in petiolo de
cumbentibus triangularibus terminalis maxima denticulata

glabrum Hieracium

petioli ampliter caules. Pedunculi axillares solitarii uniflori apice valde
tormentosi intarsi interdum foliolo uno alterove. Calyx squamis lanico
latis imbricatis - interdum dentibus tantum in petiolo.

Dubium H. foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus; scapo nudo multi-
floro Lin. S. V. pag. 425. 7164
Pilosella major ^{minor} repens hirsuta Bauh. pin. 262.

Habitat in Suecia 7.

Folia radicalia in caespitem congesta, cuneata, obtusa, integerrima vel
denticulis minutis vix conspicuis, basi ad marginem ciliata, utraque
late viridia, glabra, aut raris pilis albis mollibus adpressis, tactu molli.
Scapus digitalis, glaber, striatus; superne versus pubescens, simplicissimus
superne pedunculis aliquot simplicissimis unifloris pubescentibus. Calyx
pallide viridis pilis nigricantibus pilosus

an pedunculis simplicissimis a cymis diversa et absentia stolonum

Cymosum H. foliis lanceolatis integris pilosis, scapo subnudo basi piloso, floribus
sub umbellatis An. Spec. pl. p. 11264 s. v. 768 l. Dan. 4. 010

Hieracium maritimum angustifolium non sinuatum Bauh. prod. Bot. 67. p. 129

Pilosella montana hispida, parvo flore Bauh. pin. 262.

Pilosella, minori flore, hispida et elatior non reperit Bauh. hist. 2. p. 1040

Habitat in Norvegia Danica, Russia, Germania, Helvetia &

Radicis prostrata. Folia lanceola in petiolum attenuata, longiuscula
acuta, erecta utraque pilis rigidis canonicis, prope ad marginem
hispida. Scapus pedalis et ultra, adpressus pilis raris, basi confusis
thoribus, supra basin instructus foliolo uno alterove linearibus
lanceolato ciliato. Flores subumbellati; pedicellis ramosi. fructu

molle H. foliis lanceolatis subintegerrimis mollibus: inferioribus petiolatis, ^{oblongis} ^{caulinis amplexi-}
culis subcorymbosis ^{caulis lanceolatis} ^{floribus pedun-}
caulis. *taegu. austr. 2. p. 12. t. 119* *lin. 1. v.*

Habitat in Scotia austr. 4

Caulis simplicissimus pedalis adpressus pilis brevibus paucis que foliis.
Folia radicalia longe petiolata, oblonga integerrima basi attenuata
pilosi uscula saepe molliter villosa, caulina pauciora remotissima
superiora basi semiamplexicaulia lanceolata denticulata.
Pedicelli superne squamula apice uti calyx nigro pilosus

Chondnelloides H. caule ramoso, foliis caulinis elongato dentatis glabris; radicalibus lanceolatis glabris integris h. Spei. pl. p. 112 & v. p. 777. G. n. p. fl. austr. v. 5. p. 8. 429. Lind. 273. t. 7.

Hemacium alpinum pumilum, Chondilla folio Bauh. prod. 64. p. 129.

Habitat in Schneeberg Austriae inferioris

Caulis ~~erectus~~ ^{glabra} prostratus, puberulus, glaber interdum pilosus. Folia radicalia petiolata, anguste lanceolata integerrima interdum ^{glabra} ~~dentata~~ ^{dentata} uno altero ^{ve inferne versus}, remoto, ~~inferna~~ ^{caulina pennatifida inferiora} petiolata superiora sessilibus lacinis linearibus angustis suboppositis integerrimis. Pedunculi et alii superioribus altitudine caulis pauci uniflori subnudi tractus una vel altera superiore petala apice villosa. Calyx nigro hispido erecto imbricato foliolis linearibus

Chondnelloides H. foliis radicalibus linearibus lanceolatis indivisis, caulinis pinnatis

incanum # foliis integerrimis subdentulatis lanceolatis scabri, scapo unifloro
Fac. fl. austr. vol. 3. p. 207

Geracium montanum V. Clus. pann. p. 445.

Geracium montanum angustifolium nonnihil incanum
Bauh. pin. 124.

Geracium montanum V. Clus. Bauh. hist. pl. 2. p. 1030

Apargia incana Scop. Carn. n. 982

Habitat in alpebus

incanum *Centodon* foliis linearibus lanceolatis subdentatis integerrimisque mollibus
conspicentibus calycis villosi

Folii radicales pollicari obtusi et pilis stellatis villosi ^{molliter} incanus
scapus palmatis villosus sub flore panum cuspis aphyllus. Calycis folio
lis linearibus lanceolatis adspersi pilis stellatis uti reliqua planta pro
setta in ad marginem Pappi stipite brevi