

Hillia

Coryiflora Stellia corollae sexfidis; laciniis lanceolatis revolutis, foliis ovatis acutis  
Tw. prodr. pag. 4. P.

Stellia parasitica Lin. S. V. pag  
Habitat in montemat. ad Ryan.

Rami teretes, glabri, uti ~~tota planta~~ succosi, glabri, uti ~~tota planta~~  
Folia petiolata, opposita, oblonga, ovata, tripolliciana, pollicaria  
2 vel ultra lata, subovata, avenia obscure nervosa, adumena  
ta, integerrima.

Petioles unguiculares.

Flos terminalis, sessilis inter stipulas duas: oblonga <sup>stipula</sup> membranacea  
obtusae, pollicares.

Corolla tubus quadri vel quinque pollicaris, glaber, sessilis, faucibus  
invasato: laciniis limbibus, pollicares.

parasitica H. Ellis

182 190. Montserrat

parafitica *Hellea* Lx. *Spei: pl. par. 1662. Jacq. h. t. 66. I. V. p. 344.*  
Habitata in America meridionali parafitica h.

longiflora *Hellea* corollis sexfidis, laciniis canaliculatis revolutis, foliis ovatis acutis  
Schw. prodr. p. 50

Folia petiolata opposita oblonga acuminata y labra subtus  
pallida aeneo basi acuta bi. f. trepollicaria

Ferena Vandelli Flor. Lus. et Broj in Armer. si rept. de plant. hup.  
etc. par. 90. tab. 6 fig. 0.

Deter. quere inter  
amar

tetrandra *Gallia corollis* quadonfidis tetrandoni, laciniis ovatis, foliis ob-  
ovatis Schw. prodr. p. 50  
Habitat in Jamaica

non vidi