

Hippocratea

80 Hippocratea Cal. 5-phyllus. Coc. Petala 5. Caps. 3. Nectar. carno  
sum & aminiferum. Caps. 3. compressa, ~~mediis~~ 2-valves, medio  
dehiscente.

adde ~~Caulis. Folia herb.~~ <sup>dichotomi</sup>  
Ram. teretes, glandulosi. ~~Folia petiolata opposit.~~ Radiculi axillares et terminales

*Disperma Hippocratea* cymis axillaribus dichotomis, foliis ellipticis,  
ciliatis, capsulis lanceolatis.

Habitat in India orientali.  
Caules scandentes? Rami teretes vix oppositi. Folia opposita glabra venis basi  
veque integerrima parum acuminate obtusiuscula. pedun-  
culi oppositi dichotomi foliis brevioribus filiformibus flori-  
menatis. Capsulae glabrae striatae pollicares.

de Wieden spec.

~~pratenfis tuis umbertis foliis linearibus planis pubescentibus, caule fuffuloso brenonibus, germinebus turgidis La Mark T. Enc. pag 123. tab 33. fig 4.  
Habitat in Helvetia, Germania et pratis 7~~

in herbario  
idem forte cum germanica

Scandens Hippocratea

et. hols et amenia

Rami oppositi, oblique tetragoni patentes semi q. lobi folia  
petiolata opposita oblonga utrinque glabra obsolete nervosa  
venosa subacuminata acuta serrata, basi versus integerrima  
nervosa bi p. In pollicaria. Petiolus semina quicula  
xi. Panicula terminalis <sup>gemina</sup> dichotoma folio longior  
ramis divaricatis flores parvi frax ferrugines subtomentosi

obcordat. scandens  
solubilis. 1.  
Obcordata

Hipporhatea foliis ovato-lanceolatis ~~ve~~ ob serratis, capsulis ob  
cordatis. Lam. rh. illustr. t. p. 100. t. 20. f. 1

Hipporhatea scandens Jacq. hist. 9. t. 9.

Habitat in America meridionali v. Rorh 4

Rami purpurascens, coeternum ut in sequente. Folia uni ad tripolli  
# pollicem vel trina, # parum acuminata, <sup>inferne</sup> base ~~causa~~ integerrima. Stipula min  
parum ultra sa, betacea, in axillis foliorum. Panicula rami, ut in ovata et flore, ut  
data in ovata.

repl. tri V. floribus tubulosis flori foliis pinnatifidi laciniis lanceo-  
latis serratis, caule glabro.

Habitat in Sibiria

Caulis herbaceus erectus pedalis. Vires purpurascens pro  
plicis spinis ~~longis~~ <sup>caulis</sup> oculo armato. Cortex pulverulentus  
Folium <sup>arvensis glabrum</sup> pinnatifida bipollicaria laciniis lanceolata

alcom misit

sub nomine

repl. tri

laciniis omnibus

subtrahi formibus

frequentibus

dente uno - duo

bus vel tribus serratis

est cepto in aetate

duobus foliis

terminalis triplo

serrata serratis 1. 2. 3 interdum tantum in altero latere  
interdum utraque rarisime integerrimo, acutiusculo  
opposito intenois sensim minoris et angustioris. ~~longioribus~~  
in his basi canaliculata. Bimbo armato pulverulentus  
Corymbo longiora. Pedunculi at ex axillis supremis  
in corymbo trichotomo

Valeriana <sup>lutea</sup> juniperi Am. Ind. 1. p. 25. t. 3. retinens a Wild  
a Lin. <sup>Sibirica</sup> Gmel.  
Gmel. 6. Valeriana prosera, foliis ovatis & acutis  
galericulato Am. Ind. 19. 21. 26. Gort. 1. p. 207. t. 9  
Sibirica Jacq. Wild.

volubilis  
ovata  
ovata

<sup>Lanceolato-elliptica</sup>  
<sup>obtusata</sup>  
2. Hipporatea foliis oblongo ovatis lanceolato ellipticis serratis, capsulis  
lis ovalibus.

Coa standens, fructu trigemino, subrotundo Plum. gen. p. 42. t. 76. f. 807.

Rejuno pendulus, foliis paniculatis Coeff. i. 314.

Hipporatea volubilis Lin. Syst. Veg. 84.

Hipporatea ovata; foliis ovalibus leviter dentatis, capsulis ovatis  
integerrimis Lamark. Illustr. 1. p. 100. t. 28. f. 2.

Habitat in America meridionali von Rob., in Puerto rico West. J.

Rami teretes laevs. folia bi-tripollicaria, supra nitida. An Petiol.

# utrinque  
obtusa,

purpurascens, supra canaliculati. Panicula rami divaricata, ut  
flexas leviter ferrugineo tomentosi. Ebor nudi. Capsula subtripolli-  
caris, pollicem fere lata, obtusissima, raris emarginata.

Planta in Capsula in figura Plumieri brevioribus et rotundioribus foliis

# Serraturis ob-  
soletioribus,  
utrinque obtusio-  
ribus quem

minora magisque oblonga <sup>serraturis et soletioribus</sup> in Spec. minibus a Westio missis, Bohmii  
autem planta optime convenit quoad folia cum Plumieri, ambo  
vero non nisi varietates ejusdem speciei esse credo

Longata 3. Hippocratea foliis ovato-oblongis obsolete crenatis, pedunculatis floribus  
que Somniferis.

Habitat in Cayenne Richardi &

Rami inferne verdes, glabri; superiores tetragonae leviter ferrugineo-tomentosae.

Folia tripollicaria, obtusiuscula, utrinque glabra, nitida, subtus rufescentia,

tenuissime venosa. Petioli purpurascetes, laevet. Pedicelli duo una flori  
in diversis panicula. Inflorescentia, ut in ovata, pedunculi et flores.

Fructus non vidi, at habitu a reliquis speciebus mihi notis recedit,  
ex auctoritate Richardi huc retuli.

45  
Cochinchina  
Fam. Passeriflorae subseriale subseriale, floribus congestis



~~affera Hippocid foliis ovatis subrotundis glabris subtus venosis apertis La  
Mark T. Enci pag. 101.  
Habitat in Cayenna.~~

non vidi

Tersella forte

viridis 4 Hippocratea. foliis ovatis obtuse acuminatis serratis, <sup>integerrimusque</sup>  
foliis brevioribus, capsulis ovalibus emarginatis. + pedunculis

Hippocratea viridis; Corymbis dichotomis, foliis ovatis obtuse acuminatis  
8 l. per. l. p. 44. 74. f. a.

Habitat in nemoribus Andium 7

Tota glabra. Rami bracteati. <sup>interdum</sup> folia patentia, oblonga vel ovata  
subseriata, supra nitida. Petioli contorti, breves. Pedunculi foliis  
dimidio breviores. Bractea ovata, acuta, concava. Flores lutei.  
Stamina in unum Petala apice

involvenda coccinea, superne libera. Anthaxa superne dahis enter  
germen obovatum, trigonum. Stylus apice trigularis. Stigma trigo-  
num. Capsula pollicaris.

multifloro Hippocratea

Habitat Cayenne herb. La Martini

Rami glabri. Folia tripollicana, oblongo-ovata, integerrima, glabra  
crenata, supra nitida. Pedunculi axillares et terminales, plurimi  
pollicares, subcymbofi, bi- & triflori. Flores glabri

Disperma 5. Hippocratea foliis ellipticis acuminatis serrulatis; capsulis lan-  
ceolatis dispermis utrinque obtusis.

Hippocratea indica; foliis ellipticis obtusiusculis crenulatis; cym-  
bis axillaribus Wied. spec. pl. 1. p. 193. ?

Euonymoides  $\beta$ . foliis <sup>oblongis</sup> obovatis <sup>ve</sup> apice integris integ<sup>ve</sup> emarginatis <sup>ve</sup>.

Habitat in India orientali, Pinghalensibus Pandura dicta. Rottler.

Tota glabra. Rami ~~laeviter~~ ~~laevi~~ ~~foliis~~. Folia bipollicaria,  
~~et acuta vel obtusiuscula~~ ~~exteriorum~~ ~~obsoleta~~ ~~serrulata~~, membranacea, glaberrima, ~~pauciflora~~  
glabra. ~~venis~~, supra obsolete <sup>nervosa</sup> ~~venosa~~; ~~pubes~~ ~~venosa~~. Flores paniculo folii  
~~braviores~~. Flores ~~minuti~~ glabri. Capsula pollicares, ~~triata~~ ~~mediocri~~  
 $\beta$ . differet ~~racemis~~ ~~superne~~ ~~obsoleta~~ ~~tetragonis~~, ramosis pimis: foliis dup. triplo  
vel quadriplo minoribus: paniculis floribus paucioribus.

*Hypochaeris radi* comitis *Dichotomi*, foliis ovatis obtusis acuminatis fl. Pinnis.  
p. 44 tab. 74 fig. a

Habitat in nemoribus andum.

Glabra. Caulis fruticosus, glandulosus, teres, ramis. Rami bracteati. Folia opposita, petiolata, patentia, cum sine obtusis terminata, integerrima, submembrana supra nitida, nonnulla oblonga, ciliolata, serrata. Petioli ciliati breviter. Pediculi axillares et terminales, foliis dimidiis brevioribus. Bractea ovata, ciliata, ciliata. Flores ciliati. Capsula pollicaris, undecim. Stamina in unicum germen in solvenda, coalita, superne libera. Anthera superne dehiscentes. Germen obovatum trigonum. Stylus apice truncatus. Stigma 3 gorum. fl. Pinnis

paniculata 6. Hippocratea foliis oblongis <sup>utrinque</sup> acutis obtuse serratis.

Habitat ad Sierram Leonam. Ex herbario Fussioi

Rami ~~laevissimi~~ nitidi, patentissimi, ad articulos compressi dilatati, apicem  
compressi. Folia tri-quadripollicaria, membranacea, utrinque gla-  
~~ba~~ pallide viridia, venosa. Pedunculi foliis dimidiis breviores,  
planis dichotome divisi. Flores ~~pauci~~  
erectum non vidi.

macrophylla Hippocratea

Habitat ad Sierram Leonam herb. Guss.

Rami teretes, glabri, laev. Folia petiolata, opposita 5-6 pollicaria, <sup>oblonga</sup> pallide  
viridia, membranacea, venosa, utrinque glabra, supra nitida, basi obtusa,  
apice acuta, panem acuminata, integerrima. Pedunculi axillares di-  
chotomi.

macrophylla 7. Hippocratea foliis oblongis acuminatis integerrimis nitidis,  
basi obtusis

Habitat ad Sierram Leonam. Ex herbario Fuspidi &  
Rami glabris, laxis. Folia quinque - sex pollicaria, perum  
acuminata, membranacea, pallide viridia, venosa, utrinque  
glabra, supra nitida.

Ternum non vidi. Distincta ab antecedente



obovata ~~Hippocritea~~ foliis obovatis integerrimis rigidis, paniculis com-  
pactis multifloris Act. Soc. h. n. Par. 1. pag. 106  
Habitat in Amer. merid.

non vidi

comosa P. Hippocratea foliis subcordato-ovatis acuminatis integerrimis, pedunculis multifidis capillaribus, capsulis oblongis obovatisve.

Hippocratea comosa; paniculis comosis, pedunculis multifidis capillaribus, foliis ovatis acuminatis integris Swartz prodr. 17. 86. ind. occid. 1. p. 77.

Habitat in sylvis Hispaniae interioris.

Caulis aforescens, altissime scandens: Rami divaricati, reflexi, penduli, laeves. Folia sensa tri-quadrifollicularia, lata. Panicula ramis erectis, in infinitum divisis; pedunculis pedicellis capillatim terminatis, copiosissimis; unifloris. Flores minutissimi, polygami, paucissimi fructiferi. Petala neut Petala oblonga, obtusa, apice reflexa, alba, persistentia. Nectanum germen cingens illique adhaerens, carnosum, depressum, integrum. Filamenta margine interiori nectarii inserta. Stigma trifidum. Capsulae bivalves, leviter striatae, medio longitudinaliter dehiscentes. Nuclei quatuor, oblongi, angulati, initio molliores, dein indurati, apice alato.

Habitus. Arborei scandentes: Rami <sup>laevi,</sup> patentissimi, terne veretes, glabri, superne subtetragonis. Folia petiolata, opposita, glabris utrinque glabra. Panicula axillares, terminales, dichotoma opposita, dichotoma. # Capsulae # Flores minuti glabre.

Como 90  
Officinarum solum subterrore de ...  
o ... in ...