

Hippomane

1. mandinella H. foliis ovatis serratis basi biglandulosis
2. biglandulosa H. foliis ovatis oblongis basi biglandulosis
3. pinoza H. foliis subovatis dentato-pinozi

Spinosa # foliis subovatis dentato-spinosis Lin. S. V
Glex, agrifolii folio, americana Pluk. alm. 197. tab. 196. fig. 3.
Mancinella aquifolii foliis Plum. gen. 50. fig. 177. fig. 1.

Habitat in America Calidior & herb. Mus.

Rami teretes glabri, trichotomi ciliati. Folia petiolata altera
na, oblonga, utraque glabra, supra nitida, venosa, subtus pallida
obfolata venosa, margine dente uno alterove spinoso, saepe integerrime
apice obtusa cum spinula, interdum tridentata, utraque spina
unica absque intermedio

manicnella # foliis ovatis serratis basi biglandulosis Lin. S. V. Faïgu.

am: 250. tab. 159

ma tus americana, laurocerasi folio, venenata Comm. hort. 1. p. 131.

tab. 68.

Arbor venenata Manicnello dicta Plukn. phyt. 142. fig. 4.

Juglandi affinis arbor julifera Castoreo venenata pyrifolia

Boan hist. 2. p. 3. tab. 159.

manicnilla pyrifolia Plum. gen. 50. Cat. herb. Carol. 1. p. 95 tab. 95

Habitat in Cambois, foliis in undatis 5

Cortex cinereus glaber ramis crenatis. Folia petiolata
palmata, ^{obtusius v. ang-} acuta glabra. Amer. tum Verminali. Flores alterni
distantes. Pedunculis basi squamis caucolatis subulatis