

Hibella

1. Americana H. foliis ovato-lanceolatis ramulis hispatis, racemis erectis simplicibus, floribus pentandris
2. paniculata H. foliis ellipticis hispatis nitid subcoriaceis, racemis simplicibus erectis floribus pentandris
3. Anandra H. foliis lato lanceolatis, racemo composito, floribus triandris

Tachichita Aubl. huc pertinet. Eructus vero ad speciem Samyda
Pormobuena fl. Pormo hujus generis Yucan
western Segl. Huc combera Guay

Triandra Hirtella foliis oblongis acuminatis, racemis compositis laxis; floribus
Triandris Sw. prodr. pag. 51.

Hirtella americana Gaerth. Amer. pag.

Habitat in mont. ferrat. et Ryan 5

Rami teretes, fusci, punctati, subflexuosi, superne villosi.

Folia petiolata, alterna, trij. quadripollicaria, oblonga, acuminata
acuta, basi obtusiuscula, integerrima, supra obscure venosa, nitida,
utrinque glabra, excepto costa et nervi subtus exceptis, subtus
pallidiora, sic abriuscula

Petioles brevissimi. Stipulae utrinque subulatae, erectae, longit. semiu. quatuor

lani
Racemus terminalis, erectus. Pedunculi, ^{uti} pedicelli, bracteis et calycibus
ser. tomentoso-inicani, compressi: pedunculi partiales oppositi bini
vel ter opposi dichotomi. Flores pedicellati. Bracteis lanicolato-

Calycis

Filamenta tria, glabra

Stylus tri inferus, uti germen, villosus inicanus

Amensiana *Artella*. foliis ovato oblongis ramisque hirsuti racemi axillari
son ^{7ma persibirica} hirsuti & Cayenna hirsuti ramorum
calyxes

Rami ~~et~~ hirsuti petioli pedunculati ad costa foliorum hirsuti folia
alb^{tu} villosa acuminate acuta basi subovata brevissime petio
lata pedicelli prosi uniflori bracteata setacea ad basin
racemi folio duplo longioribus

pendula *Hirtella* foliis cordatis oblongis, racemis terminali

Habitat in India occidentali herb. Fus. 3

Rami teretes, flavescenti tomentosi. Folia subpetiolata, 4-5 polliciana, attenuata, integerrima, venisime venosa, supra glabra, subtus subvillosa. Racemus terminalis, compohtus, frithamou, flavo-tomentosus. Calyx basi gibbus: lacini rotundati. Stamina 3. Glabra. Bracteo subulata.

H. ellodes

Habitat in Senegal Herb. La Mart.

Rami teretes, glabri, superne villosi, compressi. Folia petiolata, 2-3 pollicaria,
alterna, ovato-oblonga, venosa, glabra, integerrima, acuta. Panicula
terminalis parva

Calyx brevis, 5que partitur. Petala 5que, linearia extus villosa. Stamina 5que.
Ovarium superum, 3is partitur. Stylus 1. Fructus oblongus villosus - tomen
toser.

cordato *Artella cordatis acuminatis supra glabris ramis hirsutis*
floribus *Ynandris*
Inj. West ex e Puerto Rico sub nomine *Westia glabra*
Rami teretes hirsuti proferunt versus apicem. Folia remoti alterni
Folia breviter petiolata altera cordato ovata, in acumine
attenuata, bipollicaria, integerrima venosissima, supra
nitida glaberrima subtus pallidiori costa et venis pilosis
Petioli brevissimi hirsuti. Stipula subulata hirsuta. Racemi
terminaliter erecti breves. Pedicelli solitarii capillares
ut peduncululus hirsutus, corvini pollicares uniflori
Bractea petiolaris 3 ad pag. basi pedicelli laterales
2 breviores. Calyx ^{sive fides} corvini altero latere
basi gibbo ^{sub} ^{petiolum} ^{detinente} infero pilis albis proferunt basi adpressis. Corolla
oblonga. Corolla calycis parum longior purpurea
glabra intus fornicata in latere germine profundiore
germen altero margine calyci adnatum

Triandra americana L. foliis lato lanceolatis, racemo composito, floribus triandris
~~foliis simplicibus floribus pentandris Lin. Suppl. p. 157.~~

Sp. V. p. 242 Hort. Cliff. 174

~~Triandra americana Mart. Bras. p. 78 f. 2. male~~

~~Triandra Hort. Cliff. 174.~~
Habitat in Brasilia & in Antillis

Rami teretes inferne purpureo-fuscescentes glabri punctati, fuscescente villosi
ubi ramuli. Folia petiolata, alterna lato lanceolata integer
rima acuminata nervis rarioribus in venis et costa utraque profertur
vero margine ^{tri}polliciana. Stipula fetacea brevis. Flores
in racemo ^{composito} terminali. Pedicelli ^{unculi} alterna ^{pariales} alterna ^{periclyari} pedicelli
breves ^{bractea} subulata ad basin paralicium et pedicellorum
foliola oblonga intus villosa ^{sericea}. filamenta purpurea

Hut Triandra foliis oblongis acuminatis, racemis compositis laxis, floribus
triandris. Sw. prod. pag. 51.
Hutella americana ^{Walp. h. v.} pag. 8. Tab. 8

paniculata Hirtella foliis ellipticis ~~hirsutis~~ ^{nitidis} subinaevis, racemis erectis,
floribus pentandris Schw. prodr. p. 51. Tab. XXX

Habitat in Cayenna de Kuhn

Rami teretes, cortice purpureo asperis, superne lictis.

Folia petiolata, ^{alternata,} patentia, coriacea, sesquipedaliter, cuneata parva
integerrima, venosa, hirsuta secundum venas, subtus dycolora

Petiolus brevissimus.

Stipula subulata, valde ^{hirsuta} ~~hirsuta~~

Racemi axillares, erecti, ^{pauci} ~~pauci~~, solitarii, foliis longioris, hirsutissimi
Pedicelli coriacei, unguicularis, alterni, inter solitarii, int. rarius gemini

Bractea lanceolata, longitudine pedicelli, extus hirsuta, alia ovata
ad basin pedicelli

Calyx extus ^{hirsutus} ~~pubes~~, colorata, intus tomentosa, subpicea.

Filamenta quinque, longa

Stylus basi hirsutus

Americana H. foliis ovato-lanceolatis ramulis hirsutis, racemis erectis simplicibus; floribus pentandris Sw. obs. pag. 94 &

Index nominatus Maniz. bras. 70. fig. 2.

H. Stella americana Aubl. Fl. Gu. pag. 246. Tab. 90

Habitat in Brasilia, Cayenna &

Rami ^{pauciter} rugati, sparsi, subduri; teretes hirsuti, uti ramuli. ^{breiter} Folia petiolata
albescens, ovata glabra, ^{acuminata} integerrima 3-nervi. Stipula lanceolata
sive. Racemi axillares erecti, hirsuti ferruginei. Flores pedicellati
alterni herbili

~~Ad defunctum~~

non vidi