

Hoffmannia

Lancea fl. Penins. ^{et} Bonari Cavan. uti et Hoffmannia et Zinnia qui
modo semperbus differunt

Larceda Oryza

Hort. Persicus

Caulis suffruticosus debilis folio ramosis, rami procumbentes, glabrescentes. ^{unat} Folia longe petiolata, alterna, remota, bipinnata, partialia quadripartita cum impari, opposita: propina petiolata remota, pari pennata, 7 puga: pennula subsimplex, opposita, oblonga, fere unguiculata res, glabra, altero latere angustior, obtusa integerrime glabra, avena, cinerea. Petioli univ. sales et partiali teretes, glabri, basi crispiores. ^{utroque} Stipula ovata, acuta, marcescentes. Pedunculus terminalis, superne uti pedicelli, bractea et calycis pubescentes. Flores racemosi, distantes. Bractea ovata, acuta caduca, calycis brevior. Calyx quadripartitus; lacini lineares. Filamenta 10, corolla breviori ad medium pelosi; gemmae glabrae in stylo acuminatum.

Hoffmansegghii falciana Caran.

Salvia

Si larca orientalis belonici o folio ~~acutissimo~~ como purpurascens Tournef. Cor.

ray.

Habitat in Onate herb. Mus.

Cubospermum