

Hordeum[?]

ciliatum Hordeum glomeris omnibus fertilibus antheris involucri
basi piloso ciliatis, pili fasciculatis La Mart. T. Enci. pag
208.

gramen hordeaceum distichon majus ciliatis glumis dures

Barr. ii. 112. fig. 1.

Habitatio Italia Vahl.

non mihi hanc satis notum

~~Handwritten scribble~~

bulbosum Hordeum flosculis omnibus ternis fertilibus aristatis, involucri setaceis ciliatis
Amon. ac ad. 4. p. 304. * S. V. pag. 126.

Gramen bulbosum ex Aleppo Bauh. prod. 4. Pin. 2. Theatr. 21.

2 Gramen secalinum bulbosa radice Barrel. ic. 112. fig. 2. Scheuch. germ. 19

1 Gramen secalinum chalyperse, radice tuberosa Mon. h. 3. p. 179. f. D. 7. 6. fig. 7.

Habitat in Italia oriente

Radix bulbosa, globosa. Culmus tripedalis. Spica Hordei minus. Flores flosculis
3. raris 2. pedicellatis. Involucella propria sunt aristae 2. basi subciliata. Gluma
exterior in omnibus flosculis, longa, aristata. Vagina summi folii ventri
cosa est. Lin. Am. ac. l. c.

non vidi

Fructum. Hordeum flexuoso hermaphrodito anstato: ansti utroque ad
presio, masculis duobus mutis subpedicellatis Desfont. fl.
art. pag 113.

gramen cristatum spicatum scalinum altissimum tuberis
radice Tournef. loc. 39

Habitat in Regno Tunetano.

non vid.

Nodosum *Hordeum* *flosculis* *lateralibus* *muticis*, *involvens* *stam* *eis* *lobis*. *Lin.*

Speci: pl. pag 126 S.V. p. 126.**

~~*Gramen*~~ *myosurides* *nodosum* *Rai. Angl. 3. p. 397. t. 20 fig. 2.*

Habitat *in* *Anglia*, *Italia*

Radix *bulbosa*, *copiosa*. *Flosculi* *laterales* *mutici*: *intermedio* *anistato*. *Involvens*
ea *sunt* *vere* *anistata*, *anistis* *purpurascens*, *flosculose* *longioribus*
similis *H. munito*

non vidi

pubatum Hordeum aristis involucrique setaceis longissimis Lin. Spec. pl. p. 116

p. 126

gramen hordeaceum, fructa aristis longissimis circumvallata Scheuch.
gram. 20. Barb. cent. 1. p. 33. t. 52. fig. 1.

Elymus crinitus fructibus unifloris scabris, involucri erectis Schreb. gram.
15. t. 24. fig. 3.

Habitat Smyrna

Habitus Hordei murini sed involucri et aristae setaeae quadruplo longiores,
quam tota fructa, unde singulari facies graminis huius.

non vidi

capense H. flosculis lateralibus masculis, involucriis fratribus Thunb.
Prodr. fl. cap. pag. 27.
Habitat in C. b. pice.

a proterse horti hew. forte non diversum

marinum
~~Geniculatum~~ Hordeum ^{Hordeum} flosculis omnibus anfractis, lateralibus masculis, in
 voluelli spatis: in teneribus masculorum femineis solatis

Hordeum marinum, flosculis lateralibus masculis anfractis, involuero
 interno florum lateralium semiovato Kuiz? flor. angl. v. 2. p. 57.
 cum synonymis

Hordeum flosculis lateralibus masculis anfractis Spei: plant. ed. 1. pag 85.

Hordeum geniculatum. Culmo decumbente foliis obtusis, summo spe
 theaeo spica subjecto, supremo nodo incurvato All. fl. Pedem.
 pag. n: 2274. v. 91. fig. 3.

Compositissime ad littora maris in Europa Australi et Barbaria

Hordeum imorinum Torrh. Desf. Catal. pl. Const. pag. 19. no 52.
 Variet exacte simillimum Hordeum murina

(Primo intuitu Hordeum murinum simillimum est

Culmi plures palmari geniculis infractis, glaber vagini foliorum
 tecti vagina suprema spathacea. folia polliciana oculo armato
 villosa. ^{spica} spica polliciana glabra disticha valvula angusta in
 anfractum ~~brevis~~ attenuata valvula corollae exteriori margine
 scabra ~~spica~~

minimum 4 Flocculis lateralibus masculis anfractis involucri inter
medii ciliatis L. S. V. fl. Dan. 8. 624.

Gramen hordeaceum minus. Et vulgare Bauh. Theatr. 134. pin. 9.
Schuech. gram. 14.

~~B. Gramen spicatum pedunculatum minus Schuech. gram. 17. Vall. parif.
P. 3. 7. 17. fig. 6.~~

Habitat in Europa locis ruderatis ☉

Calamus pedalis saepe in infractus vagans fructu. Folia villosa
marginibus scabra. Spica bipolliciana involucri anthera scabra
inter marginem sulvulae extenore corolla involucri interna
villosa.

Zointon H. flosculis lateralibus masculis muticis, feminibus angula
ribus patentibus ciliatis. L. Schreb. gram. 725. t. 17.

Hordeum distichum spica lata compressa brevior mon. hist.
3. p. 206. f. D. t. 6. fig. 2

Zointon f. oxyia germanica Bauh. pin. 22

Habitat ☉

Solia plana margine scabra. Spica ^{compressa} ovato oblonga disticha
flosculi hermaphroditarum bifariam utriusque serie unica
a lateri aristis longissimo scabra

Diffusion II flosculis lateralibus masculis muticis, feminibus angulatis
muticis ambriatis Lin. l. v.

Hordeum Diffusion Bauh. pin. 22. Mon. hist. 3. p. 10. t. 6. fig. 1.

13. Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis, feminibus angu-
latis ambriatis decorticiatis

Habitat O

inca Venueor quam in reliquis ³ polliciani feminibus pene solitana
utraqve

Heraphichon Th. Flop'ulis omnibus hermaphroditis anfractis feminibus
sex lanam equaliter dispositi Lin. L. V.
Habitat O

non vidi

5
vulgare H. flosculis omnibus hermaphroditis anfractis. ordinibus duobus
exterioribus Lin. S. V.

Hordeum polystrakon verum Bauh. theatr. 439. jun. 22. Monj

hest. 3. f. 0. 7. 6. fig. 3.

calide B. Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis feminibus decorticatis

Hor. up. 23.

Habitat. C

flosculi series femi duo ad latera extenui glabra anfracta
longissimo frabeminao