

*Норнемакия*

racemosa Glorne mannia.

Habitat in Caribois 5

Tristest, an scandens.<sup>2</sup> Rami verticillati, glabri. Folia petiolata, sparsa, bipollicaria et ultra, oblonga, vel oblongo-ovata, acuminata, acuta, integerrima, concava, glaber rima, supra obsolete nervosa, laniata; subtus venis venosa. Stipula nulla. Petioli vix unguiculares, purpurei. Pedunculus terminalis, erectus, glaber, <sup>no casus</sup> ~~pedicellis deciduis~~ <sup>pedicellorum</sup> catis, pollicaris: pedicelli alterni, conferti, uniflori, pedicello parum longiores, versus florem incrassati. Calyx monophyllus, superus, subcoriaceus, persistens: lacinis rotundato, persistentes. Corolla monopetalae, unilobata, calyce longior, persistens: lacinis ovata, acuta. Filamenta 12. basi corollae inserta, corolla breviora, plana, sursum sensim angusta, ad medium dorsum antherarum excurrentia. Antherae lateribus compressae, ovatae, acuminatae; acumine bifido. Stylus unicus, longitudine filamentorum a stigma obtusum. Baccis subglobosis, calyce coronata, perispermis, 6 loculis; per loculi polyspermis. Semina linearia, utrinque obtusa, subangulata, pallide flava, ope lentis punctulata.



Salsola

Habitat

Herb. Desfont.

Caulis herbaceus, hirtus, ramosus: rami erecti. Folia sessilia, pollicaria, lineari-lanceolata, integerrima, acuta, supra glabra, enervia, avenia, subtus punctata, nervi, costa margineque hirta. Racemus terminalis, spithameus. Flores oppositi solitarii, breviter pedicellati. Calyx campanulatus, striatus. Corolla connata: lobum superius rectum, concavum, villosum. Bractea subulata, longitudine calycis. Stylus corolla parum longior.

Bavan.

erectifolia Bavan forte