

Houffonia

Semina plura per Ruth

rotundifolia Radt Desfont. Capulae repentes

Lineari Houstonia

Habitat in Carolina montibus Muhlenberg herbis.

Caules teretiusculi, linea decurrens; ramosi, glabrae, ramosi: rami oppositi. Sili-  
opposita, semipollitana vel parum ultra, lineari-lanceolata, glabra, acuta, margine  
scabra, costarum tenuis, arenis, enerviis. Strobis terminalis. Calycis lacinis linea-  
ris. Corolla lacinis ope latis margine villosis.

*Serpyllofolia Houstonia*

— *Habitat in Carolina* Boech, Richard.

Caules procumbentes, filiformes, glabri. Folia petiolata, subrotunda, vix semina  
guicularia, glabra, integerrima. Peduncululi vix menales, solitarii, uniflori

ruba *Houstonia*  
foliis linearibus subornatis, floribus axillaribus solitariis Cavan. t.

5. pag. 40. tab. 474. fig. 1.

Habitat in America meridionali prope urbem Tomiquilpan

Caulis plerumque, pollicaris et panem ultra, striati, articulati. Folia acuta, angustata. Elongata subsessile. Calyx inferus, persistens, 4 partibus. Corolla rubra  
infundibuliformis. laciniis 4 ovatis filamentis infra faucem insertis.  
germen globosum. Stigma globosum. Capsula didyma biloculari bivalvis:  
valvula dissepimento opposita, superiore dehiscens. Semen unicum in pagulo  
loculamento.

*Goustonia*

*Gentiana nigriflora* La Mark.

Habitat in America boreali herb. Guss.

Caulis glaber, subramosus, superne tetragonus. Folia sessilia, opposita, pollicaria, linearia, acuta: ramuli ex omnibus axillis, Pedunculi superne terni, primum trichotomi, dein dichotomi. Flores omnes pedicellati. Folia floralia subulata, parva, Calycis laciniis 4or, subulata. Corolla extus villosa, infundibuliformis: laciniis linearibus. Stamina 4or longitudine corollae. Stylus brevior. Stigma caputatum. German inferum. Stylus stipulo 3-4 pedo.

*metichelloides - Howdenia*

Habitat in Carolina Michaux herb. Guss.

Caules filiformes, angulati, glabri. Folia subpeltata, vix angustularia, ovata, obtusa, subquinque nervia, obscura venosa, margine scabru scula, glabra. Pedunculi axillares et terminales solitarii, uniflori.

*pusilla* ~~W.~~

*Species dubia*  
Schöpf. I.

*vari*

longifolia H.

folia linearia, pedunculata axillaris solitarii vel gemini  
gemmae. de pinnis. et fruct.

non vidi



conulea Houstonia foliis radicalibus ovatis, caule composito, pedunculis primis bifloris  
Gronov. Voy. 15. S. V. pag. 149.

Paronychia facie planta tetrapetaloides virginiana, flore conuleo Mon. f. h. 3.  
pag. 614. f. 15. tab. 4. f. 1.

Rubia parva virginiana, foliis ad genicula binis, flore conuleo fistuloso Plin.  
alm. 324. Mant. 164.

β. Chamojasme inodora, alfine facie, dispermis tetrapetaloides, quadrato caule,  
virginiana Plin. alm. 97. Mant. 45. t. 97. fig. 9. Raii suppl. 502.

Habitat in Virginia

Plantae verna <sup>filiformis</sup> digitalis vel palmatis tota glabra superne ramis oppositis  
et lobis radicalibus oblonga plura, ~~oblonga~~, parva in petiolum desinentia  
pubescente, caulibus inferioribus quatuor, superioribus oppositis <sup>linearibus</sup> respice tan  
ceolata. Pedunculi duobus siliis elongati uniflori

purpurea *Houstonia* foliis ovato lanceolatis, corymbis terminalibus, floribus superis gronov.  
Virg. 15. t. 1. p. 149.

*Rubia maritima*, alpinis majoris folio ad caulem binato, flore purpureo ruben-  
te Plur. marit. 164. Raii suppl. 262.

Habitat in Virginia

An diversigenens? ha

Caulis simplex, erectus, semipedalis, tetragonus, glaber, superne raris pilosus.  
Folia sessilia, opposita, remota, pollicaria, acuta, ternaria, costa marginisque raris  
pilosa, subarenis, junon supra villis raris sumis, levia. Stipula ovata,  
membranacea Herb. Turc.  
variet folus latioribus et angustioribus