

Hydnocarpus

5-1941

Hidnecarpus Gortn. de Suet. pag. 200. ~~tab~~ tab 60. fig. 3.

Character essentialis

♂ Pal. 5-phyllus. Cor. 5-petala. Nectarium squamosum

♀ Massa supera.

inebrians Hidnecarpus

Martini lin. fl. zyl. no 637.

Hidnecarpus venenata Gortner l. c.

Habitat in Ceylona & Honig &

Arbor. Rami tetesi, flexuosi, glabri, cortice cinereo.

Folia petiolata, alterna, patentia, palmana vel subpeltata sa,  
vel ultra  
pollicis duos caetera lata, lanceolata, acuminata, remota et le  
viter serrata, subinque glabra, supra venosa nitida, subtus palli  
diura, nervosa avenia: vena supra in arbo foemineo minis  
obscura.

Petiolus unguiculans

Pedunculi axillares, petiolo parum breviores, solitarii, multiflori,  
lati: pedicelli brevi, simpliciter vel villis densi, uti pedunculi et calycis  
griseo-flavescentes

♂ Cal: peranthium pentaphyllum: folioli duobus extenonibus ovatis, internodiis tribus  
subrotundis concis parum majoribus

Cor: petala squerique, oblonga, longitudine calycis, margine villosa albedi.  
Nectarium <sup>ad base</sup> squama, <sup>basis</sup> ovata, <sup>peritely</sup> castus glabra, intus e pilis brevibus densis aures nitentibus  
tomentosa, petalis parum brevior.

Stam: filamenta squae ovata, crassiuscula, acuminata ~~et~~ longitudine petalorum  
anthera erecta, angulata, oblonga, parva

♀ Barca globo-depressiuscula, magnitudine pruni, tomento sordida flavescente  
teiba

(Flores foemineae non vidi, in speciminibus a horticulis messis fructus tan-  
tum adest