

huc refer Spurantha

Hydrocotyle

1. vulgaris H. foliis peltatis, umbellis quinquefloris pedunculis brevissimis
2. umbellata H. foliis peltatis umbellis axillariis floris saepius folis longioribus.
3. capitata H. foliis peltatis multilobatis; lobis subdentatis, saepius longitudine foliorum, floribus capitatis numerosis
crenis intergerminis
4. elongata H. foliis peltatis reniformibus crenato obsolete lobatis, ped. saepius
petiolisque
longissimis, floribus capitatis
5. americana H. foliis reniformibus sublobatis creis lobis crenatis, umbellis 5floris
6. transversa H. foliis reniformi transversis ovalibus lobatis, lobis intergerminis
7. asiatica H. foliis reniformibus inaequaliter dentato crenatis dentibus creis
inferioribus acutioribus geniculis ramulisque sublanatis
8. nummularia H. foliis subrotundo reniformibus brevissimis petiolatis obsolete
lobatis, floribus subsessilibus
9. chelidoniis H. glaberrima, foliis cordato ovalibus obsolete dentato angulatis
pedunculis brevibus unifloris
10. moschata H. foliis reniformi subrotundis obsolete septemlobatis lobis dentatis
et pilosis, capitatis pedunculatis decemfloris

11. *hespita* H. *hespita*, foliis reniformi subrotundis lobatis crenatis, floribus verticillatis: verticilli decemfloris.
12. *filicaulis* H. *glabra*, foliis reniformi subrotundis obsolete lobatis crenatis, scapis filiformibus, floribus ^{capitatis} ~~oblongis~~ ^{dentatis}
13. *erecta* H. foliis cordatis crenatis, scapis paucifloris longitudine foliorum
14. *ranunculoides* H. foliis quinque partitis unisquis
15. *stellata* H. foliis palmatis quinquelobis, subtus pilis stellatis unianis
16. *villosa* H. *tomentosa*, foliis cordatis integerrimis ~~longe~~ ~~subrotundis~~ villosis
17. *indentata* H. *tomentosa*, foliis linearicuneiformibus apice tridentatis
18. *Solantra* H. foliis cuneiformibus ovatis septem dentatis
19. *glabrata* H. foliis obovatis ~~oblongis~~ ^{sub}lanicollatisve acutis tri nervis glaberrimis
20. *linifolia* H. *canescens*, foliis linearibus ^{sub}spathulatis, internodiis brevioribus
21. *chrenops* H. foliis linearibus, caule repente, umbellis multifloris
22. *virgata* H. *glaberrima*, foliis semiteretibus linearibus foliis exantibus internodiis longioribus caule erecto
23. *trifida* H. foliis tripartitis lacinis apice subtrifidis, scapo ascendente umbella radius trifloris

linearis

e nova anglia No 1
Caulis ramosi, repentes, folia radicalia
a lica caule repente

H. verticillata
ovale
glabrata
articulata
in d. infu
radicata
in folia

(Indasiens
pauciflora) Benth.
Benth.

Dentata Hydro-dyle foliis cordatis, dentato-crenatis supra subtus pubescentibus, petiolis ^{sub}superne tomentosis, pedunculis trifloris

Habitat in Guadeloupe Escr

Caulis repentes, glabri. Folia petiolata, semipollicaria, subcordata, sinuato, apice rotundata, acute crenata, supra glabra, vix venosa, subtus nervoso-venosa, villisque raris adspersa. Petioli longitudine foliorum, superne villis longis subtomentosi. Pedunculi axillares, solitarii, villosi. Flores tres, sessiles.

tetrandro Hydrocotyle foliis reniformi² subrotundis obsolete crenatis, pedun-
culis subtrifloris

Habitat in Guinea Ised

Caules herbarici, repentes, teretes, leviter striati, glabri. Folia ad sin-
gulum nodum plures, petiolata, pollicaria, obscure simpliciter
venosa, pubescentia, minime lobata, glabra. Petioli 3-4 pollicares,
striati, glabri. Pedunculi axillares, plures, petiolo quadruplo be-
riores. Flores sessiles, 3-4, Tetrandri secundum Ised.

umbellata Hydrocotyle

von Rohr

Folia pollicem lata glabra crenata. pedicelli capillares ultra
vaginati.

Lunata Hydriotyle

Habitat herb. La Mantini

Caules filiformes, procumbentes, glabri. Dolea longa petiolata, saepe semipollicem
lata, basi subtransversa, obtuse dentata. Petioli tomentosi.

Spicata Hydrotyle

Habitat in Domingo West Ind.

Caules repentes, ciliiformes, glabri. Folia petiolata, reniformia, subrotunda, crenata
supra minus pilosa, subtus incana, uti petioli et pedunculi. Spica laterales, bisque, por
ticatae, interrupta, multiflora, pedunculata, flores aggregati

Ruspidata *H. p. micatyle* folus subrotundo reniformibus sublobatis crenatis petiolisque sub
hispidis, sic apud petiolis squaratis.

Habitat in Pene

Petoli 4-5 pollicares, pubes vestigiis hirti profertim apice. Folia semipollic^{em} lata
sq^{ue}cei subtriang^{ula} lobata: lobi crenati venosa, utrinque in venis ad nervis subtri
pida. Scap^{us} filiformis; longit^{udo}ne petioli, superne pubes. umbello simplicis
multiflora
prope americanam.

peruviana Hydroidyle folii peltatis dentatis, pedunculis petiolis oquantibus.

Habitatio Peru herb fus.

Caulis repentes. Folii subrotunda, basi pau parva, ^{inungulari} ~~ret~~ laminae ^{em lata} ~~em~~ ~~latu~~, crassa, ~~cauly~~ ~~cauly~~
obsolete nervoso-venosa, glabra obtusidentata. Umbella circiter 20 flora. Petiol.
pollicares
prope umbellata

moschata Hydnothyle

Coster

Habitat herb. mus.

Caules filiformes, repentes. Folia reniformia, parva, villosa, uti caulis, sublobata,
acuta dentata. Flores in capitulo parvo pedicellato

Hydrostyle

Habitat in Bonaria Commerf. herb. Guss.

Obliqua lata, angulata, dentata. Pedunculus elongatus, parthiales verticillati, quaterni
pedicelli plures verticillati, saepe iterum pedunculus parthialis e verticillo infimo
parthiali: radii alii simplicissimi, rari flori, alii apice umbelliferi, alii longiores, bi-
fidi: pedicelli verticillati

Licanoder Hydrotyle

Habitat herb. Fusf.

Folia cordata, angulata, glabra. Pedunculi petiolo breviores; sub quinqueflori

Hydrocotyle

Habitat ad fectum mayllanicum Commesif. hab Mus-
Caulis repentes.

habes

Hydrostyle

Habitat in Madagascar Comines. herb. Mus.

habes

Subthoracodes Hydrocotyle

Habitat in insula Francie Commerçon herb. Gesf.

Caulis repens, filiformis. Folia reniformia, ^{transversaria} unguicularia, crenata, longe petiolata, gla
bra. Pedunculi fere pollicares. Flores cistiter. Sessiles

Cochinchinensis in *Tripartita* Linn. fl. Cochinch. pag. 176.

Per equinum Rumph. amb. Lib. 9. c. 69. tab. 169. fig. 1.

Habitat in India orientali, China.

Caulis filiformis simplicispinosus. Flos longus repens. Folia
subrotunda simpliciter, dentato-crenata, concava, rugosa,
glabra. Petioli conferti, longi, erecti. Pedunculi communes longi
fiori radicales, congesti, pauci. Cal. communi folioli lanceo-
latis persistentibus. Propter ophyllus coriaceus papilionis
siue denticulatus. Germen orbiculatum. Stylus O. stigmata
2 oblonga reflexa. Pappus pappi laticulatus truncatum
factus ex ipso calyce 2 filium repartibile. Semina reniformi-
na

Tripartita Hydrocotyle

an *Hydrocotyle*

non videtur

vulgans H. foliis retatis umbellis quinquefloris t. v. p. 271. x

H. Dan. tab

90.

Cotyledon aquatica Lobel. ii. 387.

Ranunculus aquatilis cotyledoni folio Bauh. pin. 100.

Habitat in Europa inundatis &

Caulis repentes. Folia subrotunda lobata crenata glabra
Pedunculi plures petiolo brevioris, floris plures terminalis, sessiles

^{umbellata}
Chinensis Hydrocotyle foliis peltatis umbellis multifloris Lin. Spec. p. 338* S. V. pag. 271.

Brown Jam. 185.

Acantho P. f. bras. 90.

Erva de capitaon Mart. bras. 27.

Cotyledon aquatica Roem. hist. 1. p. 212.

Hydrocotyle repens, flore albo, cotyledonis folio Gron. Virg. 30

Habitat in America

Similis H. vulgaris: differt scapo foliis duplo longiore, floculis non 5: sed pluribus
viginti, in umbellam simplicem digestis Lin. Spec. l. c.

natare H foliis peltatis repando - crenatis natantibus Cyr. pl. rar. Herp. Jof. 1. 4. 7.

non edi

capitata H. foliis peltatis multilobatis lobis subdentatis, scapis elongatis umbellis multifloris simplicibus

Habitat in Bonana Comerio

Robustior quam reliqua caules repentes. Folia petiolata solitaria cum ramis et scapo. ^{latiora} ^{et numerosa} quam longa. Infolia unicas bene latis. Lobi dente utroque denis. petiolus folio dimidio longior. Scapus erigitur longitudine folii floribus numerosis

an bonanensi La Marti Encycl

elongata #. foliis peltatis ^{puberifloris} crenato ^{obtusis} lobatis, pediculis ^{altis} elongatis
floribus capitatis

Habitat in Madagascaria Commenfor Solitana

Caules repentes glabri. Folia sesquipedalium subtensa
parum latiora quam longa. crenata emarginata altero lobe
in sinu acuto extensa. Petiolus pithamou. Scapus longus
vidue folii attenuatus caule basi per flores plures in apice

u

americana *Hydrocotyle* foliis reniformibus sublobatis crenatis Lin. Spec. pl. p. 330* S. V.
p. 271. Loefflin. 44. p. 2 Pl.

Habitat in America septentrionali, meridionali et in India Orientali

Facies et magnitudo vulgari. Folia anticae sinu vix haud ad centrum usque
dissecta, margine in 9 lobos obsoletos divisa, quorum singuli crenis 3. minori-
bus notata. Umbella 5 floa Lin

transversa 71. foliis reniformibus transversim oblongis lobatis
habitat in madagascar Comerson
Affinis asiatica petaliata in illa ad gemmula et folia
venella ut in illa tomentosa lobata, et folia omnino glabra
duplo latiora quam longa fere bipollicis brevis lata
fere lobi ad basin divanati ^{ultima} quae subtransversa
subtrifida cum lobo ~~intra~~ ^{ultima} ad basin acuta

lunata La Mark Encycl-

apatia ff foliis reniformibus dextato crenatis Lin. Spec. pl. p. 339x

Codajam Rheed. Mat. 10. p. 91. t. 46.

Pesquanus Rumph. Amb. 5. p. 455. t. 169. fig. 1.

Salernanella zeylanica foliis reni palustris repens; hedera

terrestri folio Herm. parad. 23. v. t. 23. p.

Ranunculo affinis umbelliferis accedens, chelidonii mi
noris folio zeylanica minor Plukn. Alm. 3. 4. t. 106

fig. 5.

Habitat in Apsa

Caules repentis petioli et pedunculi ad ^{pet}genicula lanata.

Utri et rami tenelli foliis ^{sola} dentis foliorum et petioli
ad infestationem folii subtus subtus ^{sola} glabra vel pilosa

latiora pallidiora ^{sola} cetera latiora quam longa
des crenae foliorum raris acutioribus profundioribus. Pedunculi
3. 4. brevissimi uniflori

sublanatis

aqualiter

geniculis

varietatem hujus dedit de La Mark foliis parvis vix
semurquiculatis

ornata Gard spinis ramulorum terminalibus quaternis, laciniis calycinis linea
nibus cuneiformibus, floribus confertis Sw. prodr. pag. 51.

maifonda spinosa

nummularia ^{H.} foliis subrotundo reniformibus brevissime petiolatis
obsolete pubescentibus
floribus subsessilibus

Habitat in Insula Bostonia

Herba facie nummularia ^{glaber} caules repentes. Folia breviter
petiolata petioli villosi lobis aequalibus atque cranis vix
unquiculatis. flores sessiles. semina rugosa

~~Leatherstocking~~ La Mart. En

glaberrima
cheledonii H. foliis cordatis ovalibus obsolete dentatis angulatis.

Habitat in Insula Franca Comnesa

6.7 petiolato

Caulis longi. Folia plura ad gemmula congesta fere

Ranunc: sicano ^{sub} ~~erecta~~ ^{inopialia} ~~longissima~~ unguiculata &

Petiol frequentia Petiolis longitudine vix foliorum.

Stipula attenuata. Pedunculis brevissimis unifloris ^{vul} -subquing

D. dit Richard

sicanoidei C. Mart. Enzyl.

⁺
~~Randea Gardneria~~ ~~Randia~~
~~spinosa~~ spinis ramorum decussatis, foliis subrotundis corollis hypocrateri-
formibus; dentibus calycinis lanceolato-subulatis Sw. prodr p. 52.
aculeata G. Spinis oppositis foliis brevioribus ramis glabris Hort. Kew. 1. p. 295

Randia aculeata

moschata
pilosa

4. foliis reniformibus obsolete septemlobatis multidentatis pilosis
capitulis pedunculatis decemfloris

Hydrocotyle moschata: foliis reniformibus septemlobatis serratis villosis umbellis multifloris basi pedic. Forst. prod. pag. 22. n. 135

Habitat in nova zelandia

caulis repens pilosus pilis. Petioli longi fere bipolliciares
folia ut unguiculana. pedicelli brevissimi.

metis G. subnermis, foliis subovalebus Sw. prodr. pag 52.

Rondeletia metis

herpata Hydr. herpata foliis reniformibus lobatis crenatis, floribus verticillatis
verticillis quadrifloris Pw. prod. pag. 54.

Habitat in Hispaniola siciformis

Caulis repentes. Pedunculi foliosae longiores, flores sessiles verti-
cillati plures. interdum foliis brevior verticillo unico terminali
folia utraque pilis crispis
folia summa minima D. et Desfont

felicis aulis 47. foliis reniformi subrotundis obsolete lobatis foliis subice-
natis siapii filiformibus capitulis paucifloris

Habitat in Insula Francia

Caulis filiformis repens. Solia retolata suboblonga
glabra lobis linearibus septem trineatis, vix anguiculatis.

Pedunculus longitudine fere solium apice florus 3. 4
affinis hirsuta L.

Subthapsoides La Marti Enc

reniformis H. foliis reniformibus dentatis erectis Walt. fl. car.

pag. 113

Habitat in Carolina Desfont ^{petiolo multo brevior.}

Caules repentes. Pedunculi radicales. umbellae ¹⁻² 3-4 floro. Folia
plura ex eodem puncto.

~~reniformis~~

cordata # foliis cordatis utrinque erectis Walt. fl. car. pag. 113.
habitat in Carolina

non vidi

~~erecta~~ ^{erecta} ~~recta~~ Hydrocotyle foliis cordatis crenatis, scapis paucifloris longitudine pedicellorum
Lin. Suppl. p. 177. * S. V. 272.

Habitat in Jamaica

Folia cordata, obtusa, lateribus acute dentata, pollicaria. Petioli radicales, pitha-
mosi, apice pilosi. Scapi radicales, apice paucifloribus, longitudine
plantae, erecti, ut tota planta, non repentes Lin. l. c.

Ranunculoidei *Hydrocotyle* foliis quinque partitis incis. Lin. Suppl. pag. 177. * P. V.
pag. 272.

Habitat in Mexico.

Caulis repens, geniculatus. Folia solitaria s. bina, subquinquepartita: lobis
triobatis, obtusis; omnino Ranunculi. Petoli longitudine s. p. digiti.
Scapi caulis pollicares. Umbella simplex. Petala alba. Lin. l. c.

Stellata A. foliis palmato quinquelobis subtis pilis stellatis cinereis.

Habitat in Bononia.

^{ramuliculi} ^{erectus}
Caulis teres prostratus striatis articulis 3-4 pollicibus

foliis petiolata opposita basi sine excisa latiora quam
longa, pollicaria ad medium peres supra lobi curvati
integra vel superne dente unico utraque vel ab
altero tantum latera, laterales subfida supra peres
glabra subtus juniora pilis pilis pilis raris subtis et
petio ~~conspici~~ uti petioli et ramuli et pilis conspicis
stellatis cinerei. stipula membranacea albedo lanice
lata ovata laevia. Petiolus folio duplo longior ramis
in omnibus axillis foliorum folis florumque apice
onustis. Pedunculi axillares brevissimi gemini 3-4 flori
fructu ^{pluris} in maturis con pilos cinerei

villosa H. tomentosa, foliis cordatis integerrimis tomentosi f. vel lopi

Mentunalis agra Syst. V. 13

Pentella villosa Syst. Veget. ed. 13

Habitata Cap. l. p. i

Caules dichotomi villosi ramis flexuosis diffusis. Folia petiolo
sa femineunguiculata, petiolo folio saepe triplo longiora
denticuli axillares plus folio brevior.

tridentata Hydro. tomentosa, foliis lineari cuneiformibus apice tridentatis L. suppl.
pag. 176. * L. V. p. 272.

Habitat in Cap. bono speci

Simili H. Solandra differt foliis lineari bus basi versus angustatis
apice dentibus tribus aequalibus nec exatis quinque vel septem
dentatis. Pedunculis folio multo brevioribus: nec longitudine
aequalibus. Caulebus brevioribus laevibus herbaevis nec lignosis
peltis anibus prostratis. h. n.

Colandra H. tomentosa, foliis cunei formibus ovatis retusis septena decaatis Lin.

Suppl. pag. 176. R.V. pag. 272

Colandra capensis Lin. Spec. pl. pag. 14074

Habitat in Cap. b. sp. 1

mentumalis procumbens. Diocoros africana, foliis ovato muc

Coris Herm. app. 10.

Habitat in Cap. b. sp. 2

Radix caulesque in superficie terra ramosa. Vitis
virens tomento. Caulis pollicares vix ramosi. Folia alba
unifor
na obovata. Pedunculi laterales inferorum foliorum

varietates haec plures dantur

Colandra capensis

glabrata Hydroc. glaberrima, foliis obovatis s. lanceolatis acutis Trinerviis glaberrimis
Lin. Suppl. pag 176. L.V. 272

Pentella glabrata Lin. L.V. Ed. 13. p. 700

Habitat in Cop. bono frui

caulis repens folia petiolata, pollicaria. petiolus folio duplo
longior. Peduncululi ad genicula cum foliis aggregata ut ungu
culana in aqualia

ex herb. Bontfij

Linifolia Hydrocotyle canescens foliis linearibus subspathulatis internodiis brevioribus Lin. Suppl.
p. 176. x. f. v. p. 272.

Habitat in Cap. bono spei

Similis *H. virgata*, sed folia multo longiora, pedunculi veniunt longiores Lin. l. c.

Chinesis Hydrotyle foliis linearibus, Umbellis multifloris Lin. Spec. pl. p. 339 * S. V. p. 272

Habitat in China ~~maxime~~

magnitudine asiatica; Cauli repens. Folia linearia, tercia, obtusa, plana, basi bene
ad articulos. Scapi longitudine folii. Umbella multiflora Lin. Spec. l. c.

non vidi

umbellatum Hydrocotyle

variegata Hydroc. glaberrima foliis semiteretibus lineari-bus sulco exaltatis internodiis
Congronibus Lin. Suppl. p. 176. L. V. pag. 272.

Habitat in Cap. bono spei ^{erectus, strictus variegatus villosus}
Caulis dichotome ramosus ^{interdum} teres glaber articulat. Articuli bi. 3 polli
cane geniculi crassi. Rami oppositi folii. Folia glabra articuli
longiora saepe duo saepe ad basin rami ^{oppositi} pedunculati exaltati
apice ramorum ^{cum foliis plurimis} nec ementa rami ^{repente} ulteriores
exsertentis. ^{tandem falli videntur} Umbello radii 4-6 in operale capellae & unguis
lance

varietas e. caule pedunculique villosi

Juncifolia
~~*trifida*~~

*H. foliis tripartitis laciniis subincisis, scapo ascendente, umbello
radio trifloro*

Habitat in Brasilia Commerson

Habitus a reliquis diversus seminibus similis. Folia petiolata
plura glabra, radicalia, tripartita. laciniis unceatis apice
coarctato subincisi unguicula lobis lateralibus bifidis.
Scapus digitalis terminatus umbella quadra ^{f.} ~~et~~ radicata
antardum pedunculus lateralis triflorus. involucri pentaphyllo
menuta ^{seces} ~~pedicelli~~ ³ intermedii plus petala unguiculata

Juncifolia La Mark. Enci