

Hymenaa

1 coubant H

versuosa Hymenaea foliis venosis; racemis axillaribus. Terminabilibusque
simplicibus; Leguminibus tuberculatis

Culta in horto Inf. Francie herb. Desfontainensi

Rami teretes, 9 latri, superne flexuosi. Folia, ut in Hymenaei Constant
at teneriora & minus coriacea, vix acuminata, obtusa, nitida. Racemi
superne, frequentes, bipollicares, multiflori. Flores duplo minores
quam in Constant. Pedicelli breves, uniflori, uti calycis pubescento-
iniani. Bractea duo, caduca, subrotunda. Calyx 4 partibus, oblonga,
utrinque tomentosa, persistenti. Petala 4. glabra, unguiculata. Stami-
na 10. Germen pedicellatum, basi hirsutum, superne glabrum. Legumen
siqui pollicare.

Blainvill

Hymenaea La Mart. illustr. t. 930. fig. 2.

bifida Aymenoua foliis bifidis venosis

Habitat in Brafilia herb. fusca 5

Rami angulati, glabri, cineres punctati. Folia petiolata, alterna, cordata
glabra, venosa, nitida, bifida: lobis ovatis, quinque pollicaria. Racem
mi axillares et terminales, 6 pollicares. Pedunculi tomentosi. Brac
tea fetacea. Flores copiosi, minores quam in reliquis. Calyx oblongus,
^{dureo} ~~fusca~~ tomentosus, lineis sive elevatis ⁵ angulatis, quinque dentatis, dentibus
obtusis. Petala unguiculata, oblonga, Calyce pariter longiora, unguicularia,
Hamina 10. Corolla breviora, glabra. Pistillum hirsutum.

Hymenosa

Hymenosa Courbail. foliis coriaceis subavenis basi inaequalibus, ^{panicula} floribus
pedunculatis

Hymenosa Courbail. Lin. Syst. veget. pag 257. 392.

Coubant *Hymenaea* Lin. S.V. 392. Gaicu. Amer.

Arbor filiquosa ex qua gummi Celesti Bauh. Lin 404.

Herba Pl. Bras. 123.

Coubant bifolia, fructu pyramidato Plum. gen. 49.

Ceratia diphylla andegavana, vicini majori fructu negro, filiqua grandi in
cluso Pluk alm. 96. t. 82. fig. 2.

Habitat in America meridionali

Rami crassitie perno Cyneo cortice pallide femineo adpressi punctis
folia petiolata alterna, conjugata. Foliola sesipia semiovata

latere interiore breviora ^{anthera breviora} falcata, ^{si obtusa}
^{laxa} ^{interiore} ^{anthera} ^{breviora} ^{falcata} ^{si obtusa}
^{parva} ^{acuminata} ^{si ut impuncta} ^{vix emarginata} ^{concaea} ^{intermedia} ^{longissima} ^{glaberrima} ^{bifol}

liciana. Petioli purpurascens uti margin inferior interne, unicus
fateri purpurascens. Pedunculi ^{ramis} ^{pedicell.} ^{termina} ^{lati} ^{vati} ^{breves} ^{articu}
cati angulati. foliola calycis ^{concaea} ^{inter} ^{se} ^{medio} ^{fructu}, e

Hymenosa venosa, foliis membranaceis venosis basi subaequalibus, ^{panicula} floribus sessilibus
Habitat in Cayenna von Rohr 5

Rami teretes, glabri, cortice griseo-fusco, adpressi punctis elevatis minutis ferrugineis.

Folia in ramulis, petiolata, alterna, binata: foliola breviter petiolata oblonga, tri-vel quadripollicaria, integerrima, acuminata, acuta, latere inferiore, infra profertim inferne versus angustiora, basi subaequalia, glabra, venosa, subtiliter reticulata, venis tenuissimis, vix nitida.

Petioles teretes, pollicares, fusco-purpurei, ^{universales, eti partiales}

Panicula terminalis. Pedunculus ^{et pedicell.} fusci, glabri: partia ^{broct panis} es parum ramosi, post casum florum dentati. Flores sessiles, Bract

1 quinque in panicula ramulo, alter ni.

teos duo, ad basin florum, ovata-rotundata, colorata, subconcolor, dorso villosa, carinata.

Calyx turbinatus ^{genicis} incahus: tubus persistens: laciniis oblongis, obtusis unguiculatis, unica parum angustior, intus medio incana margine glabra.

Corolla. Petala quinque, obtusa, longitudine calycis, ungue lato: duo reliquis angustiora
Stamina. Filamenta decem, quinque pariter breviora, omnia corolla longiora,
sensim attenuata. Anthera erecta, oblonga
Pistillum. Germen breviter pedicellatum, compressum glabrum. Stylus stami-
nibus longior, primum in spiram convolutus, dein porrectus. Stigma obtusum

(Similis Hymenocallis Courbairei, differt vero foliis triplo longioribus venis numerosis
variusque subreticulatis basi fere aequalibus, nec venis obscuris foliis lateralibus
interiore supra basin desinentibus venis obscuris: Calycis senteo majoris
nitentes sessiles, nec pedunculati