

Hymenocarpus

Rothia Camacho

Rothia

Char. essentialis

fol. festuculorum. Cal. polyphyllus foliis membranaceis
superne coloratis. Pappus pyramosus scarosus

Receptac. nudum

Carolinensis La Murr. Journ. Bot. nat. no 1.
pag. 16. tab. 1.

Habitat in Carolina meridionale.

Californicum La Murr. Journ. Bot. nat. no 2.
pag. 16. tab. 3.

Mamma ~~patri~~flora, foliis ~~aristatis~~

Scabrosus Hymenocarpus Tenet. monox. cum tabula

Habitat in Carolina 0

Caulis erectus: subramosus, angulatus, sublanatus, terpedalis
Rami alterni. Folia alterna radicalia petiolata, cauli
na basin sessilia bipinnatifida: laciniis lanceolatis acutis
nervosa, margine subrevoluta sublanato-velloso supra
vndia callosa-punctata, subtus cana, 6-8 polliciarum

Compositus terminalis erectus villosus. Peduncululi ramique
pedicelli subtomentosi. Flores albi. Bractea lanceo-
lata sparsa. foliola calycis duplici serie, oblonga
obtusa basi pubescentia. Corollula extus villosa
Semina turbinate, angulata villosa Pappus squama

12-15 nudis receptaculorum nudum

Caulis herbaceus, sulcatus, angulatus, tomentosus. Folia petiolata
pinnata, palmata: laciniis linearibus tomentosis, obtuse pinnatis
unguiculatis, una altera ex intermediis, in summa una altera
ve. Compositus terminalis compositus tomentosus Calycis
foliola pinnata ^{herb} _{normalis}