

Hypoxis

1. niger H. foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus
2. muticus H. foliis petiolatis ^{elliptico lanceolatis} ovatis ~~ovatis~~ sinuatis, calycibus muticis bracteis indivisis
3. pusillus H. foliis petiolatis dentato-pinnatifidis, bracteis integris densa to qua, calycibus spinosis
4. albus H. foliis petiolatis ~~ovatis~~ cordato subrotundis obtuse lobatis, floribus sessilibus.
5. aureus H. foliis petiolatis cordato subrotundis acute lobatis crispis, floribus pedunculatis, fructiferis pendulis
6. Scopolia H. foliis petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis, calyce corollae campanulatis axillaribus regularibus, pendulis ^{integerrimis}
7. physalodes H. foliis petiolatis cordato-ovatis, corollae aggregatis terminatis lobis erectis infundibuliformibus erectis.

2 medicus # foliis petiolatis ovatis acutangulis, calycibus muticis bracteis indi-
cipis Lin. Mant. 45 * S.V.

Hypocyanus albus Aegyptus Alp. Exot. 193. T. 192.?

Hypocyanus Salora

Habitat in Aegypto Arabia &

Caulis pedalis crassitie digiti ascendente ramofi angulati pubescenti-
tes. Folia alterna per paria remota, obtuse sinuata trive-
quadripollicaria, inferne in pet. colum planum attenuata
acutius utraque biangulata pallidiuscens arena, nervos
crassa, pubescentia: floralia integra, lanceolata. Racemi
terminalis ramorum, secundi, pedalis apice recurvati
Calyx pollicari campanulato infundibuliformis: laciniis
ovatis inermibus villosis. Corolla calycis sequilongior exte-
rior villosa flavescens interne violacea laciniis infernis
interius albidis

foliis ellipticis angulatis ~~dentata~~ sinuatis

Hypocyanus indicus Solani foliis flore atropurpureo Corvini Barrel. G. det
- Guss. eadem ac hyps. hort. Paris. in Aegypto legit Leprie

1 niger 44 foliis amplexicaulis pinnatis, floribus sessilibus Lin. F. V

Hypogyamus vulgaris et *niger* Bauh. pin. 164.

Habitat in Europa meridionali et pinguisibus

Caule fere tripedati ramosis, velloso erectus. Folia lato-
cuneolata pinnato-subpinnatifida, laciniis obtusis velloso

reliqua addenda ex specimen meliori

reticulatus 3. *¶* foliis caulinis petiolatis cordatis sinuatis acutis, floralibus inter
germinis cordatis ventricosis.

3
papillus 4 foliis lanceolatis dentatis: floralibus inferioribus binis, calycibus

Spinosi Linn. ^{Herb. europ. p. 444} T. V. p. Mart 339*

Hyoscyamus papillus aureus americanus, antiochianus foliis glabris
Pluken. alm. 100. T. 37. fig. 5.

Habitat in Persia 0

Pauli nalsman pilosus, apice subsessili sensim erigendo, ramifus
folia petiolata sesquipedalia, utraque acuta, integra vel
dentata-pinnatifida, subtus pilosa, mucronata. folia ad ext. obov.
pinnatifida lanceolata integra. Flores breves pedunculati

Hyoscyamus papillus perugi solitarii remoti. Calycis tubernati 10 angulati longitudine
nisi ~~papillus~~ luteo fere tubo corollae epoque tubo latiore laciniis acuminatis
minor annuus spinosus. Corolla flava faucibus nigra, lobes inferioribus duplo
Turnes. Inf. r. ultra tubum
h. herb. Vahl.

folia ~~ovata~~ lanceolata dentata pinnatifida ^{floralibus dentatis} ~~quae~~ ^{ve} integrae ^{quae}
lobis ~~antheris~~ calycibus spinosis

Hyoscyamus aegyptius Clus. hist. 2. pag. 23 an huc satis simile ^{non: plodys & de maki}
eadem forte planta est ac hyoscyamus reticulatus ^{quo in} ~~omittitur~~

γ albus H foliis petiolatis pinnatis obtusi, floribus sessilibus Len. S. V. p.

Hyoscyamus albus major Bauh. pin. 169.

β. *Hyoscyamus albus vulgaris* Claf. hist. 2. p. 110

Hyoscyamus albus minor Bauh. pin. 169.

Habitat in Europa australi O.

2 aureus H. foliis petiolatis dentatis acutis, floribus pedunculatis, fructibus pendulis Lin-Spec. pl. p. 2574

Hyoscyamus albus creticus Clus. hist. 2. p. 84.

Hyoscyamus creticus luteus major Bauh. prod. 92. p. 169

3. *Hyoscyamus aureus* Alp. exst. 99. 7. 98.

Hyoscyamus creticus luteus minor Bauh. p. 169.

Habitatio Creta, oriente ♂

Caulis vix pilosus pedalis. Folia petiolata alterna ^{petiolis} in
vix nervi tantum villosa. ~~petiolis~~ bipollicaria ~~vix~~
^{vix} ~~pedalis~~. pedunculi laterales ~~petiolosum~~ florentes erecti
fructiferi penduli. Calyx pilosus. Corolla flava sive
aurea, fauce atropurpurea striata limbo semiquinquedo.

foliis cordato oblongis acute lobato-dentatis, floribus
pedunculatis, fructiferis pendulis

Scopolia H. foliis ovatis integris, calycibus inflatis campanulatis lobis. Len.
Mant. 46. p. 339. H. Nuyling. 3. p. 235. L. V. p. 221.

2 Solanum somniferum bacciferum Bauh. pin. 166.

1 Solanum somniferum alterum Cam. epit. 816

Scopola carmelitica Gaigu. obs. p. 32 tab. 20

Habitat una Gram in Sylvis &

Simillimus Atropo belladonna, sed caulis vix pedalis, dichotomus
folia alterna, petiolata, ^{lobis attenuatis} nuda integra. pedunculi axillares
vs filiformes, uniflori, Calyx quinquefidus muticus
Corolla campanulata. Filamenta hirta

foliis lanceolatis ^{ovata} ellipticis, calycibus ^{axillaribus solitariis} inflatis Corollis
campanulatis & gubantibus pendulis

1. *Physalodes* H. foliis ovatis integerrimis, calycibus inflatis subglobosis Lin.
Am. v. t. 6. pag. 1. Hort. Ups: 44* Desf. Pulm. hirta Sp. pl. pag. 1660

Habitat in Siberia 2

Caules plures simpliciter erecti teretes striati summe veloposi
• folia longe petiolata, venosa integra, ⁱⁿ culta glabriora
bipollicaria. Flores fasciculati, terminalis. Calycis
breves vellosi. Corolla purpurea

foliis cordato-ovatis ^{con}, calycibus inflatis terminalibus aggregatis
villis regularibus infundibuliformibus

Desf. pulm. hirta Sp. pl. 1667. hirsuta