

118. *Hypaelythum* ~~Squamae paleae eae indigae imbricatae. Cal. bivalvis Cor. 0.~~
Paleae acutae imbricatae, Calycis: bivalvis, Corollae: ~~nulle~~, Setis 0.
~~nulle~~ -

Hypaelythum *decidui*

nunquam
glomeratae - 1

ovato-oblongis
subglobosis

Hypae Lythrum spicis ^{ovato-oblongis}, squamis obtusis, involucri pungente

Habitat in America meridionali? Richard

Culmi bipedales, rigidi, ^{agrote} obtuse trigoni. Folia pedalia, canaliculata
rigida, marginem apicem versus ~~acutis~~ serrulato-scutra.

Involucrum monophyllum, spatulae formae, parum infra capitulum
~~resurgit colligatum~~
~~in se connatum~~ rigidum. Capitulum globosum, magnitudine

4 vix semivngui
cularis

cornu. Spiculae ^{ae} directae duodecim, ~~ovatae oblongae, obtusae~~. Squa-
mae subrotundae, ^{squamae} marginem membranaceae, juniores lutescentes,
adultiores purpurascens. ^{calycis valvulis} ~~Corollae glumae~~ longitudine fere squamae
lineares compressae acutae, compressae, purpurascens, carina
ope lentis subdiatae. Stamina tria, corolla ^{multa} longiora. Stylus uni-
cus, indivisus. Semina ovata oblonga, acuta, subrotunda, flavescentia,
punctis purpurascens adspersa ope lentis videnda.
Setae nullae.

argenteum 2 Hypaeleytum ^{Squamis acutis} spicis oratis, stylo ~~trifido~~, foliis linearibus
Scirpus senegalensis; culmo angulato subnudo, spiculis terminali-
bus sessilibus glomeratis involucribus Le manth illustr. t. p. 140.
Habitat in India orientali ad margines agrorum et in Scaturigi-
osis König, in Senegal Dupuis &

Culmi pedales. Involucri foliolum longius bi-tripollicare.
Spicae plerumque quinque - 3 est, interdum tres, magnitudine
pipenis nigri: Squamae ^{acutae} ~~nervae~~, nitidae, inferiores punctis purpu-
reis ad 3 persae.

Omniibus partibus robustior, rigidior quam sequens. ~~aveterum~~ tam
similis ut vix differentiam nisi in signate invenio

multangulus L. Culmo ~~text~~ sulcato nudo umbella compressa involucri
diphyllis brevioribus

Habitat in Andea orientali

Culmi pedales et ultra inferne sulcati texti sulcato angulati
superne ~~text~~ compresso subtriangulati basi vaginis brevibus
et ~~pubescentibus~~ ^{pubescentibus} convoluta culmo dimidio breviora. Umbella
facie Ricci ferruginei longiore. Squama ovata, mucro
nato involucrium diphyllum folio lo altero umbella parum
longius margine cove

Sp. phacelatum. Hypae leptum ^{stylis bifidis} spicis ovatis; foliis filiformibus linearibus.

Habitat in ^{prope Tranquebar} India orientali König, Röttler

Culmi pedales. Folia glauco-viridia, apice saepe sp. phacelata.

Involucrum variis monophyllum; foliolum longius tripolliare. Spicae

tres: quatuor, pipere nigro dimidio minores, juni ora^{ae} albidae, aetate

fuscae: squamae acutae

Corolla membranacea

Calyx amentum, squama obovata, concava colorata. Corolla
uni-volvis, membranacea, excavata. Stamina duo, linearia.

Antherae erectae, lineares, flavae. Germen ovato-oblongum, diaphrag-
num. Styli duo. Stigmata simplicia. Semen ovatum, striatum albe-
ro latere planum, altero convexum Röttler.

Stamina tria numeravit et stylus unicus numeravit König, et
et ego. Valde affinis sequente

Cayana subullegza Umbella terminali, spicis sessilibus pedunculatisque, flo-
culis reflexis, involucri longissimo subrotundo La Mart. P. Cai
pag. 149.

Habitat in Cayana

Silamenta membranacea articulata