

Hyperanthera

- 1 Monog. II. floribus semidecandris, foliis subbipinnatis: folioli inferioribus verticillatis, fructu triquetro.
- 2 semidecandra II
- 3 dioica III. decandra, foliis bipinnatis; basi apiceque simpliciter pinnatis

3 *Dioica Hyperanthera* ^{Becardora} foliis bipinnatis: basi apiceque simpliciter pinnatis
Bondui canadense polyphyllum non spinosum, mas et fœmina Duham.
arbr. 1. p. 103.

Guilandina dioica inermis foliis bipinnatis: basi apiceque simpliciter
pinnatis Lin. l. V. pag 396.

Gymnocladus canadensis La Mark. Encycl. pag. 733. Tom. 2.

Habitat in Canada

Bolida sive pingu, ovata, subtili ad costam pilosa

floribus divicis,

3 divica Hyperanthera foliis bipinnatis: basi apiceque simpliciter pennatis

Quiladana divica Len. S. V. pag. 296.

Gymnocladus Canadensis La Mart. Encycl. nov. n. 1.

2 Semidecandra Hyperanthera floribus semidecandris, foliis bipinnatis apice simpliciter pennatis

Hyperanthera peregrina Boiss. descr. pag. 67.

Gymnocladus arabica La Mart. Encycl. nov. n. 2

bipinnata cum impari

folia 6-8 jugis. foliola 5: 6 jugis, breve petiolato, opposita versus apicem tergem. majora, remota, glabra, semiinquinulana. foliola

flores ~~racemosi~~ racemose paniculae racemosi: pedunculis pedicellisque alternis

~~Convenit cum moringa in florescentia, floribus et fructu, differt foliis aequaliter bipinnatis nec foliolis inferioribus ternatis.~~

(Convenit cum moringa in florescentia, flore et fructu, differt foliis aequaliter bipinnatis nec ^{foliolis} ^{inferioribus} ternatis triplicato-pinnatis, foliolis oblongis, non vero obovatis.

Semidecandra H. floribus semidecandris, foliis bipinnatis apice
simpliciter pinnatis fructibus verticibus ^{lib. 1. p. 30} _{4^{us}}

Hyperanthera peregrina Forst. ^{def. v. p. 67.}

Gymnocladus arabica La Mark Enc.

Habitat in Arabia 5

Folia bipinnata cum impari 6-8-juga. Foliola 5-8-juga
breviter petiolata, opposita, versus apicem sensim majora
remota ^{oblonga} glabra semiregularia. Flori paniculati
racemosi. Pedunculi et pedicelli albi.

Moringa *Hypenantha* floribus semidecandris foliis subbipinnatis: inferioribus ^{foliolis} ternatis

Legnum peregrinum aquam conleam reddens Bauh. Pin.

~~Moringa Rheed. mal. 6 p. 19~~

Moringa Rumph. amb. 1. p. 24. t. 74. 75.

Moringa ceylanica foliorum pinnis pinnatis, flore majore fructu anguloso Burm. seyl. p. 162. t. 75.

Qui Candina Moringa inermis foliis subbipinnatis, foliolis inferioribus ternatis Pl. seyl. 155. * Spec. pl. pag. 546. * P.V. p. 396. mant. p. 379

Habitat in India orientali &

Rami teretes glabri. Folia bipinnata ^{cum in} composita ^{inferne} foliola inferiora ^{inferne} pinnata, ^{cum impari} ternata bipinnata ^{superne} ternata ^{superne} pinnata ^{superne} pinnate foliola bygea pennulis petiolatis obtusis oppositis ^{obovatis} ~~est terna~~ impari reliquis duplo major semperque villosa glabra. Paniculo laterales. Pedicellis inanis.

monunga *Hyperantha* foliis oppositis bipennatis, siliquis trigonis seminebus
Inguetro alatis &

Monunga: Kellor Ruaph. arab. 1. c. 73. tab. 74 75

Conium monunga Lour. fl. Cochinch. 279

Habitat in Cochinchina, Malabar & Mozambici: Africa 5

Arbor medicinis - folia impari bipennata. foliola petiolata, oppo-
sita, ovata, ceterissima retabro, minima. Panicula termi-
nalis floris pallidi. Stamina sive longiora fertilia. Siliqua
pedalis 3 valvi intendum tetragona 4 valvi.

Conium monunga & siliquis polygonis seminebus Inguetro alatis
quelaadina monunga foliis alternis

non vidi