

Hypericum

Summa Vardalli congener cum Hyper-germanic

~~H. denticulatum folia cordata herb. Dasey.~~

reperi H. caule tereti repente foliis lanceolato linearibus obtusis lin. Am
acid. 4. p. 207* f. V

Hypnerium orientale Polygonifolium Tournef. Carol. 19.

Habitat in oriente t.

Caules lignosi teretes filiformes, glabri adgenicula radículas demittentes ha.
Folia linearia unguiculata, obtusiuscula subtus ad marginem punctis elevatis
distantibus subtus fasciis uti foliola calycis, glabra. peduncululi ex ad apicem
oppositi singuli triflori patentes, flae intermedias sepi.

glandulosa punctatis

subtus margine

orientale H. populis reflexis, foliis oblongis denticulato-crenatis Lin. - 1. V
Hypnium orientale, pharmico foliis Tournef. corol. 10. An. 2. p. 97. 7. 97.

Habitat in oriente ^{glabri per thama}

Caulis plures lignosi adscendentes simpliciter filiformes & linea decurrente
acutis denticulati glabri adsculati. Folia sessilia inter nodos longiora frequen
tia ^{invis, copios} sub glandulose crenata glabra, vix seminauciculana inferiora parum
minoru fere obovata obtusora. ^{pedunculatus} Stipula reflexa basi folii utrinque clava
to reflexo denticulato. Pedunculi ^{pedunculatus} floris terminaliter simpliciter dichotomi
cum flore in dichotomia breviter pedicellato ramus singulis inflores
floribus sessilibus approximatis. Calycis foliola denticulata. Petala
linearia

Datur et alia species quoniam in herb. Mus. vidi

reflexum #. foliis sesquibus lanceolatis, approximatis reflexis, ramis tomentosis, pan-
cula terminali Lin. suppl. pag. 346. # 1. v. p. 701

Habitat in Barrancas Amensis

Stemex major, ramis divaricatis, ultimis foliis tomentosis. Folia inte-
gerima, reflexa, incumbencia, perforata margine nigro-punctata
panicula rotundata. Bracteae calycisque pubescentes. Corolla lutea Lin.

Linum sp. fl. foliis ovatis canaliculatis integerrimis pedunculis axillaribus bifloris
Rete obj. 5. p. 27.
Habitat in China

michi ignotum

Coumnum
petiolatum

caule arborico foliis petiolatis Lin. Suppl. p. 345. & S. V. p. 700

Habitat in Monte Granada

arbor facie Lauri. Folia opposita petiolata integerrima: venis tris
versis. Panícula longitudine folii. foliola calycis ovata lanceolata, conica
res. Petala ovata longitudine calycis. Nectarii squamulae squae quini
staminibus alternantibus minuta. Filamenta penicillata sursum in rami
mura capillaria. Antheris 5. Bacca ovata strobilosa 5 locularis Lin.

glabris

ovatis, paniculis terminalibus brachiatis

non vidi

mexicanum 4 ramis simplicibus, foliis imbricatis ovatis lin. Suppl. p. 345 * L. V.

n. 701 Desf. de Hipp. p. 5. fig. 2

Habitat in novagranada 4

Caules pedales simplices, scabri ramis foliorum, perennantes. folia ovata
sessile, et subumbriata obtusa aequia Cori. Cymbus terminalis dichotomis
sessili foliis non longior petala lineare lin

Cymbus terminali^{bus} sessilibus

Rabum 4. caule tereti suffruticoso mucronato, foliis oblongis lin. am. axiad 4. p
2074 l. V.

Hypenium orientale, caule apertis purpureo Tournef. cord. 19.

Habitat in Arabia, Mauritania &

Caules fruticosi senescentis cortice deciduo nigri herbacei resurgentis adpressi
si puncti elevati unde scabi evadunt. Folia opposita ovali-lanceolata
saepe, coriacea integerrima. Corymbi terminales, floribus parvis tagynis.

Caules erecti, pedalis, simplex mucronato scaber. Folia linearia, glabra
semipollucina sessilia ramuli oppositi ex omnibus axillis
habes

Calycinum H. floribus pentagynis solidariis, caule suffruticoso ramoso, calycibus obo-
vatis obtusis, foliis distichis oblongis Hort. New. 3. p. 103

Hypericum ascyron Mill. Dict.

Hypericum calycinum, floribus pentagynis, caule tetragono fruticoso, foliis
ovato-oblongis coracis Lin. Mant. 1064. Pl.

Habitat in amer: septentr.

Cassia ~~am~~ ^{rumi} ~~trigynis~~ glabra peruanensis. Folia pinnata glabra integerrima
superiora bipollicaria et ultra inferiora breviora, obtusa, confi-
dentia, frequentia. Pedunculus terminalis solitarius uniflorus.
Corolla lutea ~~am~~ major quam in omnibus reliquis. Habitat H. andro-
semi

Valerianella H. caule fruticoso, foliis linear lanceolatis Lin. Spec. pl. pag

1101.4. P.V. p.

Hypericum floribus pentagynis, calycibus obtusis, staminibus corollam aequantibus,
caule erecto herbaceo Mill. Dict. n. 10

Habitat in Virginia &

Rami Tetragoni. Folia Rosmarini aut Lavandulae, glabra. Flores in corymbo
dichotomo, terminali est tribus aut septem floribus. Capsula ovata longiora
calycis. Calyx lanceolatus obtusiusculus. Styli 5. Spermii 5.

Ascyron 4. Caule tetragono herbaceo erecto simpliciter, foliis teribus integerrimis
Lin. l. V. pag Gmel. hb. 4. p. 170. t. 69

Ascyron magno flore Bauh. prodr. 130. Pin. 200

Androsomum flore et theca quinque capsulari omnium maximis

Habitat in Sibiria, Canada, Pyrenis,

Caule tetragonis subdichotome ramosus pedalis et ultra. Folia

ternis ^{maxime planis} ovato oblonga ^{versus} internodiis breviora
bi pollicaria ^{versus} minima obtusiuscula glabra, integerrima.
ma. Pedunculis terminalibus solitariis unifloris. et flore magno

pyramidalum H. Golus calycibus ovatis acutis subpannicula
tis, caule subtetragono ramoso H. - Rev. 3. p. 103
Habitat

non vidi

arborescens Hypericum floribus trigynis corollis calycibusque lobis glabris, foliis ellipti-
cis, racemis bracteatis, caule arborescente Tab.

Habitat in India Orientali

Rami superne tetragoni, cortice purpurascente, glabri

Folia petiolata, bipollicaria et ultra, elliptica, parum acuminata, aveni-
entia, coriacea, integerrima, supra pulverem glauco adpersa.

Racemus terminalis, compressus, bracteatus, spithameus. Pedunculus uni-
versalis partialisque compressi. Pedicelli 4 vel quinque ad singu-
lum articulum pedunculi partialis, breves.

Calyx pentaphyllus. folioli ovatis, glabris, integerrimis, lobis, nudis
Petalis quinque, longitudine et figura calycis.

Stamina in 3 phalanges usque ad apicem fere connata; apicibus
distinctis extus in per ^{exterioribus} superficie longitudinaliter patulis squama-
si. Anthodis omnes in latere exteriori filamentorum extus testis.

Latius phalanges extus squamosi ex apicibus distinctis patulis filamen-
torum, toti testis antheris numeris, intus lovis

germen trigonum, glabrum, ovatum

(Habitus Hyperici quienensis diversam vero numero perispermii et
inflorescentia)

molle Hedysarum foliis ^{ternatis} ovatis attenuatis subtus villosis racemis terminali-
bus leguminibus tortuosis
Ex Impula s. Onici misit In Afflig
Caulis frutescens caule robustiore
similis antecedenti ad afflig foliis majoribus subtus molliter villosis
peniora etiam supra ^{mispinae maculatis} pedicelli aggregati interum 40 vels
legumina magis duplo majora articulo ultimo maximo ratione
precedentium

connatum *Hypericum* foliis cordato ovatis connato perfoliatis

Habitat in Brasilia Composita Thour ^{sans} aucupiter frequenter
Caulis teres, ubi tota planta glabra. Folia non pollicaria integerrima.
Subtus venosa, pallidiora, punctata. Flores non sidi Pedunculati
terminales dichotomi. Olori dichotomia subsessilis. Calycis foliola
ovata, acuta striata, impunctata.

Androsomum. ^{xx x Torquato} fructibus baccatis, caule fruticoso ancapite lin. l. V

Androsomum Dod. pempt. xD.

Androsomum maximum frutescens Bauh. pin. 200

Habitat in anglica et Europa australi 5

Herba glabra. Folia sespilia ovato oblonga obtusissima sesquipedalium
na. Pedunculi et axillis supremis uniflori breves.

Hypnium Ruchani Villars: videtur esse huius varietas.

venus A foliis lanceolatis: inferioribus crenatis, caule corymbofo, pedunculis
nudis, calycibus hemisphaericis Lin

Fl. Dan. Tab. 486

olympicum G. calycibus acutis, staminibus corolla brevioribus, caule fruticoso
Lin. 1. V. S. Mill. Dict. 4. 151. fig. 1.

Hypnium orientale flore magno Tournef. corol. 14

Hypnium monti Olympi Wheel. det. 222. Bell. Bot. 102. 4. 151. f. 103.

Habitat in Pyrenois, Olympo &

Rami ceteris laxes, glabri apice compressi. folia sessilia, glaberrima
canaliculata pallide viridia obtusa supra vix polliciana subtus
puncta, puncta ad marginem fusca. Pedunculi terminal ad apicem

termini uniflori folia duo subcalycis.

a Caranense differt foliis angustioribus brevioribus subtus punctatis
pedunculis brevioribus medio non geniculatis foliis duobus versus caly-
cem nec in medio calycis foliolis latioribus ovatis acutis floribus
majoribus

folius subtus punctatis

cananense Lt. calycibus obtusis, staminibus corollae brevioribus; caule fruticeo
Len. P. V.

Habitat in Cananis &

Rami glabri, inferne teretes superne angulati compressi. Folia sessilia
canaliculato-elliptica pollicari mucrona brevissimo terminata inter
nodos longiora. Pedunculi ex axillis superioribus, oppositi uniflori
folio duplo longiore supra medium articulati bractea utraque opposita
cum involucro, cum rudimento mucronis flori

— foliis ~~ovatis~~ imbricatis

floribundum *H. floribus* trigynis, calycibus ovatis acutis subbilatis, staminibus
corolla brevioribus, foliis lanceolatis ellipticis, caule fruticoso Hort. kew. 3.
p. 104.

Hypericum frutescens canariense multiflorum Comm. hort. 2. p. 135.

4. 60.

Hypericum s. *androsomum magnum canariense* ramosum, copiosis flori-
bus frutescens Pluk. alm. 109. t. 302. fig. 1.

Habitat in Madera &

cardinoides C. folis ~~cardinoides~~

Soleifum *H. floribustrigynis*, staminibus longitudo in petalorum, calycibus lanceola
43 acuti, foliis ovali oblongis sesquibus glabris Hort. Kew. 3. p. 104.
Habitat in Aerea 5

elatum H. floribus trigynis, calycibus lanceolato-ovatis alutis, staminibus
corolla longioribus, caule fruticoso, foliis ovato-oblongis Hort. kew. 3. p.

104.

Habitat in Amer. sept. ^{glaber} 3.

Caulis anceps ^{glaber} ramosus. folia sessilia bipolliciana subtus
nervata pedunculis terminalibus breviter trifloris

an frutescens. meum eadem

herbarium *H. floribus trigynis, staminibus corolla longioribus, calycibus tere-*
colatis acutis, foliis oblongis, caule suffruticoso Hort. kew. 3. p. 105.

Tragum Raf. herb. 2.

Hypenium hirtum, floribus trigynis, staminibus corolla longioribus
caule fruticoso acrispiti Lin. l. v. p. 700

a *Hypenium foetidum frutescens magis Dill. Elth. 102. t. 151. fig. 102*
Tragum Bluf. herb. 2. p. 205

Androsaceum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis Bauh.

^{non 2000.}
β. *Hypenium foetidum frutescens minus Dill. Elth. 102. tab. 151. fig. 101*

Habitat in Sicilia, Calabria, Creta ad rivus &

Tota glabra. folia pallidiora acutiuscula pedunculi ex supremis articulis
una flori medio articulo

pedunculatum H. foliis ovatis petiolatis integerrimis subtus tomentosis, caule fruticeo,
tetragono compresso Lin. Spec. pl. p. 1102 x

Habitat in Brasiliis

Rami obtuse tetragoni. Folia subtus obsolete tomentosa. Corymbus bracteati

~~pediculis supra nitidis subtus incanis acuminatis
pediculis umbellatis~~

(forte rotundus bacifer.)

fr. meo Linnaei folia pinnata uti pedunculi et calyces ferruginei
folia acuminata supra nitida subtus incano rufescentia. pedunculi
pariales oppositi pedicelli umbellati. corolla intus hispida

non vid.

prolificum fl. floribus primordialis sessilibus, caule aëriti fruticoso, fo-
lis lanceolato-linearibus Lin. Mant. 106 & S. V. p. 701. Mur. in Com.

Gott. 1700. p. 22. t. 7

Hymenium floribus semitrigynis, staminibus corolla brevioribus, caule
fruticoso, sempervirente Gron. Voy. 112.

Habitat in America septentrionali

Caulis sesquipedalis cortice griseo, glaber, uti reliqua planta ^{rami superiorem caule} ^{seorsim} ramis
simplicibus. Folia petiolata sesqui-pollicaria mucronata basi attenu-
ata subtus glauca ^{interdum margini serrulati} ^{superius} ^{inferius} fasciis foliorum linearium in axillis pedun-
culi ex axillis et supremis et terminalibus solitarii inferioribus uniflori
superioribus triflori. ^{in axillis} ^{inferius} ^{superius} floribus sessilibus. Foliola calycis lanceolata, ante
gemine stamina longitudine petalorum

glandulosum Hypericum floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, foliis lanceolatis
margine glandulosis, caule fruticoso

Hypericum glandulosum floribus trigynis, calycibus acutis serrato-glandu-
losis, foliis oblongo-lanceolatis pellucido punctatis, margine glandulo-
sis, caule fruticoso Hort. Kew. 3. p. 107.

Habitat in maderæ

Rami obscure tetragoni, glabri, dichotomi.

Folia sessilia, unguicularia, glabra, supra nervosa, subtendunt nervi
subtilibus sive lineato, ^{ut nunquam} punctis numerosis ^{atque} ~~impressis~~; subtus utrinque
punctata, ^{anice et basi} acuta etiam basi, margine glandulis sessilibus

Pedunculi ex axillis ultimis, triflori, solitarius in dichotomia.

Calyx corolla duplo brevior, margine glandulis sessilibus.

Corolla pallide flava, punctis sessilibus inornata.

corymbosum Hypericum foliis lanceolato ellipticis subtus subtomentosis corym-
bi terminalibus

Habitat in Insula Francisc Thuron

Rami teretes superne pubescenti tomentosi subinervi

Folia petiolata opposita inferiora subsessilissima superiora sessili-
minora, lanceolato elliptica acuminata acuta basi obtusa
oblique nervosa, venia utraque ^{nervi nervosus ad pressu} punctata subtus supra glabra
subtus pellicula ferruginea obducta nervis tomentosis integerrima jun-
ora utraque villosa subtomentosa. petoli perigonulari cinerei

Corymbus terminalis decompositus pedunculis pedicelli et calycis
ferrugineo tomentosi pedunculi pedicelli subdichotome divisi
steriles. Calyx perianthium 5 phyllum foliolis lanceolatis obtusis
petala 5 oblonga apice barbata. Stamina filamenta 5. capillaria
apice 3-4 fida in ^{longitudine corollae} sagitta lacina anthera globosa. Nectarium
squamae sive cuneiformes longitudine germinis. germen pentagonum
glabrum styli sive

Brathy *Athyrium*

Brathy juniperina L.

Stems erect. Branches filiform, glabrous. Leaves unguiculate, glabrous,
dorso-folios evanescens. Flowers axillary, solitary, folios breviores, brevi
ter pedunculati herb. Guss.

Athyrium juniperina

vid Smith. Gc. ined

muscosa R. geminibus calycibus pedunculis petiolis ramulisque
hippidi glanduloso-spicati, spinis ramorum spicis rectis Hort. Vew
2. p. 207.

Rosa rubra plena, spinosissima, pedunculo muscosa Mill. c.
140. t. 221. fig. 1.

Rosa muscosa Mill. Dict. Du Roi hort. herbere. 2. p. 360.

Habitat. †

Hypnium orientale foetido simile sed inodorum Tournef
Cor. Herb. Mus

rest fms

Hypnium Lob. 4. 390

Hypnium folio brevior

Hypnium amplo perforato folio Tournef.

Habitat

herb. musci

Emittit ramis frequentibus fransis

22. 4. 1790

Goshypnum

~~Su. Act. Holm. 1790. p. 21. *~~

habitat in p. folio perforato 5 lobis, inferioribus 5 lobis; caule teretibus, seminebus liberis

44

Gymnocum acidense minimum Lieb. Vaill.

Habitat

2224 Aspen

~~Hyppocrepis orientalis caule aspero purpureo Tournef. Cor.~~

~~Habitat in oriente herb. Musi~~

~~Caulis erectus, pedalis simplex, mucosus. Scaber. Folia linearia
glabra semi pollicaria.~~

~~Habitat in fossis et desertis. 2~~

~~25. 2. 46. 4. 2.~~

~~Frax. foliis ovatis serratis plus minus glabris caule ramisque Plum. 12.~~

~~Castanopsis ...~~

Spiciflorum A

Habitat

Herb. Hus.

Caulis punctatus uti folia ad marginem. Folia linearis lanceolata Spica
secunda flexuosa.

elongatum

latifolium Nutt.

interamericana

arborescens H. foliis ovatis acutis, panicula brachiata verruculata, caule arbo-

^{reo}
Hypericum petiolatum floribus pentagynis, caule arbores, foliis ova-
tis lin. Dupl. pag. 344.

Habitat in nova granada

Folia glabra, laevia vena transverse. Panicula longitudine folii
foliolo calycis ovato - conicolata, conica. Nectar. squamulis
sque cum staminibus alternantia. Bacca ovata quinque
tumulosa. lin.

madriicensis. floribus pentapetalis Sw. prod. p. 109 Lin. S. V. pag 699.

Tacq. amer. 166

Habitat in America 4

Guianense ^{apice}
Cayanense fl. ^{cordato} corollis barbatis; calycibus fratis, foliis ovatis, caule fruticoso hum.
Suppl. p. 343. * Mart. 277. * L. V. p. 699. Jacq. Amer. 213. Aubl. Am.
Habitat in Cayana Guayanae ^{sicuti nitida}
arbor octo decim pedale. Folia petiolata integerrima a racemi
compositi. Petala interna bifida. Nectarii glandulae si cum staminibus
alternantes rami apice paniculati. Flori magnitudine fl.
superati. Petala laniata ~~racemi compositi~~

fl. rufescens La Mart. herb. 4us. Folia oblonga, 3-4 pollicaria
acuminata.

aubl. pl. 704. t. 3. 1

apice intus barbatus

fol. ~~nitiditate~~

ellipticis ovatis ^{adnatis glabris}
foliis cordato ovatis ~~subtus venoso fissatis~~
Descript. quoniam inter Americon

^{inter Canastis}
bacciferum $\frac{1}{2}$ corollis barbati, calycibus levibus, foliis ovatis, caule fruticoso
Lin. suppl. p. 344. * Mant. 277. * LV. p. 700 *

Cooperia Martyni ^{but} G. B.

Habitat in Surrano

Frutex inaequalis, erectus baccatus: rami quadranguli, folia acuta
minuta, subvenosa nitida pithamea. Petioli breves sesquiter-
tiales terminales paniculati tubi. Petala obovata
Columna filamentorum plana erecta, penicilli formis. Germe
ovatum pentagonum. Antherae 5. Bacca ovata acuminata
subpentagona strobilata. Semina lineis duplici Lin.

Hypericum guianense

Aubl. fl. gu. p. 784. Tab. 311.

— subterreum

Corymbosum *Hypnium* foliis ellipticis lanceolatis acuminatis ramis superne corymbisque
decompositis tomentosi

nen

allosum P. caule hirsuto, ~~Solus duplicato pennatis. pinnatis capellanibus, umbel-
lis pluribus terminalibus elongatis. Cavan. 2. p. 4. p. 250 no 379. V. 117
fig. 2. ~~hirsutum Cavan~~~~

Non vidi

Catfolium foliis cordatis subtus ruffis inflorescentibus tomentosis petiolatis
Aubl. fl. Guian. 2. p 787. Tab 312. fig. 1.
Habitat in Guiana }

non vidi.

Lespedeza folium ♂ foliis cordatis subtus nufescentibus. tomentosi sesplebra
Aubl. fl. Guian. 2. p. 207. t. 312. fig. 2
Habitat in Cayenne ♀

non vidi

Capitata
~~Guaranis~~

cedato-orata

Intra glabri

H. folis ~~orata~~ oblongi acuminati ~~Publi~~

genus distinctum Richardio
descript quare inter americana
Chylocnema dictum

Arctostaphylos Hopea Lin. ~~man.~~ p. 1057

Arbor Lauri foliis, floribus ex foliorum alis Calest. Carol. 1. p. 54. v. 54.

Habitat in Carolina 5

alternifolium Hypnium ^{Hypnium} floribus pentagynis axil solita axillaribus solitariis,
foliis lanceolatis alternis, caule fruticoso Tab.

Habitat in India orientali Kōinj

Caulis arborescens, cortice glabro cinereo. Rami parvi, teretes, glabri,

Folia fasciata, ^{bi- tri-pollucaria, lato-} ~~lato-~~ ^{latiora} lanceolata, basi angustiora, obscure
venosa, glaberrima. ^{bi- tri-pollucaria} angulatis

Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, pollicares, folia versus apicem
foliorum, parvi, figura ram foliorum ramorum.

Calycis foliola coracea, rotundata, glabra, corolla 3ptō breviora, lobis

Petalis integris.

Geromen pentagonum, gracile, acuminatum, glabrum

Styli 5que, reflexi.

Capsula 5 locularis, polysperma.

balearicum H. caule fruticoso, foliis ramisque ciliatis Lin. Spec. pl. pag
1101. & S.V. Mill. Dict. N. 54.

Myrtus cistus Penzance Clus. hist. 1. p. 60.

Habitat in Majoria

Caulis ramosus. Rami tetragonis angulis acutis glandulose mucronatis. Folia
semicamplesia caulis oblonga obtusissima margine et subtus glandulis veno
sa, crassa, supra laeva, unguicularia. Flores terni nales solitarii.

patulum 4. floribus pentagynis solitariis Verminalibus, Caule frutescente caeco,
foliis ovatis margine revolutis Thunb. fl. jap. p. 295. x



Habitat in japonia

Rami teretes, purpurascens, flexuosi adscendentes, patuli, debiles, glabri
Folia sessilia, acuta, integra, subtus ferruginea, supra viridia, horizontalia
pollicaria, inter nodis duplo longiora. Flores in ramulis Verminales, soli-
tari. Calycis laciniis, ovatis, obtusis, glabris, corolla duplo brevior.
Corolla lutea, subtus dorso rufescens.

Differt a calycis foliis minoribus non coriaceis margine revolutis,
caule basi tantum frutescente, ramis caecis, patulis

macrophyllum Hymenium

von Pehr sub nomine boveiferi



Hypenium Guianense



6. *Hyssopus* *myrsinifolius*
in nuda *Hamana*
apertus villosus

Cayanense Hypericum foliis ovatis ^{utrinque} glabris punctatis, corollis barbatis, pedicellis subum-
bellatis, caule fruticoso

Hypericum cayanense: floribus pentagynis, corollis barbatis, calycibus stri-
atis, foliis ovatis, caule fruticoso den. Mart. 277.

Hypericum Guianense: foliis ovato-oblongis acuminatis, petalis florum
extus luteis, intus villosis candidantibus, fructu quinqueloculari
Aubl. pl. Gu. frag. 704. tab. 311.

Habitat in insula Trinitatis An. Ryan &

Rami verticillati, adgenicula obscure tetragoni; ramuli oppositi
glabri cortice cinereo-fusco, ^{sub}obscure tetragoni.

Folia petiolata, opposita, 3-4 pollicaria, acuminata, utraque
glabra, punctis elevatis raris adpressa, subtus pallida, integerrima.

Cyma terminalis trifida, subsessile, pedicelli ultimi umbellati.
3. 5.

Calyx persistens: folioli oblongi, obtusi, glabri, levibus; corolla brevis
nervis curvatis, tribus margine tenuiori dilatatis.

Corolla petala oblonga, extus glabra intus hispida, superne maculis
aliquot fuscis punctata

Nectarium glandula oblonga, hirsuta, inter singulos phalanges staminum
Stamina filamenta hirsuta in quinque phalanges connata, longitudine fere corol
la.
Pistillum germen oblongum, pentagonum, angulis obtusis. Styli 5. Longitudinis sta
minum. Stigmata obtusa
Pericarpium Bacca quinqueloculari, globosa, glabra, magnitudine cerasi.
Locula polysperma. Semina oblonga, fusca, nitida.

~~Dubium quadrangulum~~ ^{alatum} calycibus lanceolatis acutis, caule membranaceo
alato quadrangulo. Floridan.

Hypericum vulgare minus caule quadrangulo foliis non
perforatis Bauh. pin. 279


Hypericum dubium Elved ~~floridan~~

Hypericum quadrangulum Roth. fl. germanica
Flora Danica: Tab 640

Habitat in Sania germania locis humidis

Inflorem Hypp. foliis ovato lanceolatis, pedunculis terminalibus ternis
uni flori calycibus ovatis acutis caule tetragono.
Habitat in America boreali De fontaine.
Semili omnino ascyo. Flores magni.

Hypericum pyramidale est



Hypericum longifolium

Hypericum longifolium

Corydolum Hypanicum foliis ovatis ^{elongatis subtus pubescentibus} lanceolatis, ^{et} involli barbatis, caule arboreo.

Habitat in insula Trinitatis ad Ryan?

Rami obtuse tetragoni, ad articulos dilatato compressi, fusco-purpureascentes
^{et} ^{subtilissimis} pulvere glaucescentes adpressi, articuli tripollicares

Folia petiolata, opposita, saepe spithamea, ramulorum 2-4. pollicaria
patentissima, basi ovata, extrospem versus sensim attenuata, integerrima,
venosa, utrinque glabra, subtus ~~versus marginem glaucescentia~~ ^{versus marginem} ~~glaucescentia~~ ^{subtilis et minutis} ~~oculo armato vix~~ ^{oculo armato vix} ~~visibilia~~ ^{visibilia} ferruginea
resistentia a illis minutissimis oculo armato videndis, versus marginem

Articuli ^{et} ^{folioli} ^{pollicares} panicula terminalis, palmari, uti calyces, ferrugineo pulverulenta.

Pedunculi parvuli oppositi, trichotomi deinde dichotomi, pedicelli in
ramis inferioribus racemosi.

Calyx ~~et~~ foliola lanceola, semunquiculana, extus convexa intus
concava glabra, colorata, superne utrinque sulcis brevi obfuso, tria
marginem tenuiore dilatata, ^{ferruginea} extus tomentosa convexa, intus conca
va glabra, corusima

Corolla petala 5: ante evolutionem fronsaliter contorta, cuneiformis vix
emarginata, extus glaber calyce parum longiora, extus glaberrima

Nº 4

2012 Cat. de Ryan

intus hispida, margine glabra, superne Venus forme striato-maculata

Nectarium glandula oblonga, hispida, inter funiculum fasciculum staminum.

Stamina filamenta plura in sive corpora lineana connata, superne extus libera
hispidissima, colla breviora.

Pistillum germe rotundum, conicum, glaberrimum, laxe, obscure pentagonum

Styli sive longitudine filamentorum, glabri. Stigmata simplicia, obtusa.

Bacca glabro, magnitudine nucis Cerasi sive Coculae: Cocula polysperma. Semina oblonga
lineari-oblonga, fusca, nitida

a flor, b. petalum latere exteriore c. interiore cum fascio stamin. d. fasciculus staminum
intus a extus, e. cal. cum pistillo g. Pistill. cum nectar. h. pistil. i. nectar.
latere inter. k. exteriore. l. Bacca, m. eadem trans. secta n. semina magnit.
naturalis o. cognita auctum.

(an Hygenium latifolium foliis cordatis acuminatis, subtus nespentibus Aubl.
fl. Que. pag. 707. tab. 312. fig. 1. ? Descriptio haud abliedit hispida foliorum
vero magis cordata quam in mea