

Hypericum

guineense H. floribus subumbellatis, caule fruticoso, ramis teretibus, foliis ovatis
acutis Lin. Suppl. p. 344. * Desf. de Hyp. p. 4. fig. 1. L. V. p. 700

Habitat in Guinea

Rubet cortex cinereo. Rami laeviter teretes. in singulis ramulis foliorum
duo oppositiones: inferiora folia minoribus. Folia opposita petiolo
ta ovata acuminata laevia integerrima. Pedunculi oppositi
ad latera foliorum superioris petioli longitudine folii bifidi. / trifidi
multiflori, subumbellati. Calycis foliola canaliculata concava. Neptunium
glandulis sive ovatis filamenta per seque corpora connata petals breviora.

Si mea Lin. folia subtus pallidiora ^{et caecylo} nervis et costa villoso
ferruginea rami superne et pedunculi villosi

encoides H. foliis linearibus imbricatis Linn. - I. V

Hypenium tomentosum Lusitanicum minimum Tournef. G. R. H.
p. 256.

Hypenium encoides minimum foliis ceneris Plukn. alm. 109. f. 93.
fig. 5.

Habitat in Lusitania, Hispania

~~Stipulae~~ ~~Stipulae~~
Stipulae in palmarum basi ramosus rami digitales erecti, filiformes teretes
e foliis deciduis ~~an~~ confertim annulatis. Folia subsessilia verticillata
quaterna, ~~multa~~, ^{ex tomentosum} glabrescentia ~~linearia~~ e margine revoluta subtleretia supra
convexa ^{visu} ~~marginem~~ ^{oculo} ~~armato~~ ^{senes} punctonim
sedus. flor. dichotomo pedicellatis

Coni lutea encoides fruct. Coni hispanica Barrel. c. 351.?

sub verticillatis imbricatis
foliis verticillatis sculis carnis

egyptium 4. Nectaris petalorum lanceolatis, caulibus suffruticosis compressis. Lin.

Spec: pl. p. 1103 + Desf. de Hyss. pag. 3.

Habitat in Aegypto 5

Fruticulus ramosis subdichotomis, glaber uti tota planta. Folia sesiplex oblonga
fere polygoni se ut semunquid alana, frequentia subter ramos subumbriantia
sesiplex crassifolia avenia, glaucis viridia cinnata internodiis longiora
flores in apice ramorum plerumque terni basi subsesiplex. Faeces arenarum caly
ci glabola ovata, Faeces arenarum

caulibus ^{suffruticosis} compressis ramis compressis, foliis oblongis subumbriatis, pedunculis
unifloris nectaris petalorum lanceolatis

Dichotomum ⁵ // foliis lineariibus glabris, caule ramoso dichotomo ^{anicipitibus} terete, floribus cal.
microphyllum valibus inque dichotomia

Habitat in Domingo.

Ter vel quater

Plantae semit ^{Salic} // Caulis basi lignosus erectus ramosis rami dichotomi altitudine caulis
corticis fusco nullo deciduo. Ramuli tenui cum nidamento ramulorum
in omnibus ~~per~~ articulis. Folia parva vix semunquidulana mucronata
punctata glabra frequentissima. Flores ad latera ramulorum ultimo
num. ~~3~~ in omnibus dichotomiis parvi pedicellati solitarii. Calycis
foliola linearia acuta glabra integerrima impunctata. petala
uncata styli 3. Stamina 8-9

japonicum H. floribus triginis, foliis sessilibus ovatis integris, caule herbaceo tetra-
gono basi decumbente Thunb. fl. jap. p. 295. tab. 31

Habitat in Japonia

Caulis glaber raris ramosis, apice paniculatus, pedalis. Rami capit-
lari. Folia obtusa, margine reflexo subundulato glabra: subtus
nervosa, pallidiora, punctata, erecta, saepe complicata, internodiis breviora,
infera et suprema minor. Flores in axillis paniculae caulinae
solitarii et terminales, pedunculati, flavi, parvi. Bractea subpani-
cula ramis, lanicolata, acuminata integra glabra. Pedunculi
capillares uniflori. Cadyi latius oblonga acuta. filamenta corollae
paulo breviora. Styli longitudine corollae

Differt ab H. quadrangulo quod multo minor, caule debiliore et basi

decumbente

a perforato caulo tetragono basi decumbente

2829. Linari folium Hypericum floribus virginis, calycibus serrato-glandulosis caule tereti erecto
foliis linearibus obtusis glabris.

Hypericum lusitanicum linariifolium Tournef. Infl. R. Fl. pag. 256.

In erectus versus Bayonam ^{inque Navarram Hispania} inveni 7.

Supra radicem ^{pauci} Paulis ^{tenuis,} supra radicem lignosus, teres, lavis simus, interdum simplicis finis
interdum basi ramosis: ramis altitudine fere caulis, pedales.

Folia petiolata ^{top.} sessilia, remota, linearia, glaberrima, obtusis, revoluta,
unquiculana.

Radices in summitate filiformes, pauci, patentes, oppositi, plurimumque virgini
lanceolata; denticuli monaulis setaceis, glandulosis.

Calycis foliola admarginis dentata
Corolla parva, calycis parum longior.
filamenta petalis breviora

Var. β videtur differe foliis latioribus differe videtur foliis
linearibus subtus punctatis, calycis foliola oblonga punctata
glandulose ciliata

Virginicum 4 floribus enneadromi, caule tereti; foliis ovatis amplexicaulis
Linn. mant. 455* L.V. p. 701* Spec. pl. pag. 1104*

Gardenia Coldenioides Ait. Edinb. vol. 2.

Habitat in Pennsylvania 4

Caule quasi ^{glabra} multiculis. Folia cordato-ovata punctis pellucida, sesqui-pollicaria,
pedunculi bracteati et ternales. Petala pallide rubra. Filamenta 9 in tria
corpora. Nectaria 3. Stamens alternantia, obtusa, crassa, extus gibba, intus
concava L.

Folia sesquialtera, oblonga, pollicaria. Flores enneadromi, Anadalypha Rich

canadense H. foliis linear-lanceolatis, caule quadrangulo, pericarpis coloratis.

Lin. Spec. pl. pag. 1104 x s. v

Habitat in Canada

Caules herbacei teretes ramosi, glabri. Folia integerrima glabra
Panicula dichotoma, floribus pedicellatis. Flores parvi admodum,
magnitudine spergula. Pericarpium calycis duplo longius, concium
nubrum

non vidi

Corydalis H. floribus virginis, foliis ovatis subamplexicaulibus, foliolis
calycinis ovatis acutis, panicula trichotoma: flore intermedio sessili

Hort. kew. 3. p. 106.

Habitat in Amer. sept. 4

~~Dubium~~
~~quadrangulare~~ *H. calycibus oblongis obtusis, caule subtetragono erecto.*
~~quadrangulare~~ *H. caule quadrato herbaceo* Lin. l. V. p. Flor. Dan. tab. 640

Afryon Dod. pempt. 70.

~~*Hypericum vulgare minus*~~; caule quadrangulo foliis non perforatis
Bauh. pin. 279.

Hypericum afryon dictum, caule quadrangulo Bauh. hist. 3. p. 302.

Habitat in Europa proci 4

Caulei plures erecti pedales a ^{linea} ~~linea~~ ^{subtetragonis} ~~linea~~ decurrente tetragoni simplici
glabri. folia semamplexicaulia s. vix pollicaria oblonga obt.
subpunctata, s. 7 nerva glabra. rudimenta ramulorum in axillis
Pedunculi ex axillis supremis et apice caulis. laterales uniflori
calycis foliola ob ^{lineam} ~~lineam~~ oblonga obtusa subpunctata integerrima
petala lineari oblonga punctata, staminibus parvis longiora
~~varietas humilior a discoloribus majoribus floribus sulphureis praesens~~
in ~~danica~~

prior dubium *Leaffii* Elvest. Roth. fl. germ. 2. p. 230

Hypericum fallax Grm. *Genae* Act. Nat. Curiosorum vol. 3.
app. 362.

alternifolium *Hypendium*

Habitat in Syria *Belladonna* herb. Desfont.

Stipitulus glaber ramosus: rami albi, erecti. Folia alterna, sessilia, oblonga, crassa
acuta, venia, unguiculata, glauca, nerva, oculo armato adnigra punctata
Flores terminaliter, solitarii vel gemini. Calycis foliola ovata, acuta, crassa. Petala
oblonga, longitudine staminum. Styla 3.

emarginatum Hypericum

Habitat. herb. Guss.

Rami teretes, glabri, fusco-purpurei. Folia semianplexicaulia, sesquipollicana, cordata, oblonga, obtusissima, emarginata, venosa, utrinque glabra, subtus punctata, integerrima. Pedunculi axillares et terminales, foliobreviores. Pedicelli tres, laterales 2 flori, intermedius uniflorus brevior. Calycis foliola lanceolata, striata.

Hypenium

Habitat in oriente herb. de luespit 5

Tristes. Rami alterni. Tota o plonza, subter incana. Pedunculi superne
bifidi, flexuosi

habes

Fas circulatum Hypericum

Habitat herb. la Mantini 5

Rumi, uti reliqua partes, glabri, tetragoni, apice dichotomi. Folia unguiculata
nervi, lineana, margine subtus et supra punctis impressi, margine panem crispata
fasciculi foliorum in axillis. Flores sespiter in dichotomia et apice, solitarii. Caly-
cis foliola lanceolata. Style 3. ?

rosmani folium Hyperiium

Habitat herb. La Mantri ^{apice dichotomi}

glabrum. Rami teretes. Folia sessilia, semipollucaria, subcordato-lanceolata
impunctata. Styli tres. Flores pedunculati in apice et dichotomis

multicaule Hypanium

Habitat herb. La Martini

habes

Solidago Hypericium

Habitat herb. La Martini
glabrum. Rami teretes, folia sessilia, ovato lanceolata, pollicina,
venosa

angulifera Hypnorum

Habitat in America boreali herb. La Martini

Caulis herbaceus, tetragonus, glaber. Folia sessilia, unguiculata, oblonga, glabra, subpunctata. Pedunculi bi vel ter dichotomi. Flores pedicellati. Calycis foliolo lanceolato, parva, punctata, integerrima basi & usque canaliculo angulato. Styl. 3.

nuda florum Hypanium

Habitat herb. La Mantua

Caulis acuta tetragonus. Folia bipinnata, ovato-lanceolata, pollicaria, glabra, venter
armato, utraque punctata, obtusifolia. Pedunculi var. 4 dichotomi. Calycis
Lanceolati, integerrimi, punctati. Stylis 3.

acuminatum Hyperiium

Habitat herb. La Martini

Folia ovato-oblonga, utrinque glabra, subtus pallida, acuminata longiterminata
bipollicana. Panicula terminalis. Calycis foliola linear-lanceolata, tomen-
tosa. Corolla intus barbata

Hypnium

Habitat in Pen herbarium Jusf.

Caulis plures, diffusi, digitales, vel trigoni, apice laevi. Folia sessilia, fernuagui-
cularia, oblonga, glabra, obtusa, utraque punctata. Styl. 3.

amplexicaule Hypanicium

Habitat herb. La Martini
glabrum. Caulis herbaceus, erectus, superne tetragonus. Folia semiamplexicaule
creta, pollicaria, cordato-oblonga, acuta, subtus pallidiora, subpunctata. Punc-
tuli Verminalis, 3-4. simplices uniflori. Calycis foliola ovata, petalis breviora,
integerrima, impunctata. Corolla magna. Stylisque.

Hypericum

Hypericum Dubium? videtur esse

Habitat in Delphinato

Folia oblonga, nervosa, subtus margine punctata, semipellucida, lineae ut roque
altera utrumque opposita per caulem decurrentia. Calycis foliola oblonga, obtusa, subpunctata.
Petala pallida flavo, punctata. Flores ter in ramulis ter minutibus.

axillare *Hypencum*

Hypencum campanulatum Walt. ?

Habitat in Carolina herb. Ruth.

Caulis teres, glaber. Folia breviter petiolata, pollicina et ultra, oblonga, glabra, utrinque punctata, vix senopa, basi acuta, apice obtusa. Pedunculi axillares brevissimi, uniflori, solitarii raro gemini. Calycis foliola linearia, impunctata, parva. Emittitur oblongus semperaque utans. Stylis 3.

Sphenocarpum Hypericium

Habitat in Carolina Herb. Rutherfordi

Caules herbari ei, & Strayoni, glabri. Folia sessilia, lanceolata, pollicaria et ultra, obtusa, glabra, subtus punctata. Pedunculi terminalis quater dichotomi, divaricati. Flores solitarii in dichotomis sessiles; laterales pedicellati. Calycis foliola lanceolata. Stylus 1. Infidus

confertiflorum Hypericum

Habitat in Carolina herb. Rich. 5
Indivisum. Rami glabri, subtetragonis, ramulosi. Folia sessilia unguiculata, v.
Vernique duo, longitudine internodiorum, obtusiuscula, subtus glaucescentia, pro-
to punctata, fasciculi foliorum in axillis. Ramuli breves, floriferi, foliis ap-
positis. Flores parvi, terminales, trigyni. Calycis foliicola firmatus foliorum
caulis

pelosum Hypericium

Habitat in Carolina herb. Richard.

Caules solitarii vel plures, saepe pedales, simpliciter vel bifidi. Pedunculi bifidi cum
flora in divisa pedicellato.

Hypericum macrocarpum Rich.

Habitat in Armenia Septentr. Attest Rich.

Caulis herbaceus, 2-3 pedalis, fructuosus, tetragonus, penna columbae crassior, glaber, laxis, oppositis ramosis. Rami simplicis summi. Folia semiamplexicaulia, bipolliciana, cordato-ovata, subtus pallide punctata, obtusa. Pedunculis axillaribus, solitariis, superne diphylli, longitudine folii, uniflori, terminales terni, duo laterales parum altiores, diphylli. Calycis foliola ovata, acuta, integerrima, impunctata. Corolla magna $\frac{1}{2}$ asyni. Stylisque. Stamina petalis breviora. Capsula ovata, magna

Luta muscanda

Habitat ad Senegal herb. Rich.

Rami pilis nigris hirti, uti petioli, costa, vena subtis, ^{supra sparsi;} ~~supra sparsi~~ margines pedum
culique, ~~supra sparsi~~

Spondopum Hyemale

Habitat in Carolina herb. Ruth.

Caulis herbaceus, tetragonus. Folia sesquipedalica, oblongo-lanceolata, acuminata, enervi, obtusa, subtus glauca, punctata. Pedunculi ex axillis supremis et apice solitarii, uniflori, brevissimi. Calyx foliosus: folioli oblongis, vix semipollicaribus, duo duplo vel triplo minora, obtuse punctata: puncta non reflexa. Styli tres.

Affine *H. asyris*.

maculatum *Atyrioides*

Walther

Occurrit in Carolina Herb. Rich.

Caulis semipedalis, teres, simplex. Folia sessilia, vix semipollicaria, oblonga, ob-
tusiuscula, subtus punctata, nervosa, supra subvenosa. Pedunculi terminalis, terni
pedicelli breves. Calycis punctati. Capsula coriacea, nitida punctati. Stili

ter.

affine *At. montano*

venosum Hypericum

Habitat in Syria Bellandere herb Desfont

Trunculus erectus, ramosus: rami teretes, glabri. Folia sessilia, unguicularia, oblonga, venosa,
glabra, impunctata. Pedunculi terminalis; bis dichotome divisi. Flores pedicellati. Paly
cis foliata lanceolata, impunctata. Styli 3.

myrtillus Hypericum

Habitat herb. Desfont.

Fruticulus humilis, ramifus: rami sparsi, glabri, tetragoni, purpurei. Folia oblonga, sub
petiolata, obtusa, unguiculata, glabra, glauca, basi acuta, avenia, nervia. Pedun-
culi ex axillis superioribus, solitarii, ~~et~~ terminales 2-3. Calycis foliola lanceolata, ut
folia impunctata, acuta.

cordatum Hyppocistis.

Habitat in Syria Bellardere herb. Desfont.

incano Tomentosum. Caulis pedales, erecti, simpliciter. Folia cordata, lanceolata, pubescentia,
acuta subqueque nervis, impunctata. Pedunculi elongati, glabri. pediculi racemosi, dicto
fere dursi. Calyx glaber: foliola lanceolata, punctata, margine ciliato glandulose

Hypnium

Hypnium ² fasciatum orientale mayranifolium Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Desfont.

Suffrutici opum, caulis tomentosi opum. Caulis palmatis, simplex. Folia ovata, obtusa, unguiculata, margine nigro punctata, oculo armato supra punctis pediculis, acuta, nervis. Flores terminaliter 3. Calycis obtusi.

Ciliatum Hybernicum

Habitat in Sivea Billadare herb. Desfont.

Caulis palmares, simplices, ascendentes, glabri, teretes. Folia frequentia, linearia, ciliata
Ciliis glandulosis, unguiculatis, subtrinerviis, impunctata. Calycis foliola lanceolata
trinerviis, ciliata. Stylis 3 & div. Stamina longitudine corollae

afnum Hygenicum.

Herb. Desfont.

Caulis utriusque e linea decurrente arceps, glaber, simplex: ramuli ex axillis. Folia
linearia, oblonga, obtusa, unguiculata, glabra, subtus pallida, punctata. Calycis
laciniis lanceolata, acuta.

Hypnoidum

Habitat in Carolina W. Bot. herb Desfont.

Caules pedales; erecti, superne ramosi, glabri, tetragoni. Folia semiamplexicauda oblonga, integerrima, glabra, avenia, glauca-viridia, impunctata, unguiculata. In florescentia dichotoma. Floerum parvi. Calycis foliola lanceolata, acuta, impunctata. Corolla parum breviora. Corolla em-punctata. Stylis 3.

Saxiculatum Hyemale

Hypericum monogynum Walther.

Habitat in America boreali herb. Desfont

Stem ramifus, sergatus, glaber

glaucum Hypericum

Habitat in America septentrionali

Caulis fruticosus; rami e membrana decurrentibus alatis, purpurei. Folia sessilibus, ovatis
oblonga, pollicaria, obtusa, avenia, subtus glauca punctata. Panicula terminalis
dichotoma. Pedunculi et pedicelli e margine decurrente ancipites. Calycis foliola
lineana, obtusa, punctata, corolla breviora. Petala impunctata. Stamina longiora
dine petalorum. Stylus 1 cur

amplexicaule Hypericum?

Hypericum erectum foliis foliis magno flore G. Baub. herb. 256

Habitat herb. Tus.

Caulis tetragonus, subramosus, glaber, erectus. Folia semiamplexicaulia, 2-3 pollicaria oblonga, vel ovato-oblonga, glabra, venosa, acuta, subtus pallidiora, raris punctata. Peduncululi terminales uniflori, ramorum solitarii, tertiis caulibus intermediis brevior primis florent. Flores magno. Calycis foliola ovata, acuta. Stamina petalis breviora.

Cuneolatum Hypericum

Habitat in Insula Bourbona Commes. herb. Fusf.

Erictiofum, glabrum. Caulis teres; rami uncinati. Folia sessilia, lineari-
cuneolata, obtusiuscula, subtus venosa, pallida. Flores Vermiculi, solitarii;
Stylus 1. quinquefidus. Foliola calyci ovata. Hamula ^{corolla} calycis breviora.
Diversum a monogyro foliis angustioribus.

articulatum Hypericum

Habitat in Madagafcar Commeson herb Guj.

Rami, uti tota planta glabri, teretes: ramuli Tetragoni. Folia petiolata, pollicaria et ultra, oblonga vel subtriangata, obtusa, basi acuta, pallide viridia, hinc et inde fusco-punctata. Peduncululi 3-4, solitarii, axillares, tri-dichotomi: ~~terminati~~ longitudine foliorum. Calycis foliola oblonga, obtusa, punctata. Styli 3. Stigmata tria.

Pusanea Commes.

angustifolium Hypericum

Habitat herb. Commaf.

Folia paucum angustiora quam in *lanceolato*, acutiora, utrinque conio-
lera, subarenia. Flores solitarii ^{nec ostes} magni. Calycis lacinae ovatae, obtuse.
Stamina corollae breviora. Stylus 1. squesidus.

un varietas *H. lanceolati*

Canuzinosum Hypericum

Hypericum villosum foliis caulem ambrentibus aucti, cocteni seu cineratis Carol.
Habitat. herb. Turc.

Caules teretes, uti tota planta villosa & tomentosa, ferdide canescens. Folia cordata,
oblonga, frequentia, pollicaria, avenia, obscure nervosa. Peduncululi super
nervosa canos. Calycis foliola oblonga, glandulose ciliata, glabra. Petala
punctata

Varietas? ex Egypto foliis cordatis unguicularibus vel parum majoribus nervo
sosi.

Serpyllofolium Atypenicum

Habitat herb. Turf.

Caulis teres, ramosus, glaber: ramuli frequentes. Folia subpetiolata, semiranguiulana, oblonga, basi acuta, obtusa, laevia, venia, crispipula, impunctata: suprema subrotunda, subtus punctata. Pedunculi terminalis, terni, brevissimi, laterales, biflori. Bractea et foliola calycis oblonga, glandulose ciliata.

medicinalium *Hypencium*

Hypencium myrtifolium Diet. Bot.

Habitat herb. tuos

Trunx cortice cinereo; rami superne arboris. Folia sespita, semipollicaria, cordato-oblonga, obtusa, glabra, subtus punctata, pallida, superora acutiora. Calycis foliola ovata, acuta, mucronata, et us punctata

Lyso sori-folium Hyppenicum Villars

Habitat herb. Tusc.

Caules ascendentes, teretes, glabri. Folia linearia, semipollicaria, sessilia, im-
punctata. Pedunculi ex apice ramorum et caulis, terni. Calycis foliola oblon-
ga, glandulose ciliata.

multicaule Hypericum

Habitat herb. huf.

Caules frequentes, filiformes, glabri, teretes, simplices, ascendentes. Folia quae
ternis verticillata, unguicularia, linearia, angustissima, glabra, impunctata.
Pedunculati ex axillis et apice caulis, quinque, intermedio brevissimo. Calycis folio
la linearia, glandulose ciliata.

Ciliatum Hypericum

Hypericum amplo ciliato perforato folio Tournef. 4. Pl. 4.

Habitat herb. Gusp.

Caulis herbaceus, teres, linae duae alternanter decurrentes. Folia semiamplexi-
caetilia, pollicaria, ovata, glabra, nervosa, avenia, subtus pallida, punctata,
obtusae. Pedunculi ex alis supremis et apice, more generis densi. Calycis
foliula ovata, punctata, ciliata, acuta. Petala punctata, staminibus lon-
giora

ps.

Hypericum creticum amplissimo folio nitido Tournef. Cor. 10.

Folia subordato-oblonga, et versus sensum angustata. Calycis foliula lanceo-
lata, glandulose ciliata. Pedunculi terminales, quaterni, quintus brevis
femis, uniflori in centro; flores saepe alterni, distincti et secundi
haec videtur differre ab a.

Hypericum

Hypericum Tomentosum Castanicum minus Tournef. Infr. v. h.

Habitat in Hispania

Caulis plures, simplicissimi, diffusi, villosi, incani, uti tota planta, ut puttha
mei, superne in ramos floriferos 3. divisi

habes

Hypenium

Hypenium orientale saxatile majorano-folio Tournef. Por.

Habitat in oriente herb. mus 4

Caules plures lignosi, palmaris, simplicissimi. Folia ramorum floriferorum
superne unguiculata, inferne parum mucosa. Flores terminales, terni
pedunculati. Capsula trivalves

Hypnidium

Habitat ad fluvium Oby in paucis herb. musc.

Caulis erectus, simplex, pubescens. Folio sessili, unguiculato vel parum ultra,
oblongo, obtuso, integerrimo, subnervoso, supra glabro, subtus villosi. Peduncululi
superne, axillares, triflori, terminaliter more generis. foliolo floralium glanduloso
ciliato uti calycis. Calycis foliolo oblongo. Styli tres.

Sen opem Hypanidum

Habitat herb. Rusf.

Rami purpureo cincti, tetragoni glabri. Folia sessilia, 2-3 pollicaria, basi sub
ovata. Pediculi terninales terni, uni flori. Calycis foliola oblonga.
Corolla magna. Stamina petalis breviora.

Hymenium

Hymenium orientale rosmarini folio glaucis Tournef. Cor.

~~Habitat in oriente herb. Mus.~~

Caulis altus, teres, glaber, erectus, striatus. Folia lanceolato-linearia, in ramulis linearia, arguta, punctata, glabra. Pedunculi copiosissimi, oppositi, bichotomi, ex omnibus fere axillis. Styli tres. Calycis foliola ovata, obtusa, margine glandulose ciliata.

afum Hygenicum.

~~Habitatio~~ ~~herb.~~ ~~4. us.~~

Caulis fruticosus, crassitie pennis aspernis, terco vel obfure Tetragonus: Ramis
tenues adfcedentes, e linea decurrente alternatim arei pites, im punctati.
Folia fuplex, seu femi pollucaris, linearia, obtufa, perforato-punctata, arecia,
fub quin que nervis. Rudimenta ramulorum in axillis. Pedunculi ex axillis
premit et apice. Calycis foliola lanceolata, acuta, punctato-perforata.

axillare *Hypenium*

Habitat herb. Guss.

Fruticosa ramifera: rami teretes, glabri. Folia subpedicellata, pollicaria, linear-lanceolata, glabra, basi in petiolulum attenuata, avenia, acutiuspula: rudimenta ramulorum in axillis. Flores axillares et terminales, breviter pedunculati; folio brevioris. Calycis foliola et bractea lanceolata, acuta, triflora. prope prolificum ponendum

ridum Hypnium

Habitat herb. Lus.

Caulis fruticosus, si tota planta glaber: rami frequentes, virgati, inferne teretes, superne alternatim anicipites. Folia linearia, angustissima, plana, utrinque nitida, acuta, sessilia, impunctata, semipollicina: fasciculi foliorum ex omnibus axillis. Pedunculi ex apice, terni. Calycis foliola lanceolata, acuta: bractea subcalyce figura foliorum, calyce longior.

Cistifolium Hygenicum

Habitat herb. La Mar Inj.

Rami glaberrimi, purpurci, nitidi, e lineis recurventibus alternatim an-
cipites. Folia semiamplexicaulea, sesqui pollicana, glaucis viridia, sub-
tus punctata, avenia, enervia. Pedunculi terminalis, dichotomi: flores
dichotomus subsessile, parvi. Calycis foliola, uti bractea ovata, acuta.

punctatum Hypericum

Habitat herb. Guss.

Caulis herbaceus, teres, purpurascens; nigro-punctatus. Folia sessilia, pollicaria, oblonga, obtusa, simpliciter venosa, subtus punctata, pallidiora. Peduncululi superne ex apice caulis et ramorum, dichotomi. Calycis foliola oblonga, obtusa, punctata, uti petala

virgatum Hypericum

Habitat herb. Rus.

Caulis erectus, ramosus, virgatus: Rami elongati, uti cauli e lineis deorsum
ventibus tetragonis, laxis. Folia sessilia, linear-lanceolata, acuta, nervis
subtus punctata, superiora internodiis multo breviora, acuta. Pe-
dunculi terminaliter, filiformes, dichotome flos breviter pedunculata
tus. Calycis foliola lanceolata, acuta, punctata, parva. Bracteae filiformes
latae.

Spiciflorum Aypenicum

Habitat herb. Ausf.

Caules plures, fruticosi, semipedales, superne ramo uno alterove, florifero, ^{lineari-lanceolatis} raris, adpressi punctis fuscis. Folia sessilia, semi polliciana, glabra, obtusiuscula, crassiuscula, avenia, subtus panem pallidiora, margine longitudinaliter punctata, puncto uno alterove intra marginem. Spicae superne, opposita, patentes, flexuosi, inferiores bipollicares, sursum sensim breviores. Bractea parva, lanceolata, fusco punctata, ciliata. Flores remoti, parvi. Calycis, lobula lanceolata, acuta, bracteis simillima. Petala negro punctata. Stylis 3. Stamina longitudine petalorum.

Hypericum

Hypericum armenum caule aspero purpureo Tournef. Cor. 19

Hypericum scabrum La Martk

Habitat in oriente herb. Turc. 7

Caules plures, erecti, prostrati, teretes, tenues, simpliciter, striati, rigidi, mucronati, scaberrimi, coeterum glabri. Folia sessilia, linearia, unguiculata, acutiuscula, avenae, integerrima, impunctata: rudimenta ramulorum in axillis. Pedunculi terminaliter, plures. Calycis foliola oblonga. Stamina longitudine petalorum.

Hypenium

Hypenium repens La Mark.

Habitat herb. Tusz.

Caules tenues, glabri, tenues, apicē laeves, ancapites, erecti. Folia lanceolata, superiora crato-lanceolata, vix semipollicaria, obtusa, impunctata, simpliciter venosa. Pedunculi et axillis supremis, terni; laterales biflori. Calycis foliola oblonga nigra, nigro punctata, acuta, glandulose ciliata. Petala punctata, filamentis longiora. Bractea punctata a repente Lin. Divesum

elatum Hypericum

Hypericum elatum L. Montk

Habitat. herb. Guss.

Rami apice tetragoni, glabri, uti tota planta. Folia sessilia, pollucaria, ovata, obtusiuscula, venosa, subtus pallida, punctata. Pedunculi terminales; terni, triflori. Calycis foliola oblonga alba. Petala oblonga, filamentibus breviora.

Cappadocium Hypericum

Hypericum cappadocium frutescens foetido semel sed in odorem Tournef.

Cor:

Hypericum elatum β . La Martk.

Habitat in Cappadocia herb. Turc. $\frac{1}{2}$

Frutex ramosus. Ramis inferne teretes, superne alternatim compressi, glabri, uti tota planta, oppositi. Folia subsilia, vix semipolliciana vel minor, oblonga, utraque, obtusa, simpliciter venosa, impunctata. Pediculi ex apice ramorum, terni, breves, uniflori, intermediis brevior. Bractea subulata ad basin pedicellorum. Calycis foliola lanceolata, striata, impunctata. Petala lanceolata, striata, glabra. Stamina longitudine petalorum.