

Hypochonis

Cal. imbricata. Sem. radice teretiuscula sursum in crassa, apice ob-
tus: disci fusiformia, in stipitem acuminata. Pappus plerumque
niger: radice ~~teretiuscula~~ fusilis: disci stipitatus

heterophylla Hypochoeris caule ramoso folioso, foliis lanceolatis inferioribus extro-
sum subpinnatifidis, superioribus integerrimis.

Habitat in Brasilia Commerson. Ex herbario Fussiai

Caulis erectus; striatus, superne ramosus, glaber. Folia semiamplexi-
caulia, attenuata, inferiora latiora, extrosum utrinque latius
duobus vel tribus, linearibus integerrimis subpinnatifida; pedunculo
pubulata, an gustissima. Calyx villosus: foliola linearia. Pappus
stipitatus, plumosus, uniformis. Pappus ut in congeneribus.

glabra H. glabra calycibus oblongis umbriatis, caule ramoso
nudo; foliis dentato-serratis Lin Hort Upf. 240+ Spec
pl. 1140+ Flor. Dan. tab 424

Aceracium minus, dentibus leavis folis oblongis glabra
Bauh pin. p. 127.

Habitat in Danua, Germania, Belgio ©

Lappana

Calixt calyculatus: fructus feris conivens. Semina oblonga
vici duo nuda

communis 1 l.

foetida 2 fl.