

~~Hypis~~

verticillata Hyptis floribus subverticillatis caule ramosefimo Sangu. coll. p. 101.

fr. var.

Mentha facie verticillata Hyptis

Stachys patens Sw. prod. pag. 80

Habitatio frutetis et rudantis Hispaniola 5

negosium Q. foliis negosi capitulis axillaribus pedunculatis explanatis radiatis
Lin. I. V.

~~Melissa albissima globulana Plum. spec. 6.~~

~~Scabiosa affinis, Chrysanthemi facii, Camii foliis, americana Plukenet
alm. 335. t. 222. fig. 1.~~

Clenopodium negosium, capitulis scabroso Dill. Elth. P. P. t. 75. fig. 16

Habitat in Carolina & America meridionali y

Spizigena Aegypti

Habitat herba maritima

Spica oblonga, semipollicares. Folia ~~fratru supra, vasa, sub supra~~
in lanceolata

Tomentosa Hyptis

Habitat Puerto Rico herb-Desfont

Caulis herbaceus, erectus, in ano tomentosus, simplex, pedalis. Folia breviter petiolata remota, semipollicaria, oblonga, serrata, acuta, villosa, subtus uncinata, nervosa. Pedunculati ex axillis supremis et apice, solitarii, oppositi, sesqui pollicares, uncinati capitula solitaria, globosa, peso duplo majora. Involuerum ex tenibus hexaphyllum inaequum: foliis ovatis acutis, nonnulla interiora cuneata. Calycis basi villosi, dentibus setaeque, rigidulis

capitatum C. foliis planis glabris, capitulis axillaribus pedunculatis Sw.
prodr. pag 80

Scabrosa affinis Plum. alm. 359. t. 222. fig. 7.

Sidentis Sloan bot. 1. p. 174. t. 109. fig. 2.

Melisp altissima globulana Plum. ii. t. 163. fig. 2.

Hypis Jacq. Coll. 1. pag. 102

Habitatio Jamaica C

Rauli erecti bypedalis purpurascens, ~~est~~ glaber ad lentem velli
aliquot minutissimi. folia petiolata, ^{90 oblonga} ~~ova~~ ^{acuta}, basi per
petiolam paucim decurrentia bis tripolliciana nervosa
ad lentem punctis s. pili rariis adpressa. Pedunculi axilla
res foliatis oppositi foliis breviores. flores in capitulo collecti
promin. magnitudine pisi demum nucis coruli involueratis
involucris lanceolatis

— inaequaliter serratis

Descriptio in coll. no 142

capitata #

malesia altissima, globulari Plum cat. pag. 6. v. p. 155. tab. 163. fig. 2

Hypocistis capitata Gaey. coll. 1. pag. 102.

Habitat in St Domingo

Stipitatae caules ramosi tetragoni, subaeni, bipedales. Folia opposita
petiolata, ovata basi acuta, venosa inaequaliter serrata acuta, utraque
ad hancem hirsuta, inferora rugosa et pillosa. Pedunculi axillares

solitarii, tetragoni, graciles 2-3 pedicellares. Flores numerosi in capitulum
collecti semiglobosi, involucrio polyphylo lanceolato cincti. Laciniae
calycis ^{longae} lanceolatis subaequalibus. Corolla ^{supernata} tubi calycis longior. Labium

superius 3 fida lacinis lateralibus oblongis intermedia concava reflexa
(superius) bifidum lacinis ovatis acutis Gaey.

4 Hamodrys Plenopodium Plenopodium
pedunculatum capitulis axillaribus pedunculatis, foliis
oblongis cordatis crenatis

Habitat in Guiana ~~et Martini.~~

Caulis purpurascens, villosus, uti tota planta.

Folia petiolata, obtusa, nervosa crenato serrata, glauca.

Petiolus longitudine fere foliorum

Pedunculi folia aequantes, filiformes, axillares, solitarii, alterni.

Flora in capitulo parvo collobofo, collecto.

Involucra ~~concolorata~~ ~~habentia~~.

Calycis quinque-dentati: dentibus lanceolatis.

218

1507

verticillata H

Hypoxis verticillata Jacq. coll. 1. pag. 101.

Habitat in St. Domingo &

Fructus 10 pedalis, erectus glaber Caulis teres. rami juniores tetragonis herbacei.
Folia opposita, petiolata, longe petiolata, longe lanceolata, acuta, inaequaliter serrata,
& glaberrima 3-6 pollicaria. Verticilli in ramis junioribus sessiles, 6 flori
Calyx lobis lanceolatis acutis aequalibus. Corolla alba. Tubo longitudine Calycis
lobum superius inferius (superius) 3 fidem lacina intermedia subrotunda conca
vata lateralibus ovatis (inferius) superius semibifida 4 aequi.

non vidi