

Specimen ex horto Paris. et Gbenis
describitur a Desfont.

1. semperflorens f. frutescens, foliis cuneiformibus integerrimis obtusis
2. semperflorens f. frutescens, foliis linearibus acutis integerrimis glabris
3. gannexiana f.
4. saxatilis f. suffrutescens, foliis lanceolatis-linearibus carnosissimis acutis integerrimis ciliatis
5. canescens f. frutescens, foliis linearibus integerrimis varicosis que orlato subdiantheris
6. gibraltaria f. frutescens, foliis apice denticatis
* * * hebraica
7. robustifolia f. foliis ovatis succosis lobatis radicalibus oblongo ovatis petiolatis subdentatis, caulinis oblongis amplexicaulis
8. nana f. foliis petiolatis inferioribus subrotundis sublobatis, superioribus oblongis, summis subsessilibus
9. cepaeifolia f. foliis ovatis, caulinis sessilibus lobatis succosis
10. umbellata f. foliis lanceolatis acuminatis inferioribus sessilibus, superioribus integerrimis, fructu corymboso
11. amara l. foliis lanceolatis extusum subdenticatis subdentatis acutis fructibus racemosis

12. tenuifolia G. foliis lineariibus integerrimis, caule paniculato, corymbis
hemisphaericis
13. odorata G. foliis lineariibus superne dilatatis serratis.
14. nudicaulis G. foliis sinuatis, caule nudo simpliciter
15. serratifolia G. foliis petiolatis serratis obtusis inferioribus oblongis, superioribus lanceolatis
16. pennata L. foliis radicalibus pennatifidis caulinis lineariibus pennatifidis
trifidoque.

canescenti f. frutescens, foliis linearibus in tergeri mi ramis quoque
cauloso subarescentibus.

Habitat in Hispania a Dr Dahl sub nomine Hb. saxatilis
Cotice unres purpurascen

mis fo 5
Caulis plures frutescente pedales ramosissimi. Rami ^{parvi}
^{apiculati} ramulosi. ramuli erecti palmares et ultra uti folia e vallis
tenuissimis vixi canescentes simplicibus. Folia ^{proplea}
^{in ramulis} inferne conferta superiora distantes inferna subtus canna
ta supra canaliculata, superiora planiora parum
minora semper unguiculata obtusiora. floes primum
Corymbosi demum fructus racemosi.

saxatilis foliis glabris ^{gland.} excepto margine.

puberula *beni*

^{aliquibus altius}
Habita in Libania Lib. Musf.

Caules herbacei, villosuli, ascendentes, basi ramosi, breves, tenues. Folii unguiculata,
oblonga, acuta, integerrima, basi attenuata, margine pilis raris puberula, avenia
Pedunculi ex apice cum ramulo laterali, palmares vel parum ultra, raris pilis.
Flores racemosi, albi. Petala emarginata

vide fl. Libanica

Ibeni

Thlaspi castanicum umbellatum gramineo folio, flore purpureo Tournef
Infr. v. h.

Habitat in Castania Herb. Deo. part.

Caulis ramifus, glaberrimus, uti omnia. Rami simpliciter. Cilia sempal-
liciana linearia, glaberrima. Flores subumbellati, uti et silicula. Silicula
oblongo-subrotunda, emarginata, apice utraque membranula

incarnata Iberis

Habitat in Syria herb. Desfont.

Caulis plures, basi lignosi, filiformes, glabri, uti reliqua planta, digitales, basi ramosi, teretes. Folia linearia, unguiculata, lanceolata, empositula, integerrima. Petala incarnata. Silicula rotundo, emarginata margine membranacea

habes

perfoliata Iberis

Habitat in Lyna Ballardiere herb Lesfont

Caulis herbacei, ^{sub}ramosi, laxi. Folia opposita, unguicularia, conferta, sessilia, oblonga, basi versus partem angustata, obtusissima, glabra, integerrima. Flores umbellati s. c. breviter pedunculati. Silicula oblonga, emarginata, gibbosa.

Sempifloens & frutescens; foliis lanceiformibus integerrimis obtusis
L. N.

Thlaspi latifolium polycarpon, Leucopi foliis Boiss. si-
55. V. 29. fig. a-1.

Leucopium fruticosum umbellatum persicum, foliis Leu-
copi in partibus semper viratibus Monf. hist. 2. p. 296.

Habitat in Sicilia, Persia ^{et in partibus alii flonfer}

Caulis bipedalis gamopus. Rami per se teretes, ciliati & capiti
foliorum scapulis, uti tota planta glabri. folia superiora in ramis
sequeantia inferiora minima argentea pollicaria superiora latiora
bipollicaria omnia avenia, cavia basi attenuata. Racemus
terminalis flores magni albi. Silicula ut in Persia auriculata
hab. Tharum.

semper-virens? frutescens, foliis linearibus acutis integerrimis lin

Thlaspi montanum candidum Dalech. hist. 1100.

Thlaspi montanum sempervirens Bauh. pin. 106

Thlaspi creticum perenne, flore albo Barr. ic. 214 et

734.

Habitat in Creta rupestribus ^{caulis plures ciliatis tope foliorum peltatis}
Triticulus humilis semper-virens ramosis simus. rami sparsi approti
mati caule albescente. pat. vix palmari glabrius. tota planta
omni floriferi. Colea vix unguiculata avenia linearia distan
tius. floe corymboso racemosi minori quam in semper-florante
albi ceterum sat simili semper-floranti

glabri

Thlaspi gangetica perennis foliis linearibus obtusis integerrimis
Barr. ic. 734 cum all. fl. peden. 920. Tab. 40. fig. 3. Et Tab. 54. fig. 2.
notae optime conveniunt. ^{conculi ea mensa ab All. non vides qua nota a sempervirente} offerit

Saxatile 9. suffrutescens, foliis lanceolato-linearibus carnosis acutis
intergeminis ciliatis. Lin. Am. acid. 4. p. 3217

Thlaspi saxatile, vermiculato folio Bauh. pin. 107. Gard. cur.
466. t. 101.

Lithonothlaspi 3. fruticosius, vermiculato acuto folio Col
Euphr. 1. p. 270. t. 277. fig. 1.

Habitat in Italia, Gallia australi aridis sabulosis &

Planta digitali vel palmarum caules plures simplices vel basi ramosi
ramis adscendentibus ^{ramis} floriferis inferne glabri purpurisente villis
tenuissimis pubescenti. Folia in ramis senilibus copiosa conferta in
floriferis sparse parum remotiora ut linguiculanum basi attenua-
ta apice pallido margine pilis paucis brevibus ciliato. Flores corym-
bosi racemosi.

canescens. f. foliis linearibus integerrimis ramulisque villosis
subcanescentibus

Gibraltaria 9. *Inteficus* foliis apice dentatis Lin. S. V
Thlaspidium hespanicum, ampliore flore, folio crasso dentato
Lill. Cat. 302. T. 207. fig. 371.
Habitat ad Gibraltanam 5

rotundifolia ? herbaria foliis ovatis: caulibus amplexicaulis
lobis succosis R. V. p. 5894 Spec. pl. p. 9054

Thlaspi minimum, foliulis orbiculatis, foliis inferioribus ovatis
petiolatis, superioribus lanceolatis amplexicaulis Ard. spec.

2. p. 33. t. 19. fig. 1

Thlaspi alpinum, foliis rotundis carnosissimis, flore purpurascente
Tournef. Imp. 212. Scheuchz. al. 50. 123.

Thlaspi montanum, serrato ceras folio, flore purpurascen-
te umbellato Mart. ic. 040.

Lepidium caule repente, foliis ovatis amplexicaulis Hall
All. ped. 27. t. 4. fig. 1.

fig. Banel

hab. p. 10 Habitat in Helvetia 4 diffusi adpendenti.
quadratifolia tota glabra caules plures digitales simplicissimi. folia
erum non amplexi radicales copiosa ^{ovata-obovata} integerrima vel superne utroque
caule dente ut unguiculata: caulibus oblongis subpeltatis integris

foliis corymbosi

nomia, femine unguiculata omnia carnosissima. Flores purpurei

Rapides

Thlaspi rotundifolium subregulari. Siliqua subquadrangulari, petiolatis
all. fl. ped. tab. foliis ^{succosis lobatis} radicales oblongis ovatis integris subdentatis
caulibus oblongis amplexicaulis

Cepiofolia herbacea, foliis ovatis: caulinis sessilibus terribus pinnato
si Jacq. Mill. 2. p. 20. t. 1.
Habitat

non vidi quomodo ^{affera} a rotundifolia.

umbellata 7 herbaeica, foliis lanceolatis acuminatis: inferioribus
serratis: superioribus integerrimis Lin. Spei. pl. p. 906 +
Orbba f. Arabis, f. Thlaspi cardis God. pempt. 713.

Thlaspi umbellatum creticum, ibendis folio Bauh. pin. 106.

Habitat in Aetna, Hispania, Creta C

Cauli ^{pedali} ramosus teres glaberrimus tota planta. Rami supremi
foliis bipolliciana utrinque attenuata propter vespis
basin obscure venosa. flores et fructus corymbosi: quae nota
et ab amara d'fferit. variae floribus purpureis et albis

fructu corymboso

amara. *Thlaspi* herbacea, foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus
racemosis. Lin. I. V.

Thlaspi amarum Tabern. ii. 462.

Thlaspi umbellatum arvense, ibidem folio Bauh. pin. 106.

Thlaspi umbellatum arvense amarum Bauh. hist. 2. p. 928

Habitat in Helvetia \odot

Tota glabra, habitus *Th.* umbellato. Folia basi tantum
attenuata, versus apicem utroque dente uno vel altero
extrosus dilatata, sed nervuli ex apice ramorum
flores primum corymbosi demum racemosi. Siliula
subrotunda setis subdentatis

f. extrosus subdilatatis subdentatis ac
tis, fructibus racemosis

Cnicifolia f. herbacea, foliis linearibus integerrimis, caulinis serratis, ^{integerrimis} caule paniculato, corymbis hemisphaericis Lin. Spec. pl. p. 9064

Thlaspi lusitanicum umbellatum, gramineo folio, flore purpurea f. ex Tournef. 9 Pl. 4213. Gard. airt. 459. T. 105.

Habitat in Hispania, Lusitania

Caules semipedales erecti densis subternatis glabri ramosi. ^{has et alia subternatis} folia filiformia ^{parva distantia} glabra, pollicaria ~~omnia~~ in meo omnia glabra. Flores parvi corymbosi purpurei. Corymbi hemisphaerici. Silicula ovata, apice truncato bidentata quo in lapidis gramenifolio pat. ovata acuminata.

odorata 4. herbacea, foliis linearibus superne dilatatis serratis.

Lin. I. V

Thlaspi parvum 4. odorato flore Clus. hist. 2. p. 132.

Thlaspi umbellatum creticum, flore albo odore minus Bauh. pin.

106
Habitat in Alpibus allobrogibus ☉

non vidi

Leontodon 9. foliis petiolatis ^{obtusis} serratis inferioribus oblongis, superioribus
saniculatis

Habitat in Europa australi. Cui videtur
Caulis erectus pubescentis subfarinoso semipedalis. Folia longe ^{inferioribus}
petiolata ^{in quibusdam} basi attenuata infima subrepanda superiora ^{inferioribus} ~~sema~~
Sunt utraque utraque quatuor pollicaria sursum versus
sem. minora sem.

an modo varietas pennata foliis latioribus serratis a cultura

pennata G. herbaria foliis pinnatifidis Lin. l. v. p. 5094 Am. ac ad. 4

p. 2704

Thlaspi altemum minus umbellatum, Nasturtii hortenfi folio, nabonense

Lobel. ic. 210.

Habitatio Europa australi maritima

Caulis adscendens pulverulentus et farnosi teretes, semperda
lei ramosi. Rami parvi plures seu vix ramosi subsessile

Folia parva filiformia superne laevia utrinque

Pedunculati et ex parte ramorum fructu. Corymbis non multo

qui. calycis purpurascens filicula oblonga subtriangula
lobis lobis obtusis

Nasturtium sylvestre Dalechamp. hist. p. 655. folia radicalia
in seque Dalech. et latiora quam caulina pinnatifida.

radicalibus lanceolatis pinnatifidis

foliis caulinis linearibus trifidis pinnatis

bifidis

specimen ex hortenfi.